



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





600020265L

8.77. 0. 10.



E. BIBL. RADCL.

34.

a. 2.

7.


Handwritten numbers and symbols: 11, 13, 3, 8, 5, 1, 67, 8, and a plus sign.

191163

d

C

$\frac{25}{1}$







I N D E X
A L T E R
P L A N T A R U M
Q U A E I N
H O R T O A C A D E M I C O
L U G D U N O - B A T A V O
A L U N T U R
C O N S C R I P T U S A B
H E R M A N N O B O E R H A A V E
P A R S P R I M A.



LUGDUNI BATAVORUM,
Sumptibus **AUCTORIS** & Prostant apud **PETRUM VANDER Aa.**
Bibliopolam & Typographum Academiae atque Civitatis.

MDCCXX.

NOBILISSIMIS, AMPLISSIMISQUE,
VIRIS,
ACADEMIAE
LUGDUNO-BATAVAE
CURATORIBUS,

D. GULIELMO BARONI
DE WASSENAER,

TOPARCHAE IN STERRENBURG, EQUESTRI
NOBILITUM HOLLANDIAE ORDINI ADSCRIP-
TO, DELEGATORUM ILLUSTR. ET PRAEPOT.
HOLLANDIAE ORDINUM PRAESIDI, ETC. ETC.

D. HUBERTO ROSENBOOM, Jcto.
TOPARCHAE IN 's GREVELSREGHT, SUPREMAE
BATAVORUM CURIAE PRAESIDI, ETC. ETC.

D. HERMANNO VANDEN HONERT, Jcto.
REIPUBLICAE DORDRACENAE CONSVLI,
AGGERVM ALBLASSERWAARDE COMI-
TI, ETC. ETC.

EORUMQUE COLLEGIS
NOBILISSIMIS, AMPLISSIMISQUE,
VIRIS
REIPUBLICAE LUGDUNENSIS
CONSULIBUS,

D. JOANNI VANDEN BERGH, Jcto.

EX FOEDERATA HAC REPUBLICA OLIM NO-
MINE IMPERATORIS CAROLI VI. BRABANTIAE,
FLANDRIAE, HANNONIAE, ETC. EPHORO, ET
AD RES EARUM ORDINANDAS MAXIMA CUM
AUCTORITATE DELEGATO.

D. JOHANNI VAN ASSENDELT, Jcto.

D. HENRICO VAN WILLIGEN, Jcto.

D. ABRAHAMO VAN GERWEN, Jcto.

NEC NON

VIRO SPECTATISSIMO

D. PETRO GIJS, Jcto.

JUDICI URBANO, ET NOBILISSIMIS CVRATORI-
BUS, ET CONSULIBVS AB ACTIS.

DEDICATIO. ⁽⁵⁾

Recensui hac aestate, quas Hortus alit,
Stirpes; easque simul ita digessi, ut disci-
plinae herbariae ratio ordinem in his ob-
servatum forte haud omnino repudiet. O-
pusculum verò Vobis offerre visum mihi
fuit, ut testarer publicè venerationem, quā
Vos colo; sed & credidi muneris gesti ra-
tionem reddendam Vobis; denique sic an-
nixus sum efficere, ut & constaret simul
Vobis de praesenti jam conditione Horti.
Atque laetiori quidem haec omnia animo
agere audeo, quod publicè fas sit mihi di-
cere, nullum in toto terrarum orbe
coli Hortum, qui hunc Vestrum superet,
seu quis numerum putaverit Stirpium, aut
singularem plurium pulchritudinem, sive
concinnitatem ordinis consideret, unde u-
tilitas sanè uberrima dimanat. Mirabuntur,
scio, qui haec legere non fastidiunt, tam
exiguo parvi Horti agello tot arctari Plantas.
Res tamen ipsa se ita habet. Sed & fa-
cit interim haec penuria soli curae mihi
* 3 magni-

(6) D E D I C A T I O.

magnitudinem profectû & anniverfarii laboris femper integrationem. Si auderem igitur , unum orarem , quando ter jam fundum a condito Horto protuliftis, ad mœnia denique urbana extendere eum ut velitis : Caperet ita pulchrius , liberiusque aleret , herbas, daret locum fpeciofis adhuc pluribus conferendis , quas promittere aufim, poftremô decori Academiae atque Reipublicae infignius responderet. Valete Viri Magnifici, feliciterque Rempubli- cam capeffite & Academiam ! ita precor.

VESTRORUM NOMINUM,

Cultor Devotus


Hermannus Boerhaave.

Lugduni Batavo-
rum 17 $\frac{3}{16}$ 19.

R E I

(9)

REI HERBARIAE STUDIOSIS
S. P.
HERMANNUS BOERHAAVE.

ecennium abhinc elapsum est, quando, praepositus Officio Botanico, primum conscripsi Horti nostri Indicem; qui, licet ob graves mihimet pluresque causas displiceret maximè, in usus tamen Academicos extundendus tunc temporis videbatur: ex tumultuariis quidem ille tabulis subito aggestus par tamen erat, ad quem redire possent, qui discendi gratiâ Hortum vellent invisere, vel ejusopes novisse, si quâ forte in re quaererent, quemadmodum ex nostrâ supellectile supplementa sibi legere possent. Jam verò & consecutus otium, & perseverantiori studio magis exercitatus ex adversariis lecta in codicem digessi omnia, eâ quidem curâ adhibitâ, ut plus Botanicae Doctrinae prae se ferat, paucioribus verò urgeatur vitiis, quamvis interim ne sic quidem satis mihi placeat. Aequo igitur feras animo, quicumque Librum hunc evolvere haud dedignaris, si paucis te velim prius, atque audacter alloquar. Agriculturam quidem maximos ad vitam fructus afferre, & prae caeteris necessarios, ipsa vita hominum, sanitas ipsa clamat. Neque minus certe Medicina aegris utilis habetur, quae & ipsa tamen saluberrima quaeque adversus morbos remedia, tuendaeque sanitati subsidia, ex Plantis maximè petit. Utraque sanè

**

Her-

Herbarum igitur Scientiam commendat, prorsus ut firmâ ejus cognitione neque carere fas sit Medico, neque Chirurgo, Pharmacopoeus autem, & Rhizotomus Artem hanc callere omninô debeat. Quid itaque magis necessarium, quid magis ex usu, his, qui animum ad discendam Medicinam applicant, quam ut sedulô discant prius Herbarum medicatarum facies perfecte cognoscere, venenatas probe ab iis distinguere, utrasque ita tenere, ut temerê errare in hisce nequeant. Neque interim videtur alibi ulla nata opportunitas gravi huic negotio, nisi in Hortis publicis, ubi praecipuae Stirpes coluntur, atque indicantur Tironibus a Praefecto, cujus procuratio Horti est, & Praeceptoris magisterium. Utique novi, qui, Medicinâ clari, doluerunt acerbissimê, se rem tantam tam negligenter egisse, dum praesens Academicus Hortus olim occasionem praebebat disciplinae facilitati; quum jam negotiis distracti, nec fruenter instructi agri commodis, procul erant spe veteris erroris corrigendi. Estque etiam prima semper Tirocinii Medici, si quid veri hic cerno, exercitatio in hoc studio ponenda: quum maximê id ingenio humano naturale, facillimum reverâ, atque conveniens prorsus sit animo graviore curâ libero. Publicê quidem est concepta & confirmata vulgaris aestimatio, quasi sufficeret Medico paucas didicisse fideliter, quae salubri se commendant virtute, Plantas, stultamque quaeri in caeteris speculandis, utpote inutilem, gloriam. Hanc tamen ego sententiam a verâ procul abesse puto: contra verò credidi, debere quidem Medicinae studiosos apprime doceri Stirpes

pes usu spectato celebratas, sed & simul, si datur facultas, alias omnes, licet magis persunctoriè, contemplari. Praeterquam enim quod corpori saluberrima sit, & gratissima animo, honesta simul, haecce occupatio, ipsa certè ejus facilitas incitamento est, ut vita prima Medici per hanc excolatur; neque fructu suo carebit hic labor: enimverò saepe contingit detegi in neglectis, quae ut efficacissimae in Medicinâ deprehensae, ita invidâ curâ Auctorum in quæstum privatum abscondebantur sollicite; ut in mirabili Peruvianâ, & Scrophulariâ majore, nuper constitit. Quid verò? nonne novae sic, & utilissimae, inventae? nonne conservatur certa sic repertarum memoria, tam citò oblitteranda aliter? ut in Veterum monumentis aetas nostra tristes, at frustra, deplorat. Quae quidem omnia si nondum movent repudiantis animum, an-ne ornamentum quidem, conciliatum inde menti, persuadere poterit, utilem esse præclaramque Stirpium quamplurimarum Scientiam? quâ & hoc efficitur, ut una saepe cognita aliam frustra quandoque & diu quaesitam feliciter indicaverit. Si ergo è re est omnes, quae offeruntur, Plantas animo complecti, atque retinere in memoriâ, pariter constat discordantium & concordantium comparatione genera legenda, quae communi formâ similes ita ordinant, ut queant cogitatione mentis, & ambitu verborum, quam commodissimè copulari: ita scilicet liber onere evagandi per species, quae innumerabiles ferè, per genera incedere tutò potest. Ita, qui variae & vastæ Disciplinæ desperatione contritus, & tardatus, compen-

dii concinnitate allicitur. Scilicet nihil aliud magis adjuvat Botanicum, curamque ejus levat, quam similibus in idem adscriptis genus si unum imposuerit nomen, quo communis sociatis character designatur. Hac quidem ratione facilis comparatur Arti simplicitas, recens repertae in ordines coguntur, aptisque denominantur vocabulis, simul adjuvatur memoria, curatur ne semel cognitae deinceps excidant, atque omnis semper cavetur confusio. Utinam hanc castigatam severitate nobis Disciplinam legassent suam Priscorum sapientissimi! quam benigna hodie conatibus nostris adspiraret felicitas! si adversae valetudinis arma, si Herbarum exploratas in salubritatem virtutes, non laudassent modò posteris, sed & certâ singularum designatione seculis porrexissent. Quum jam pulchrè possumus ex monumentis eorum perspicere, quid faciendum in curandis morbis, indicio observatae naturae, invenerint; quibus verò id praestiterint auxiliis, vix detur ex Scriptis illorum addiscere. Et facilius mercede est Sphingis aenigmata extricare, quam expedire, quamnam ex Stirpibus, nobis jam notis, suis nominibus Antiqui intellectam voluerint. Ut simile malum a suis averterent temporibus, venturisque prospicerent seculis egregiè cordati Viri, peritissimi rerum naturae, atque experimentis inspecti, pulcherrimam navaverunt operam, Conradus Gesnerus, Carolus Clusius, Fabius Columna, Andreas Caesalpinus, Joannes Rajus, Robertus Morisonus, Paulus Herman, Tournefortius, Rivinus, Hottonus, certatim in medium attulerunt tam pulchra, ut hodie facile

cile sit ex singulis adunatis ordinatum corpus constituere. Maximè quidem, si in usum revoces simul, quae de fabricâ, & usu, partium commentati sunt in immortalibus suis Operibus, Marcellus Malpighius, & Nehemias Grew, quaeque juxta hos Nobilis Morland in Actis Britannicis, & Sebastianus Vaillant in elegantissimo super his Libello, docuerunt. Horum ego omnium subnixus inventis sustinui hunc Catalogum in solum Academicorum usum utcumque componere, tantum profectò ut praeirem Discipulis, iisque formarem Systema Herbarium, quod nostro solum esset Horto accommodum: nam integro Systemati condendo neque esse me jam, neque unquam parem me fore, scio, licet vel longaevae usu aetatis totus essem in illo. Doctrinae autem nostrae ratio jungit Arbores, Frutices, Suffrutices, Cremia, Virgulta, & Herbas; si modò florum, fructuum, & fabricae evidentissima similitudine Natura haec prior associaverit: in caeteris, ubi in his vix concilianda obtinet diversitas, Arbores, Frutices, & Cremia, remotis Herbis, in ordinem redigimus seorsum post absolutam Syntaxin Herbariam. Neque etiam arctè ita adhaerescimus uni parti Plantae, ut secundum eam solam ordinemus affines; imò verò vivida, sponte obvia, stabilis, & magna partium affinitas quarumcumque, saepe characterem aliis praeferendum dabit. Probe novi, minus probari hanc Rajanam Methodum magnis in Arte Magistris: crediderim tamen necessitatem ejus patere iis, qui diversas ab hac regula Methodos co-

*lunt. Sed & ipsis classibus describendis, constituen-
disque generibus, veritus haud sui characteristicas no-
tas jam ab hac, ab altera iterum in aliis, petere,
prout magis liquidò facilis cognationis species appare-
bat: usque adeò, ut videas in una hac Syntaxi nostra-
rum Stirpium plurima uniri, quae dispersim scripsere
alius de alio Systemate Botanico. Unde & plus semel
contigit, definito generis characteri subnecti quasdam
Plantas, in quibus exquisitè haud deprehenditur prae-
fixa generi nota, dummodo ingens adest interim in
aliis convenientia cum iis, quibus character, nomen-
que generis debetur. Videturque magis juvari discenti-
um memoria per hanc negligentiam, quam nimis
solicitam & obscuram diligentiam eorum, qui mini-
ma subtilissimè sectando Naturae abdita verius, pul-
chro quidem instituto, revelant, quam quod facilita-
tem Doctrinae discentibus expediant. Atque ita ha-
ctenus animum induco meum. Ubi verò accuratissimi
Vaillantii singularia inventa, atque observata, pu-
blicae commissa utilitati meliora aperient, ut magna
spes affulget, docilem veritati animum submittam.
Porro conatus sum evitare innovationem nominum, si
evitari, salva disciplinae lege, potest. Peccaveram,
fateor, in legem hanc adeò necessariam, in primo
edito Indice, dum recentia multis Plantis vocabula ibi
addita, quae meliori longè nomenclaturâ dudum in-
notuerant. Id fateor, culpamque deprecor! festi-
nans calamus, sejunctusque tum longo tempore a Re
Herbaria animus, errori causam praebuere, quam
emendare jam affectavi: in paucis, quae irrepsere, a
Bo-*

Bonis condonabor. Quippe qui puto nihil fere pejus Arti accidere, quam id, quod quotidie evenit, ut quilibet Auctor Plantae diu descriptae, atque bene denominatae, novum iterum, absque fructu, absque ulla necessitate, nomen imponat. Cur Joannes Bauhinus cuique fere Plantae, quam recenset, nomen dat diversum ab eo, quod Columna, Clusius, & Casparus Bauhinus dederant? Quare Morisonus millena nova finxit nomina, ubi nihil omnino id exigebat? Quamobrem centies post hos innovavit rursus nomina Tournefortius? Omnes sanè hi curam Artis gravem cura nova aggravant. Atque ita efficitur difficilibus nugis ut stulta appareat difficilisque Botanice. Fateor equidem nihil magis arduum mihi in nostra videri Scientia, quam tot diversorum synonymorum ad unam Plantam vera adaptatio. Urgebit verò haec difficultas tamdiu Artem Herbariam, donec Amplissimus Gulielmus Sherard, Vir prisca virtute, moribus antiquis, aetate, honore, scientia, praestantissimus, suum Pinacem evulgaverit. Ille enim ubi in Opere hoc incomparabili omnium Scriptorum diversa vocabula uni accuratè descriptae Plantae data explicuerit, nihil deinceps erit nova fingendi, ut certa deinceps & immutabilis Scientia futura sit. Utinam Botanicorum facile Principi crudam det viridemque senectutem DEUS, ut tantae molis Operi par, cui sanè impares omnes se fatentur, universam rem absolvat, totumque corpus Disciplinae Herbariae immortalis Libro complecti ante fata queat! Utinam retractantem semper, semper recogitantem, inque numerosos prementem nimis anxie

annos, desideratissima Volumina supremus non occupet dies! Sed Operi supervivens edito felix fruatur partâ per sapientiam gloriâ! Advertes etiam, mi Lector, in ipsis classibus locandis, haud neglectum ordinem; ut exempla praeceuntis Naturae observarem fidelis. Characteres autem ex Rajo, Tournefortio, imprimis tamen, quoties licebat, ex Malpighio, petivi. Postremus quippe horum & Grewius apparatus ostendere Naturae molientis Herbas. Durationem Stirpium, locum apud nos natalem, designavi, atque addidi simul, quaenam jure civitatis medicae donari praeclarâ virtute meruerant; neque subterfugi dicere an coelum, solum, frigusque, nostrum ferant, an verò eadem pertimescentes tegere contra brumales injurias, aut fictilibus insitas in hybernacula deferre, conveniat, aut hypocaustorum molli tepore fovere. Quin & requiri videbatur adnotare coercendas, quae luxuriantem radicum reptatu, aut petulantiore stolonum progerminatione, confusionem concursu suo pariunt, vel vicinas opprimunt, denique & natalem in aquis locum quaenam habeant, quaenam verò praegnantem ex fervente fimo solo committi, dum seminantur, desiderent. Plura addere compendio in animum induxeram, sed, immersus negotiis, abstiti. Synonyma tamen legi illa, quae facere queant, ut omnium in Horto Plantarum, faciem, ortum, natalia loca, vires, usus, culturam, ilicò possit Studiosus invenire. Caspari enim Bauhini nomen brevi phrasi ducit ad omnes ipsi cognitos Scriptores, qui de
câ

eâ forte Plantâ literis quid consignarunt. Johannes Bauhinus, citatus ubique, eruditissimè ex placitis Veterum de Stirpe quâlibet disputat, simulque refert omnia, quae Veteres, quae Gesnerus, Clusius, Columna, Caesalpinus, & alii tradiderant, ut Bibliothecae Herbariae compilator sit. Quanta verò in apponendis iconibus oscitantia, quae fallacia? Sed sato properata mors prohibuit supremâ curâ perpolire Opus nobilissimum, quod deinde Editorum inscitiâ foedatum prorsus prodiit. Abesse itaque non potui quin taedioso labore omnia adscriberem Morisoniana vocabula: ille enim fideliter descripsit, quae clari ante eum Herbarii de Stirpibus fuerant commentati, addidit deinde non visa, vel neglecta, aliis, sed observata sibi, cunctaque appositissimis depinxit iconibus. Ita quidem, ut hætenus nullum huic Auctori comparandum noverim in usum Studiosorum: si enim in Horto contemplatus Plantam, juxta allegationem Morisoni in Indice hoc factam, eam in Morisone considerat, compendio discet quidquid desiderari circa eam potest: quare solus fere sufficit in hisce. Nec est, quod fastidiat quis Opera Morisoni, quia in plerisque Tractatus de Umbelliferis abest: praeterquam enim quod primus ille Tractatus nimis verbosè, minusque ad usum Studiosorum, sit conscriptus, longè plenior, melior, iconibus apposis auctior, iterum habetur totus in Tomo tertio, Sectione nonâ, a paginâ 265. ad paginam 333. Reliqua autem synonyma iconum praestantissimarum ergò apposui, in quibus profectò omnibus praececellit Hortus Eystettensis, Clusius verò propriâ manu de-

*lineatas exhibens Naturam fidus sequitur, inde Dodonaeus, Lobelius, Chabraeus, alii, Columna suas omnes ipse pinxit, Cornutus, Alpinus, Camerarius, Swertius, Ferrarius, Muntingius, Commelinus, Breynius, Hermannus, Pluknetius, Plumierius, optimas pariter obtulerunt effigies. Atque haec quidem de instituto nostro in edendo hoc Libello sufficiant. Va-
lete! & labores hos nostros in vestra commoda convertite!*

H O R T I

BREVIS HISTORIA.



Ortaliū plurimos dulcedine suā singulari stir-
pium pellexit contemplatio. Sive quod haec
prima fuerit recens natorum hominum voluptas,
quam sponte ipsis offerebat natura rerum; sive
quod impetu quodam innato vergat eō atque
feratur eorum ingenium. Quicumque verō Rei Herbariae
student, amant quam maximē Historiam cognoscere eorum
Hortorum, qui in usus publicos de industriā conditi, do-
ctrinae huic uberrima emolumenta praestant. Putantque
suum hoc desiderium ratione, a quā laudetur, haudqua-
quam carere. Quum itaque Academici, qui Lugduni Ba-
tavorum est, Horti opes Libello hoc celebrare aggredere,
operae me pretium facturum duxi, si brevem illius prae-
mitterem descriptionem. Quid enim? ipse hic ex mini-
mis sanē, & vilissimis primō, initiis excrevit in spectabilem
adeō conditionem, ut, qui opes ejus divitiasque censeret,
&



PROSPECTU

H. hort
 13. 4. 5. 6. 7. 8. Octo q
 lrisa alit sürpes hu
 Spatiofis, Semitis, et
 L. Pubilli florum. J. H.
 K. Arcolac iuxta spima
 M. Hydrophylacta pro
 N. Hortus Adonidis co

HORTI BREVIS HISTORIA. (19)

& tempus, & adminicula, quibus adolevit, infrâ putet. Nul-
lus quippe in Europâ hodie, adeoque & in toto, quâ latê
patet, Orbe, est, qui numero Stirpium locupletior, aut
digestus accuratiore in ordinem curâ, sit, nullus qui uti-
lioribus magis-ve raris & speciosis Plantis abundet. Prode-
rit igitur ad incitandos inflammandosque alios, ut discant,
tententque similia perficere, atque auxilia imitari, quae ut
praeclarê instituta, ita & felicitate successuum probata, eô
valuisse spectantur, ut pulchritudinem instructissimo Horto
conciliaverint. Sed neque injucundum erit scire, quinam
fuerint, quorum sapienti industriae tam singularia incre-
menta debeantur: excitat enim exempli virtute, & pieta-
tis pariter officia prosequitur, quoties meritorum commemo-
ratione iusta Auctorum laus vindicatur ab interitu, &
commendatur posteris. Quibus quidem ego argumentis
motus sequentia commentabor, quae ex genuinis rerum in
Academiâ hac gestarum monumentis, verisque Urbis hu-
jus, atque Athenaei, Historiis lecta, suisque digesta, ut con-
tingere, temporibus, concinnavi.

Postquam octavo Februarii anni millesimi, quingentesi-
mi, septuagesimi & quinti à CHRISTO nato, Academia
Lugduno-Batava, faustissimis auguriis, atque apparatu prorsus
decoro, condita erat atque inaugurata, Medicinae statim
in illâ studia acriter equidem & subtiliter coeperunt excoli.
Ita scilicet evenire debuit: quum *Petrus Forestus* Alcma-
rianus Batavus, Vir in Re Medicâ famâ inclytus & meritis,
editisque in publica commoda Scriptis clarissimus eodem ad-
huc anno Scholas ibi Medicas aperuerit, habitâ in laudem
Medicinae Oratione, atque primas in Academiâ Prælectio-
nes in Arte Medicâ differendo. Sed & eodem tempore eru-
ditissimus, suoque merito celeberrimus, *Gerardus Bontius*
medendi sapientiam profitebatur publicê. Erat verò tanta
in egregio Viro gravitas doctrinae, atque simul in docendo
facilitas, ut felicissimâ rei administratione Medicinam re-
centi in Academiâ promoveret maximê. Non est ergo mirum,
auspice nobili hoc Virorum pari, felici incepto novos con-
tinuô respondisse successus, atque recentis gloriae perpetuâ

accessione constituisse liquidò, quid boni de adultiore Academia in usus Medicos sperandum foret.

Quin & compertum fuit simul, quid prae caeteris desideraretur maximè ad promovenda Disciplinae Medicae commoda, ut scilicet expeditè atque sincerè veris Artis praeceptis imbui possent animi eorum, qui se ad cultum hujus totos dedere constituerant, vellentque inde medendi usum discere. Enimverò facilè constabat, nihil requiri magis, desiderari ardentius nihil, imò penitus exigì, quam ut Hortus instrueretur publicus, in quò operà praesenti daretur contemplari Stirpes, quas Professor doceret, discerent Discipuli, utrique in publica commoda usurparent.

Neque abfuere Illustres Academiae Curatores, penes quos summa erat auctoritas, ut totius Reipublicae nomine praesidia praestarent Athenaeo Batavo, ejusque invigilarent emolumentis; sed illicò haec ipsos cura sollicitos habuit, ut necessario hoc adjutamento res Academica promoveretur.

Decimo igitur & septimo Martii anni 1577. Nobilissimi Curatores, habità super hoc negotio deliberatione cum Collegis suis Amplissimis Consulibus urbanis, rogaverunt Consules, ut vellent in hunc usum cedere in rem Academicam vacuum campum, qui pone Aedem Academicam in Occidentis plagam porrectus, jam prius fuerat huic destinatus operi, licet nondum ad effectum pervenisset id consilii. Poterat-ne pulchrius Aulae Academiae accedere ornamentum, vel aliud excogitari usui melius accommodum, quam si rarà loci opportunitate ita huic sapientiae templo jungeretur Hortus, ut eidem utrumque pateret obtutui, situlque vicinia efficeret, ut ex vestibulo ipsius Academiae despici possent medicatae Stirpes, spiraretque salubris ex odoratis Herbis, ex turis & balsami fruticibus, exhalans vapor per ipsa atria Minervae? Verum, ne ita quidem prospectum putabant satis egregio huic proposito; quin imò necessarium judicabant, quo loco consitae colerentur Herbae, ibi aedes exstruendas esse, quas primus Rei Herbariae Professor, tanquam praefens custos vigilque, incoleret.

Gravissimi Lugdunensis Civitatis Consules, bene gnari quan-

BREVIS HISTORIA (21)

quantum emolumentum Urbs ex incremento Academiae caperet, semper promovendae utriusque salutis intentissimi, protinus de hac re egerunt cum toto Senatu urbano, atque ipsam quidem rem sapienter suo consilio eò deduxere, ut, generoso certè instituto, Lugdunenses Magistratus aream hanc nobili huic fini sacrandam quam liberalissimè curaverint.

Nec mora: delineatio enim Hortique Academici instructio statim decreta fuit, totumque hoc negotium datum inprimis *Theodoro Augerio Clutio*, quem vernaculâ appellatione *Dirk Outgers Cluyt* Batavi appellant. Innotuit egregius hic Vir erudito Orbi eleganti quidem Libello, quem *de Curâ Apum* conscripsit ad Clarum *Carolus Clusium*, quem sanè inter optimos celebrant rei naturalis Scriptores. Rem ille eâ tempestate Pharmaceuticam profitebatur, eâque alebat gratiâ non medicatas modò, sed & rariores Plantarum in Horto proprio, peritissimus inde de Horti culturâ, atque in dignoscendis Stirpibus prudens, denique usu quoque egregiè exercitatus. Quae quidem dotes, ut singulares, multum praeterea adjumenti accipiebant ex necessitudine, quae inter ipsum intercedebat & *Clusium*, unde auxilii in ipsum consiliique utilissima dimanabat communicatio.

Omnem igitur industriam ille, scientiam omnem in hisce suam, indefessus agendo Vir honestus adhibuit, ut instrueret Plantis Hortum. Nec detrectavit ex proprio Horto in Academicum deferre, quas colebat, omnes, sed undequaque investigatas apud eos, qui harum rerum in Bataviâ gnari & studiosi, eò referebat, nunc vagando per inculta legebat natali solo, nunc pretio emtas alibi adduxit, quin & missas ex liberalitate aliorum addidit, iisque effecit rebus, ut recentissimè parata haec supellex Herbaria sufficeret, eodem adhuc nati Horti anno, quae praeberet locupletem Institutionibus Botanicis publice tradendis materiem, quas suo ipse pro modulo primus dabat.

Quam felici contigit fato talis Horto Conditor! urebat illum flagrans desiderium augendi semper Horti Plantas, perseverantissimum usque in supremæ diei finem & nun-

quam remissum hocce studium; callebat perfectè arte, quâ comparatas tueretur, atque ab interitu defenderet; ipsum verò Horti fundum bene colendo redderet fructuosum. Verum & aliud erat, quod plurimum profuit: fuit enim illi filius *Augerius Clutius*, cui proprium ad talia sacra ingenium dederat benigna Natura; id verò, ne datum frustra sine fruge periret, omni curâ sedulò agebat pater. Assiduo enim in Botanicis exercitio ita felicitatem sponte natam excoluit fovitque parens, ut inter principes Rei Herbariae Doctores relatus ex meritis suis fuerit. Satis id Magistris artis constat ex concinno ejus Libello, qui tribus chartis, sed doctis certè & laboriosis, enarrat superbientis Asiae Maldivensem coccum, adoratum fere Indiarum Regibus ob eximias, nec usquam ultrâ reperiendas, contra morborum venenatissimos, virtutes. Atque hunc quidem evulgavit ille anno demum 1639., postquam Amstelædami, faciendo feliciter Medicinam aegris, claram jam pridem celebritatem nactus fuerat. Caeterum a genitore suo *Theodoro* jam a teneris Elementa Botanica discens, profecerat jam puer eò usque in nobili hac Scientia, quantum patris facultas, recensque Horti instructio, patiebantur. Ut verò perficeret illum magis, magisque, voluit gnatum Germaniam, Gallias, Italiam, Hispaniam petere, eo quidem instituto, ut addisceret ibidem, quidquid porro ad Studii Herbarii perfectionem usquam ipsi occurreret. Quin & eo praeterea consilio, ut legeret ubique natali in solo Plantarum occurrentium bene matura semina, quae in incrementa Horti nostri patri suo omni studio mitteret, qui recepta Horto ditando fidus impendebat. Quantum verò profecerit per haec itinera, quâque famae laude *Clutius* junior inclaruerit, uno hoc discamus argumento: integro scilicet biennio hic in Monspelienfi celeberrimâ Galliarum Academia functus fuit Professorio Botanices munere, vicem gerens Clarissimi *Petri Richerii de Belleval*, qui eâ tempestate summa quidem cum gloria Rei Herbariae Professor publicus atque Cancellarius Academiae, tum verò valetudinarius, & viribus impar, dignum habuit *Augerium*, qui fungeretur officio ejus. Quantus verò

BREVIS HISTORIA. (23)

rô fuerit in Arte *Richerius*, id verò satis evincit Opusculum, quod anno 1598. edidit de *Onomatologia Stirpium Horti Monspeliensis*; longè verò magis constabit de summâ hujus Viri in hac Arte sapientia, quando dabitur aliquando videre descriptiones, atque iconas, Plantarum Alpinarum, earumque, quas alunt Pyrenaei Montes, quas quidem ipse perfecit eleganti sermone, atque, ut durarent, artificiosâ in aes incisione, quas tantis ornat in Itinerario Asiatico encomiis magnus *Tournefortius*. Peregrinus certè juvenis tanti Viri sententiâ laudatus, tantoque admotus ab eodem muneri, gloriosum magis Doctrinae suae testimonium haud facillè impetraverit. Perfunctus hac provinciâ, in Hispaniam profectus denuò, misit inde Leydam lectissimas Stirpes montanas; statimque magis accensus in Africam transfretavit, eâ solum gratiâ, ut pareret cupidini investigandi & ibi Plantas, inventasque transvehendi in Hortum Lugduno-Batavum. Ter captus, dum per deserta vagatur Barbariae, ter omni exutus suppellectile partâ tot laboribus, tot periculis, orbus quidem in patriam redux magna excidit spe, attamen prima sic jecit fundamenta, & firma profectò, Commercio Botanico per Orbem instituendo, colendoque, per itinera. Neque voluerunt Academiae Proceres, abire sine praemio egregia haec Viri industrii conamina: imò verò decreto sexto Maji anni 1607, iterumque decimo quinto Augusti anno 1608, geminatâ, &, prout ratio ejus temporis ferebat, amplâ fatis, remuneratione testati sint, quo favore officia Viri exceperint, quantum ejus meritis decus rependerint, quantisque excitaverint beneficiis Botanicorum animos, ut amplificandis Horti sui divitiis sedulam navarent porrò operam.

Natâ sic occasione Institutiones Herbarias inchoandi, auspiciando huic, & excolendo, muneri praefectus fuit primus *Gerardus Bontius*, iv. Septembris anni 1587. ex Auctoritate Publicâ justus, ut Studiosos Rem doceret Herbariam aestivo, Anatomen hyberno, tempore. Qui egregio deinde eventu conditionem accepit, occepitque Disciplinam, ita quidem, ut numerus Studiosorum Medicinae intra

tra quatuordecim annos increverit eò usque, ut plures jam hanc colerent Academiam, quam unquam Lovaniensem vel florentissimo ejus tempore frequentassent hactenus. Atque ita hanc provinciam ad emortualem usque illi annum 1599. pulchrè ornavit quum ad decimum & quintum Septembris diem eo anno mortuus sit.

Quum interim egregius hic Vir in Academia Anatomen, Medicinam Speculativam, & illam quae morbis internoscendis & sanandis occupatur, strenuè, & sedulò doceret, atque simul occupatissimam faciundà Medicinà vitam degeret, adjutore illi jam dudum ante suprema ejus opus fuit, qui, in partem curarum receptus, onus levaret. Cui quidem felicem occasionem maximus *Lipsius*, Academiae tunc Rector, Curatoribus obtulit, significans *Petrum Pavium* Amstelaedamensem, Medicinae Doctorem aptum, promptumque sponte, qui Herbas exponeret. Atque ille hanc ornatus commendatione, admotus est huic operi eà lege, ut semestri spatio fieret periculum in facultate Doctrinae ejus, successusque exploraretur. Quae illi conditio oblata nono Februarii 1589. anni, ilico summâ cum industriâ ab eo fuit inchoata atque exculta. Attamen geminatâ hanc curâ nondum satis se prospexisse arbitrati Nobilissimi Curatores & Consules, id sibi praeterea negotii datum crediderunt, ut Virum usu velocem, & materiae Medicae callentem atque divitem adjungerent. Nec mora. Quum enim *Bernardi Paludani* Medicinae Doctoris, qui suis in *Historiam Indiae Orientalis Linschotianam* Notis promulgatis inclaruit, anno 1599. fama increbuisse, eundem lauto stipendio, & immunitate aedium, Enchusâ, ubi habitabat, Lugdunum invitaverunt, ut ibidem capefferet Professionem Botanicam, Hortum necessariis instrueret Plantis, publicè doceret Rem Herbariam, viresque explicaret Stirpium & Fossilium. Contigit quidem haec oblatio duodecimâ Augusti 1591. Variis hic peregrinationibus multas Orbis oras sedulò perlustraverat; atque eà re simul comparaverat ditissimam stirpium, fossilium, animalium, terrarum, gemmarum, marporum, insectorum, coralliorum, & aliarum rerum na-

B R E V I S H I S T O R I A. (25)

ralium, copiam; jure itaque censebant e re Academicâ fore, si adeo celebrem, & medicamentariâ supellectile divitem, Virum Academiae conciliavissent. Verum votis suis ut exciderunt, refutante conditionem *Paludano*, duodecimo deinde Maji 1592 *Petrum Pavium*, quem anno 1589 ex *Lipsii* & *Heurnii* exquisitissimis commendationibus, Medicinae Professore creaverant, nunc elegerunt, cui committeretur cura Horti; mandantes ut conquireret, inque Hortum ferenda curaret, omnia, quae prece, pretio, permutatione, literis, ex quâcumque demum Orbis habitati plagâ, parare posset. Imò verò haud detrectarunt Magnifici Viri omnes Herbarum Cultores suo nomine publicè rogare, ut in necessitatem & ornatum Horti sui liberaliter impertirent illa, quibus carere illi commodè possent, promittentes se haec dona, ut gratissima sibi, omni occasione rependere velle.

Ut autem summum, quod habebant, pretium Horto suo conciliarent, rogaverunt *Joannem ab Hoogelande*, intimum *Clusii* amicum, ut periclitaretur, an hunc, Francofurti tum degentem in beato otio, omnium Botanicorum facilè principem, honestâ oratione atque lautis praemiis movere posset, ut curam Horti fusciperet in se, veniret Lugdunum, atque incomparabili ornamento amplificaret Academiae celebritatem. Quum verò ingenuus hic Vir, quo candidiorem vix ipsa queat formare virtus, honorificum onus & munus publicum quàm humanissimè repudiasset, causatus ingravescentis onera aetatis, & valetudinis infirmitatem tanto operi imparem, obtulit interim consilia sua, & dona herbaria, promittens ea se Horto daturum esse, quae ex omnibus Orbis culti plagis undique parare posset ab Amicis Botanicis lege commercii, atque reverentiâ amabilis Viri, cujus summâ in hac Disciplina ea tempestate auctoritas. Videbant Curatt. & Cff. quantum boni redundaret in Hortum a sapienti monitu, & liberali promisso, Viri, cujus ut summa erat in Arte sapientia, ita & intemerata fides. Censuerunt tamen praesentia Tanti Nominis carere haud posse Academiam: itaque geminato rogatu, honorarii decoris oblatione, atque stipendii magnitudine, ef-

*** * fe-

fecere, decimo quarto Julii 1592, ut provinciam suscepit ea lege, ut liber ab onere docendi, praesentia, consilio, commercio Botanico, prodesset Academiae, Horto, & illis quoque, ad quos spectabat publicum Botanica docendi munus. Nec remisit ille ullum tempus, quin fungi inciperet suscepto munere: scripsit enim ilicò ad Illustrem *Donsam* Curatorem Academiae de ordinandis iis, quae ad digerendam Horti suppellectilem pertinerent, misitque jam statim quinto Novembris 1592 rariora semina, quae Magnus Dux per suum Rhizotomum in Creta lecta *Clusio*, hic Horto, donabat. Ita incipiente, ita perpetuò non pergente modò, sed magis magisque promovendis commodis incumbente, cura & auctoritate Tanti Viri locupletatus brevi fuit Hortus, ut anno 1601 ultra octingentas Plantas possideret, atque inter has quidem exoticarum plurimas. Interim auctor fuit Curatt. & Cff. ut *Gerardus Bontius* & *Petrus Pavius* crearentur Professores simplicium, & Praefecti curae, culturaeque, Horti, ut partito labore alter feriatis diebus *Dioscoridem*, alium-ve Botanicis Scriptorem exponeret publicè, alter verò horam quotidie impenderet explicandis ostendendisque aestivo tempore Stirpibus, hyberno autem Fossilibus. Quod quidem negotium illi ambo simul aggressi sunt octavo Augusti 1598. En, quanta cura, impensa, molimine, opus fuerit ad condendum Hortum! Eneodem tempore praefectos ei constituendo Triumviros! Illi profectò, auspice imprimis & directore *Clusio*, ejus monitu, consilio, explicatione, prosperrime agere, nova conscribere, supplementa undique legere, Hortum ditare, Stirpes ostendere, cum descriptionibus Veterum conferre, vires indicare, usus exponere.

Interim octavo Februarii 1599 censuerunt Curatt. & Cff. aedificandum ad meridionalem Horti plagam solarium, quod hybernaculi effectum hyeme repositas fervaret exoticas, quae asperitatem brumae, sub inclementiori coelo, nostroque uliginoso atque frigido in solo, ferre nequeant: simulque ut in eo spectanda exhiberentur omnia, quae ex variis undique oris lecta Historiae Naturali ornandae atque am-

amplificandae prodesse possent; quod & deinde anno 1600 perfectum fuit.

Tumque primò edidit Clarissimus *Pavius* anno 1601 Catalogum Plantarum Horti, ejus delineationem, dimensionemque. Describens ejus aream ab Oriente in Occidentem 133, à Meridie in Boream 103 pedes porrectam, alere jam 800 Stirpes, quas assiduè novis, exoticisque imprimis, augebat *Clusius*.

Mortuo *Bontio* anno 1599, atque *Clusio* anno 1609, solus *Pavius* superfuit, qui summa industria, atque assiduo labore, juxta consilia *Clusiana* Hortum ornavit, auxit, Stirpesque explicuit. Defuncto deinde anno 1617 *Petro Pavio* successit in Re Botanica *Aelius Everhardus Vorstius*, qui jam anno 1599 *Bontio* in Professione Medica successerat. Vir novo huic muneri ornando aptissimus, ut in prior dudum clarissimus evaserat. Ille enim Lugduni Batavorum *Lipsii*, *Vulcanii*, *Tiarae* disciplina feliciter usus, Heidelbergae & Coloniae Agrippinae summorum Virorum doctrina imbutus, in Italia dein *Capivacii*, *Mercurialis*, *Aquapendentis*, *Costaei*, *Tagliacotii*, *Brasavolae*, *Catanei*, *Paterni*, *Zabarellae*, *Piccolhominei*, aliquamdiu Discipulus, in unum collegit, atque digessit, corpusculum, quidquid inter egregios Praeceptores sparsum fuit eruditionis Medicae. Neminem tamen diligentius coluit, nulli adhaesit magis assiduus, quam *Ulissi Aldrovando* Bononiensi. Huic enim ita conciliatus erat, ut hospitali mensa exceptus, inque familiaritatis intima admissus, ab eo hauserit ut ab *Aristotele*, *Theophrasto*, *Dioscoride*, & *Plinio*, sui seculi, quidquid Historiam Stirpium, Fossilium, Metallorum, Animalium, illustrare posset. Quibus sanè eximiis dotibus, pari cum diligentia junctis, effecit, ut prior Horti conditio non retrò lapsa, sed magis promota fuerit. Quum verò Clarissimus Vir anno 1624, & Octobri mense, fato cesserat, habuit ilicò successorem, qui Horto praeesset, filium suum *Adolphum Vorstium*, eodem quidem anno. Fuerat hic usus sapientia patris, atque aliorum in Academia Lugduno-Batava tum inelytorum Professorum, Arabica

imprimis edoctus & Graeca, ut aditum pararet sibi in ipsa penetralia Botanices. Quae duo mire postea profuerunt ad illustrationem Stirpium. Bloesius in Gallia *Pauli Renealme* Auditor Scientiam Herbarum severius excoluit, in Hortis atque Academiis Italiae planè perfecit. Itaque instructissimus ab omnibus, quorum usu promovetur Botanice, clarus ubique, Principibusque ipsis charus, cum Illustrissimo *Marco Antonio Mauroceno* a Serenissima Venetorum Republica ad Ordines nostrae Patriae Legato, ex Italia in Bataviam venit, statim ut rediit Professor creatus Tanti Viri praesentia decoratus fuit, quum Oratione publica inchoamenta muneris auspicaretur. Edidit ille anno 1633 *Catalogum Plantarum*, quibus tum Hortus instructus erat, quae accreverant in 1104, addiditque Indicem earum, quas circumfusa Lugduno prata, sabuleta, paludes, & rivi, indigenas alunt. Optimè functus munere, moritur decimo quinto Martii anno 1663. suffecit continuò Curatorum vigilantia *Florentium Schuyt*, ne carens procuratione Hortus detrimentum caperet. Atque ille quidem, cum anxietate intentus in commodae ejus, auxit numerosam Stirpium familiam, simul earum usum cum fructu exposuit, cujus quidem utriusque monumentum reliquit, postquam evulgaverat *Catalogum Plantarum* Horti, quibus is anno 1668 instructus spectabatur, subjuncto indigenarum Indice. Patet etenim Plantas plus ducentas & viginti adjectas fuisse ejus cura iis, quas in Catalogo suo *Adolphus Vorflius* enumeraverat.

Postquam verò & hic vita functus anno 1669, subeuntem habuit anno 1670 *Arnoldum Syen* Amstelodamensem, qui natus anno 1640, operoso labore, atque itineribus per Angliam, Gallias, Germaniam, institutis, Plantarum scientiam sibi comparaverat. lauta crebrò augmenta mox accessere Horto, quorum quaedam singulari Viri industriae, felicitati tempori alia, accepta ferenda sunt. Benigno quippe siedere fota tunc cum maximè increvit in Europa Stirpium tam cultus, quam historia. In Patria nostra Viri Illustres, auctoritate, scientia, artis amore, insignes dedita opera, junctis studiis, sumtu maximo, ex omnibus Orbis oris, omni

mo-

modo, inquirebant omne id, quod Plantae nomine cense-
tur. Nulla fere, vel bellica, vel oneraria, navis portu exire,
nullus vel illi gubernandae praefici, quin juberetur, roga-
retur-ve, ubique legere semina, effodere radices, depange-
re furculos, inferere vasis stirpes, atque probè servata
a corruptione in Bataviam devehere. Ibi statim pro natura
soli coelique nativi coli, educari, ad frugem perducì. Sic
privati, sic publici, in Hollandia Horti superbire, & com-
pendio spectandum dare, quidquid terra habet pulchri. Pri-
ma Reipublicae Batavae lumina, *Hieronimus Bevernink*,
Casparus Fagel, *Simon van Beaumont*, *Willem Benting*,
Adrianus van Rheede, qui Viri! quae Nomina! operosis-
sima diligentia suis deductas terras Batavo solo commissas
Plantarum speciosissimas aluerunt, ex quibus semper etiam
quaedam in Hortum Academicum delatae sunt. Quum ita-
que inclaruisset singularis *Syeni* in colendis exoticis diligen-
tia & industria, quam in Horto suo Gaudano ostenderat
elegantissimis harum deliciarum spectantibus, hac re non
modò celebratis Viris, sed & ipsis ubique Stirpium Pro-
fessoribus, admodum conciliatus fuit. Erat quippe in-
genio, arte, doctrina, facundia, moribus, politissimus.
Certatim hinc amicitiam Viri ambiebant, colebantque, *Mor-
isonus*, *Breynius*, *Commelinus*, *Herman*, quum ipse in-
terea magnos hosce in Republica Botanica Proceres venera-
bundo cultu, sincera amicitia, prosequeretur. Cernitis fieri
haud potuisse, quin omnia haec summo fuerint emolumen-
to Rei Hortensi. Maximè tamen quum *Paulus Herman*
anno 1672 ex Batavia solvens, Africam, Indiam, & Ceylon adiit
Plantarum investigandarum, explorandarum, atque describen-
darum ergò: quum enim procurante Amplissimo *Bevernink*,
ex consiliis *Syeni*, id imprimis acciderit, grata benefacti memo-
ria candidam animam impulit, ut quotannis ad hosce mitteret
selecta speciosissimarum Stirpium semina, radices, bulbos.
Quorum pars maxima semper Academiae cedebat ornamen-
to. In his verò totum occupatum atque pulcherrima quae-
que pro Horto molientem, mors fato prope xii Kal. No-
vemb. 1678 abstulit magnum Virum. Tumque statim xxi

Novembris 1678 Professor Botanicus creatur *Paulus Herman*, tum in beatissima Ceylanensium insula degens, totus in Rem Botanicam ibi intentus, atque in promovenda Historia Naturali actuosus; verum quum biennii fere spatio opus, antequam munere fungi oblato posset, constituerunt xi Maji 1679 *Petrum Hotton* ordinarium Medicinæ & Botanices Professore usque tantum in id tempus, quo *Herman* ex Indiis redux Professionem capefferet praesens, quam ille acceptam officii conditionem sustinuit usque ad viii Aug. 1680; quando a Curatt. & Cff. quam humanissimè & honorificè gratiae illi actae pro rebus laudabiliter gestis pro Academia, & promissis satis amplis, quod omni datâ occasione re ipsâ id agnoscerent, honoratus Ille fuit.

Adfuit igitur exspectatus ab oris Indicis *Paulus Herman*. Ille Hallensis Saxo, natus xxx Jun. 1640, à tenerâ aetate, ipsoque ingenii sponte nato impetu, Plantarum contemplatione captus, Wittenbergae, Lipsiae, Jenae, Lugduni-Batavorum, Romae, Patavii, Doctrinâ Herbariâ imprimis, & Medicâ, imbutus, in Patavino Lycaeo ordini Medicorum insertus anno 1670. Inde peragrata Italiâ, in Bataviam reversus, ubique Scientiae Herbariae laude clarus, omnibus Rei Herbariae Professoribus, Cultoribus, Studiofis, in summo honore, deinde octo annorum continuatâ curâ acquisitâ Indiae, Africae, Ceylani, Herbarum cognitione incomparabilis, incredibili exspectatione exceptus, summo cum applausu Orationem habuit inchoandae Professioni sacram anno 1680 de usu Hortorum, atque natâ inde oblectatione. Atque hic ab infante duratus Vir, omni experimentorum periculo inspectus, maximae curae homo, tenacissimae memoriae, & cui cum animi habitu praeclaro, corporis quoque inerat firmitas. Mox noctes, diesque, totum se dedit amplificandis, demonstrandis, explicandis, describendis, depingendis, atque evulgandis Plantis, quas in Horto deprehenderat, adduxerat, aut quotidie undequaque recentes addebat. Dictu impossibile atque incredibile est, quot expensas fecerit, quot itinera suscepit, quot deambulationes instituerit, quot literas scripserit,

pferit, quot commercii, & permutationum, modos adhibuerit, quot volumina exaraverit, quot tabulas pingendas curaverit, ut nova semper divitiarum accessione splendorem Academiae pulchriorem conciliaret. Ostendit ergo ipso anno 1681 in Horto Academico Botanices Studiosis 1537 Stirpes, additis simul, quae vires spectarent usumque, observatis accuratissimis. Urebat autem nobilem Virum, quod sine ullo ordine, tumultuariò consitus, Hortus, inutili repetitioni, frustraneo labori, operosae & cassae difficultati discantibus praeberet occasionem! deplorabat variae & vastae Disciplinae desperatione conterritos juveniles animos experiri nolle, quod se assequi posse diffidunt, videbat inde retardari optimorum studia. Praecipua ideo cura ei fuit, demereri delicatiores Juvenum animos, credebatur facilitatis amoenitate, & illecebris his capiendos, ut concinnitate methodi deceptos, atque affinitatis tesseriis callentes, brevi doceret. Nec ergo requievit, donec, productis tertium anno 1685 Horti pomœriis, ad *Morisonianas* recens tum in publicum evulgatas leges Horti Plantas digessisset, atque anno statim 1689 emisisset in lucem, quando tum publicè, tum privatè 3029 Plantas exhibuit, quarum deinde numerum auxit perpetuò. Vide, mi Lector, quid faciat *Herman* octo annorum spatio! incredibile sit, verum tamen est. Ille unus angusto hoc tempore plura & pulchriora in Hortum intulit, quam *Bontius*, *Clutius*, *Pavius*, *Clusius*, *Vorstii*, *Schuylius*, *Syenus*, spatio centum & quinque annorum colligere tanto molimine, tantâque arte, potuerant. Sed & Curatt. & Cff. magni Viri consiliis, monitis, votis, obsequi, impensas itineribus, commerciiis, aedificandis hypocaustis, hybernaculis, liberaliter suppeditare. Ordinauerunt hybernacula tum spatiosa, & multa, quae luminibus Austro expositis instructa, altisque erecta parietibus, tutissimo adversus brumam munimine Stirpes defenderent; utque altis fenestris tepore irradiantis solis inspiraretur fovens calor, frigus verò intolerabiliter horrens arceretur, dispositis simul aptè fornacibus, ut urentissimi tempore gelu, calore & frigore intra haec temperatus aer suaviter teperet.

Ipse

Ipse autem in Gallias jam, jam in Britannias, jam in Germanias, feriarum tempore profectus, emit, atque in Hortum adduxit plurima. Quibus rebus ut ditaverit Hortum, doceat *Catalogus*, quem anno 1687 edidit in octavo apud *Cornelium Bouteysteyn*. Doceat *Flora*, quae anno 1690 edita est apud *Fredericum Haaring*. Doceat *Paradisi Batavi* Prodromus, quem ex dictatis Viri Discipulus edidit post *Scholam Botanicam* anno 1690, licet non sine multis erroribus; quos in hoc ipso Libello propria *Hermanni* manu correctos, una cum additamentis quam plurimis, possideo. Doceat *Flora altera*, quam anno 1695 inchoantem, & edentem jam usque ad 129 paginam supremus occupavit dies. Doceat *Paradysus Batavus*, quem posthumum Illustris edidit Vir, atque in Botanicis facilè princeps, *Gulielmus Sherard*, cui chorus assurgit omnis Botanicorum. Et quidem intentum majoribus 25 Januarii anni 1695 mortuum luxerunt omnes, quibus eruditio, scientia rerum naturalium, maximè Botanices, quibus Chemia, nam illi jam Professor designatus erat, quibus Medicina, candor, simplicitas, industria, benevolentia, quibus denique virtus, erant in deliciis. His enim ita ornabatur *Paulus Herman*, ut vix reliquerit superstitem in quo tam multiplici, tamque insigni, fulgerent praestantia.

Petrus Hotton natus Amstelædami xviii Junii anno 1648, ibidem literis humanioribus summo cum profectu imbutus, deinde in Academiâ Lugduno-Batavâ Linguis, Historiis, Antiquitatibus, Philosophicis, Medicis, maximè Botanicis magno cum fructu operam dedit, atque ibidem anno 1672, legitimè ordini Medicorum adscriptus, Artis Medicae felici exercitio, atque Disciplinae imprimis Herbariae gloria, inclaruit: eximiè autem spectatum se dedit biennio illo, quo munere publico functus ante *Hermanni* appulsum fuerat. Quare deinde Amstelædamum Lugduno reducem anno 1692 Horto suo instructissimo, atque incomparabili certè, praefecerunt Nobilissimi atque Amplissimi urbis Amstelædami Consules. Ibi sollicità curâ, assiduâ vigilantia, judicio acri, effecit, ut Hortus ille pulcherrimus ad leges

artis digestus evaserit inter praecipuos Europae maximè spectabilis. Quibus ergo omnibus contigit, ut nono Maji anno 1695 denuò creatus fuerit Medicinae & Botanices in Academia Lugduno-Batavà Professor ordinarius. Cui quidem provinciae administrandae idoneus erat, solusque par, qui vacuum Hermannò sedem dignè & decorè impleret. Quam maximè quum judicio acerrimo, eruditione Botanices admodum singulari, & vix in alio reperiendâ, praestaret, huicque promovendae totum se dederet. Quin etiam ob egregiam in omnibus liberalibus Disciplinis sapientiam celeberrimis in Europâ Rhizotomis venerabilis, gratusque, ipse Regiae in Britannii & Caesareae in Germaniâ Societatis Membrum, undique rarissima accepit semina, suppeditantibus ad ejus vota certatim optimis Magistris. Unde profectò opes Horti locupletando, atque literarum commercio in omnes oras innotescendo, Academiae honori fuit summo atque emolumento. Emendavit praeterea quam optimè plurima in ordine, quo Stirpes Horti digesserat *Hermannus*. Quum enim suae aetatis prudentissimos Botanicos de quâque re consuleret, atque Veterum Commentarios sedulò scrutaretur, lentoque ipse gradu procederet *Hottonus*, cuncta sapienter expendens, atque ad omnia circumspiciens, omnesque vias, primae curae diffidens semper, calleret perfectissimè cultas à principibus Herbariorum, tandemque & *Josephi Tournefortii* evulgatam Methodum post *Hermanni* facta excussisset, *Syntaxin Herbariam* perfectissimam in Horto Academico perfecit. Utinam Scripto evulgasset! Sed summo Rei Herbariae detrimento nec edidit ipsa, neque post praematurum magni & ingenui Viri fatum obtineri potuit, quod manes ejus decorasset & demeruisset publicum. Occidit ille virtutis sincerus Cultor & sapientiae illâ fatali Botanice & Stirpibus hyeme, quae urentissimo gelu calamitosissimam stragem dedit anno 1709; feralis enim illi dies decimus Januarii.

Atque ita, post praeclaros hosce Viros, ejusdem anni initio 1709, ego procurandis Horti commodis admotus, sensi, quam procul abessem ab eâ perfectione, quam in Decessoribus admiratus cum reverentiâ fueram. Et quotidie, dum

*** ** me-

(34) *HORTI BREVIS HISTORIA.*

mecum horum merita venerabundus colo, magno deputo honori ad exemplum eorum animum meum formare docendique methodum, ut quidpiam laudabile praestare queam. Dumque aequare hos mihi non datur, nunquam, menti sanitas si constabit meae, exsuperare illos sperabo. Vivam contentus hâc sorte quam maxime, si imitari utcumque praeclaros Auctores conantis mei voto eventus aliquo tantum modo subscripserit.

F I N I S.

C O M P E N D I A
CITATORUM AUCTORUM
ita intelligentur.

Alp. Exot. de Plantis exoticis libri duo Prosperi Alpini. Venet. 1627. in 4.

Alp. Egypt. de Plantis Aegypti Prosperi Alpinus. Venet. 1592. in 4.

Ac. Reg. Sc. Momumenta & Historia Academiae Regiae Scientiarum in Galliis. Gallicè in 4.

A. R. Par. Commentarii ad Historiam Plantarum ordinandam, Auctore Dodart. in fol. & in 8.

Act. Hafn. Barth. Thomae Bartholini Acta Medica & Philosophica Hafniensia. in 4.

Aldin. & Aldin. Hort. Farn. Exactissima Descriptio rariorum quarundam Plantarum Horti Farnesiani, Tobiae Aldini. Romae 1625. fol.

Ambrosin. Hyacinthi Ambrosini Phytologiae Partis primae Tomus I. Bonon. 1666. fol.

Amman. Char. Pl. Ammanni Character Plantarum. Lips. 1685. in 12.

Amman. Sup. Bot. Ammanni Suppellex Botanica. Lips. 1675. in 8.

Anguill. Simplici dell' Eccellente M. Luigi Anguillara. Venet. 1561. in 8.

Banist. Joannis Banisteri Plantarum in Virginia observatarum Catalogus. Apud Raj. H. 1626.

Barr. Ic. & Borell. Plantae per Galliam, Hispaniam, & Italiam, ob-

COMP. CITAT. AUCT. ITA INTELLIG.

- observatae a Jacobo Barrelliero, editae a Viro Clarissimo Antonio de Jussieu. Paris. 1714. fol.
- Bellon. Obs.* Bellonii Observationes Gallicè editae. Paris. 1554. 1588. in 4. Latinè in Clusii Exoticis.
- Bellon. Conif.* Petri Bellonii de arboribus coniferis &c. Paris. 1553. in 4.
- Besl. Fascic.* Basilii Besleri Fasciculus rariorum &c. Norimberg. 1616. fol.
- Besl. Gazophy.* Gazophylacium rerum naturalium Michaëlis Ruperti Besleri. Norimb. 1613. fol.
- Bocc. N. Rech. & Obs.* Nouvelles Recherches & Observations, &c. Pauli Boccone. 8.
- Bocc. Rar.* Icones & Descriptiones Plantarum rariorum &c. Pauli Boccone. Oxon. 1674. in 4.
- Bocc. Mus. I. & II.* Museo Pars I. & Museo di Phisica, di Piante, &c. di Paulo Boccone. Venet. 1697. in 4. 2. Vol.
- Bod. a Stap.* Theophrasti Eresii de Historia Plantarum libri decem Joannis Bodaei à Stapel. Amstel. 1644. fol.
- Bont. & Bont. Hist.* Jacobi Bontii Historia Naturalis & Medica Indiae Orientalis. Amst. 1658. fol.
- Boet.* Boëtius de Boot de Gemmis & Lapidibus. in 8.
- Bot. Monsp.* Botanicum Monspeliense, Auctore Petro Magnol. Monspel. 1686. in 8.
- Bot. Monsp. App.* Botanici Monspeliensis Appendix. Id. Ib.
- Breyn. Cent. I.* Jacobi Breynii Exoticarum Centuria prima. Gedani 678i.
- Breyn. Prodr. I. & II.* Jacobi Breynii Prodomus Fasciculi rariorum Plantarum primus. Gedani 1680. Secundus. Gedani 1689. in 4.
- Boym. Fl. Sin.* Boymii Flora Sinica.
- Caesalp.* Andreas Caesalpinus. de Plantis. Flor. 1583.
- Camerar. Hort.* Hortus Medicus & Philosophicus, Auctore Joanne Camerario. Francof. 1588. in 4.
- C. B. Phytop.* Caspari Bauhini Phytopinax. Basil. 1596. in 4.
- C. B. P.* Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici. Basil. 1623. & 1674. in 4.
- C. B. Prodr.* Caspari Bauhini Prodomus Theatri Botanici. Basil. 1671. in 4.
- C. B. Tb.* Caspari Bauhini Theatri Botanici liber primus. Basil. 1665. fol.
- Castor. Durant.* Herbario nuovo di Castore Durante. Rom. 1585. fol.
- Clus. App.* Clusius in Appendice Historiae Plantarum.
- Clus. App. alt.* Clusius in Appendice alterâ ad librum VI.
- Clus. Cur. Post.* Clusii Curae Posteriores. Antwerp. 1611. fol. & 4.

COMPENDIA CITATORUM

- Clus. Hisp.* Clusii rariorum Plantarum in Hispaniâ observatarum Historia. Antwerp. 1576. in 8.
- Clus. Exot.* Caroli Clusii Exoticorum libri decem. Antwerp. 1605. fol.
- Clus. Hist.* Caroli Clusii rariorum Plantarum Historia. Antwerp. 1601. fol.
- Cod. Witsen*, notat omnes Codices Witsenii, in quibus omnibus penicillo pictae, ultra 1500, Plantae Africae, & Asiae coloribus vivis, quas olim mihi commodavit Vir Amplissimus Nicolaus Witsen.
- Col. in Rech.* Columna in Rechum in Hernandez. fol.
- Col. p. 1.* Fabii Columnae Stirpium *ἐκφρασις* pars prima. Romae 1616. in 4.
- Col. p. 11.* Fabii Columnae *ἐκφρασις* pars altera. Romae 1616. in 4.
- Col. Phytob.* Fabii Columnae Phytobasanos. Neap. 1592. in 4.
- Commel. Indig.* Catalogus Plantarum indigenarum Hollandiae, Auctore Joanne Commelino. 1685. 12.
- Commel. H. Med. Cat.* Catalogus Plantarum Horti Medici Amstelædamentis, Auctore Joanne Commelino. Amstel. 1689. in 8.
- Comm. Rar.* Caspari Commelini Horti Medici Amstelædamentis Plantae rariores, & exoticæ. Lugd. Bat. 1706. 4.
- Comm. Prael.* Caspari Commelini Praeludia Botanica. Lugd. Bat. 1703. 4.
- Comm. Pl. Us.* Caspari Commelini Horti Medici Amstelædamentis Plantarum usualium Catalogus. Amstelæd. 1715.
- Cordi.* Valerii Cordi Historiæ Stirpium. Lib. IV. Argent. 1561. fol.
- Cord. in Diosc.* Valerii Cordi Annotationes in Dioscoridem.
- Corn.* Jacobi Cornuti Plantarum Canadensium Historia. 1635. 4.
- Dod. P.* Remberti Dodonæi Pemptades sex. Antwerp. 1616. fol.
- Dod. Mem.* Memoires pour dresser l'Histoire des Plantes.
- Donat.* Trattato di Simpli &c. di Antonio Donati. Venet. 1631. 4.
- Ferrar. Hesp.* Joannis Baptistæ Ferrarii Hesperides. Romae 1646. fol.
- Ferrar. Fl. Cult. & Ferr.* Joannis Baptistæ Ferrarii de florum culturâ. Romae 1633. 4.
- Flor. 1.* Florae Lugduno-Batavae Flores, &c. Lugd. Bat. 1690. 8.
- Flor. 2.* Flora Lugduno-Batava a Clarissimo Paulo Hermannò edita tantum usque ad pag. 129.
- Gazoph. Rup. Best. & Rar. Mus. Best.* Rariora Musæi Besleriani &c. edita a Lochnero. 1716. fol.
- Ger. Joan.* Gerardi Historia Plantarum. Lond. 1597. fol.
- Gesner. de Fig. Lap.* Conradi Gesneri de rerum fossilium, lapidum, &c. Liber. Tiguri 1565. 8.
- Gesner. Hort.* Gesnerus de Hortis Germaniæ editus cum Historiâ Stirpium Cordi. fol.

AUCTORUM ITA INTELLIGANTUR.

- Grew. an. of pl.* Nehemias Grew The Anatomy of Plants.
- Guiland.* Melchior Guilandinus de Papyro. 4.
- Hernand.* Rerum Medicarum novae Hispaniae Thesaurus ex relationibus Francisci Hernandez. Romae 1628. fol.
- H. Amst.* 8°. Vide Commel. H. Med. Cat.
- H. A. 1. & 2.* Horti Medici Amstelædamensis rariorum Plantarum Historia, Auctore Joanne Commelino. Tomus I. 1697. fol. Auctore Casparo Commelino. Tomus II. 1701. fol.
- H. Beaum.* Horti Beaumontiani Catalogus Plantarum exoticarum. Hagae 1690. 8.
- H. Eyst.* significat Hortum Eystettensem; in citatione O significat ordinem. Dein numerus primus folium, Figuram designat alter.
- H. C.* Hortus Catholicus, Auctore Francisco Cupani. Neapoli 1696. 4.
- H. C. Suppl.* Horti Catholici Supplementum primum.
- H. C. Suppl. Alt.* Horti Catholici Supplementum alterum, Auctore Francisco Cupani. Panor. in Sicilia. 1697. 4.
- Herm. Cat. mt. Pl. Afr.* Pauli Hermanni catalogus manuscriptus Plantarum Africanarum.
- Hieron. Brunsw.* Hieronymi Brunswicensis Apodixis Germanica. Argent. 1531. fol.
- H. L.* Hortus Academicus Lugduno-Batavus, Auctore Paulo Hermann. Lugd. Bat. 1687. 8.
- H. L. App.* Ejusdem Appendix, ibidem.
- H. Mal.* Hortus Malabaricus, duodecim voluminibus in folio. Amstel.
- H. R. Monsp.* Hortus Regius Monspeliensis Petri Magnol. Monspel. 1697. 8.
- H. R. Par.* Hortus Regius Parisiensis. Paris. 1665. fol.
- H. Edinb.* Hortus Medicus Edinburgensis, Auctore Jacobo Sutherland. 8.
- Hort. Mauroc. & H. Maurocen.* Catalogus Plantarum Horti Illustrissimi Maucoceni. Parav. 1713. 8.
- J. B.* Joannis Bauhini Historia Plantarum universalis, tribus voluminibus. Ebroduni 1650. fol.
- Imper.* Historia Naturale di Ferrante Imperato. Neapoli 1650. fol.
- Ind.* Index Plantarum, quae in Horto Lugduno-Batavo reperiuntur, conscriptus ab Hermanno Boerhaave. Lugd. Bat. 1710.
- Joncq. Hort.* Dionysii Jonquet Hortus. Paris. 1659. 4.
- Jonst. Dend.* Joannis Jonstonii Dendrologia. Francof. 1662. fol.
- Jussieu.* Antonius Jussieu Lugdunensis, Facultatis Monspeliensis & Parisiensis Doctor Medicus, Regiae Academiae Scientiarum Membrum dignissimum, Professor Botanices in Horto Regio Parisino, Botanicus eruditissimus. Cujus eruditioni scientiae plurimum debent, cujus liberalitati multa Hortus accepta fert.

COMPENDIA CITATORUM

- K.** Petrus Kolaart, Plantarum peritissimus, earumque eximius Cultor, inter Batavos, & Horto & mihi saepe utilis.
- Lipp. & Lippi.** Augustinus Lippi, Medicus Parisinus.
- Lob. Advers.** Stirpium Adversaria nova, Auctoris Petro Penâ & Matthiâ de Lobel. Antw. 1576. fol.
- Lob. Ic.** Icones Stirpium. Antw. 1587. fol. formâ longâ.
- Lob. Obs.** Stirpium Observationes Matthiae de Lobel. Antw. 1576. fol.
- Lugd.** Historia generalis Plantarum a Dalechampio elaborata. Lugd. 1586. 2 Vol. fol.
- Lugd. App.** Ejusdem Appendix, ibidem.
- Malp. An. Pl.** Marcelli Malpighii Anatome Plantarum. Lond. fol. numerus primus paginam, alter Iconem, notat.
- Markgr.** Georgii Marckgravii Historia rerum naturalium Brasiliae. Lugd. Bat. 1648. fol.
- Matth.** Petri Matthioli Opera illustrata a Casparo Bauhino. Basil. 1674. fol.
- Mentz.** Index nominum Plantarum multilinguis, operâ Christiani Mentzelii. Berolini 1682. fol.
- Mentz. Pugill.** Ejusdem Pugillus rariorum Plantarum. Ibid.
- Mercat. Metall.**
- Merret. Pin.** Merret Pinax rerum naturalium Britanniae. Lond. 1667. 8.
- M. H. 1. 2. 3.** Plantarum Historia universalis, Auctore Roberto Morison. Oxon. 1679. 1680. 1699.
- M. H. R. Blæs.** Hortus Regius Blœsensis auctus, Auctore Roberto Morison. Lond. 1669. 8.
- M. Prael.** notat eundem Librum, five Praeludia Botanica.
- M. U.** Umbelliferarum Plantarum distributio nova, Auctore Roberto Morison. Oxon. 1679. fol.
- Monti.** Josephus Monti, Aromatarius & Rhizotomus, eruditus, peritusque, Bononiae, qui multa Horto suppeditat.
- Munting. Aloïd.** Muntingii Aloïdarium. Amstel. 1680. 4.
- Munting. Brit.** De verâ Antiquorum Britannicâ, Auctore Abrahamo Muntingio. Amstel. 1681. 4.
- Munting. Hist.** Muntingii Phytographia curiosa. Amstel. 1711. fol.
- Munt. Prax.** Waare Oeffening der Planten, door Abraham Munting. Amsterd. 1682.
- Musaei Calceolar.** Musaeum Calceolari. fol.
- Musaei Zeylan.** Pauli Hermanni Musaeum Zeylanicum. 8.
- Officin.** Officinarum.
- Par. Bat.** Paradisus Batavus. Pauli Hermanni. Lugd. Bat. 1698. 4.
- Par. Bat. App.** Paradisi Batavi Appendix. Ibidem.

AUCTORUM ITA INTELLIGANTUR.

- P. B. Pr.* Paradisi Batavi Prodomus.
Park. Par. Paradisus terrestris Parkinsonii. Lond. 1629. fol.
Park. Th. Theatrum Botanicum Parkinsonii. Lond. 1640. fol.
Petiv. Ind. Index Plantarum in Hortis Angliæ. Jacobi Petiver. in actis Soc. Reg. Britann.
Pison. H. Gulielmi Pisonis Historia naturalis Brasiliæ. Lugd. Bat. 1648. fol.
Plot. Hist. Nat. Staff. The natural History of Staffordshire &c.
Plukn. Alm. Almagestum Botanicum, Auctore Leonardo Pluknetio. Lond. 1696. fol.
Plukn. Amalb. Amaltheum Botanicum, Auctore eodem. Lond. 1703. fol.
Plukn. Mantiff. Mantissa Almagesti Botanici. Lond. 1700. fol.
Plukn. Phyt. Phytographia ejusdem. Lond. 1691. 1692. fol.
Plum. Fil. De Filicibus Americanis Carolus Plumier. Paris. 1705. fol.
Plum. N. Pl. G. Nova Plantarum Americanarum Genera ejusdem. Paris. 1703. 4.
Plum. Pl. Am. Descriptio Plantarum Americæ ejusdem. Paris. 1693. fol.
Pon. Bald. Monte Baldo descritto di Giovanni Pon. Venet. 1617. 4.
Raj. Hist. Joannis Raji Historia Plantarum Tomi tres. Lond. 1686. 1704.
Raj. Hist. App. Ejusdem Historiæ Appendix.
Raj. Meth. Methodus Plantarum emendata & aucta, Auctore Joanne Rajo. Lond. 1703. 8.
Raj. Syn. Synopsis Stirpium Britannicarum. Lond. 1696. 8.
Rand. Isaacus Rand, Botanicus accuratus, atque Praefectus dignissimus Horti Chelseyani, Londini. Cujus officiis multa Hortus debet. fol.
Riv. in. Introductio generalis in Rem Herbariam, Auctore Quirino Rivino. Lips. 1690. 1699. fol.
Roch. Rochefort Description des Antilles de l'Amerique. 4.
Salv. & Salvad. Joannes Salvatore, Vir in Re Herbariâ, Medicâ, & in Historiâ naturali, versatissimus; cujus amicitia & liberalitas, saepe & Horto, & mihi, profuit.
Scal. Exerc. Julii Caesaris Scaligeri Exercitationes in Theophrastum.
Sch. Bot. & S. B. Par. Schola Botanica Parisina. Amstel. 1689. 8.
Sher. Gulielmus Sherard.
Sloan. Cat. Jam. Hans Sloane Catalogus Plantarum Insulae Jamaicae. Lond. 1696. 8.
Sloan. Jam. Idem de Historiâ Naturali Jamaicae. Lond. 1707. fol.
Sterb. Th. Fung. Sterbeek Theatrum Fungorum. 4.
Sterb. Citrei. Sterbeek Citricultura. 4.

Swert.

COMP. CITAT. AUCT. ITA INTELLIG.

- Swert.* Emanuelis Swertii Florilegium. Francof. 1612. fol.
Tab. Germ. Historia Plantarum Germanicè scripta, Auctore Tabernaemontano. Franc. 1613. fol.
Tab. Ic. Tabernaemontani Icones Plantarum. Francof. 1590. fol. in formâ longâ.
T. Institutiones Rei Herbariae, Auctore Josepho Pitton Tournefort. Paris. 1700. 3 vol. 4.
T. App. Eiusdem Appendix Ibid.
T. C. Corollarium ejusdem.
T. Voy. Tournefort Voyage par le Levant. Paris. 3 vol. 4.
Triumf. Syll. Syllabus Plantarum Horto additarum Medico Romano. Rom. 1688. 4.
Vaillant. & Vaill. Sebastianus Vaillant Botanicorum accuratissimus, Plantarum in Horto Regio Parisino Demonstrator, Academiae Regiae Scientiarum Membrum dignissimum. Cujus peritiae Res Botanica, cujus liberalitati Hortus, plurimum debet.
Vaill. Disc. Discours sur la Structure des Fleurs. &c. par Sebastien Vaillant. Leide 1718. 4.
Virid. Lus. & V. Lusit. Viridarium Lusitanicum Gabriëlis Grisley. Ulissipone 1660. 12.
Volk. Volkameri Flora Noribergensis. Noribergae. 1700. 4.
Zan. Hist. & Zan. Istoria Botanica di Giacomo Zanoni. Bologna 1675. fol.

S I G N I F I C A T

- Aq.* Plantas aquaticas, in hydrophylaciis servandas.
Co. eas, quae, radice nimis repentes, vasis coercendae.
H. in hybernaculis servandas, frigoris impatientes.
Praegn. in solo fimi equini calore tepente serendas.
R. D. ramis depactis propagandas.
R. S. quarum radices hyeme arenâ siccâ servandae.
Subm. quarum propagatio fit ramorum submersione in terram.
T. hyeme tegendas impositu foliorum siccorum campanis vitreis coercitorum.
 — Lineola numero Plantae supposita notat officinalem.
 † Significat indigenam Bataviae Stirpem.



STIR.



STIRPIUM SIMPLICISSIMÆ. PLANTÆ SUBMARINÆ.

Quæ sub aquis, aliis corporibus innatæ, vegetant, ex proprio suo semine deciduo, atque basi diversâ excepto, simplici, humido; inconspicuo hætenus flore, ovario, semine ipso vix distinctè apparente oculis.

1.

LITHOPHYTA.



Fabricâ simplici, durâ, coralloïde, fragili, allisu sonorâ, vi ignis in calorem mutandâ, cum acidis effervescente.

FUNGI LAPIDEI MARINI. *Raj. H. 1. 66. 111. 5. meth. 3.*

forma fungi, & sæpe lamellæ.

1. Fungus; coralloïdes; encephaloïdes; fuscus; gyris in medio fulcatis, lamellatis, serratis. *Fungus; maritimus; coralloïdes; undulatus. Bocc. N. Rech. & Obs. 142. Placenta; coralloïdes; albicans; sinuosa. Gazoph. Rup. Besl. Rar. Mus. Besl. T. xxvi. F. 2. Lapis; fungites; cerebriformis. Raj. H. app. 1850. Astroïdis genus 111. Boot. 298. Erotulos; five ampicome. Mercat. Metall. 314.*

2. Idem; ex fusco flavescens; fabricâ in omnibus tenuiore.

3. Idem; gyris & fulcis tenuioribus, elegantioribus, magis numerosis, in medio non fulcatis.

4. Fungus; coralloïdes; encephaloïdes; rugis subnigris, lamellis candidis, solidis; corallii rubri nascentis dispersa gerens

A

stigma-

stigmata. *Massa*; coralloïdes; albicans; porosa; maris fluctuationem egregiè representans. *Gazoph. Rup. Besl. Rar. Mus. Besl. T. xxvi. F. 1. Astroïtes; undulatus; major. Bocc. N. Rech. & Obs. 142. 2.*

5. Fungus; coralloïdes; encephaloïdes; rugis lamellatis, & diaphragmate divisis; gyris solidis; albus; elegans; corallium rubrum ex fissuris, magnâ copiâ, ubique promens.

6. Idem; longè elegantior; dehiscens, & corallia rubra promens.

7. Fungus; coralloïdes; encephaloïdes; ingens; fere sphaericus; gyris & interstitiis subtilissimè & elegantissimè lamellatis; corallifer.

8. Fungus; coralloïdes; encephaloïdes; gyris, & sulcis, maximis, lamellatis; rupi matri adhuc adhærens; cum massâ corallii, fragilis, ramosi, albi.

9. Fungus; coralloïdes; pileatus; lamellatus; fungus; saxeus; marinus; lapideus. *Clus. H. 124. fungus; lapidosus. Gazoph. Rup. Besl. fungus; marinus; lapideus. Rar. Mus. Besl. T. xxviii. T. xxvi. F. 3. fungi lapidei. J. B. 813. Ic. 1. 2.*

10. Fungi; aculeati; albi & fusci. an verò bases ossæ quorundam piscium mollium, ut os sepiae? *Lapidis asellorum similis. Rar. Mus. Besl. T. xxxix.*

11. Fungus; coralloïdes; astroïtes. *Fungus; lapideus; porosus. Rar. Mus. Besl. T. xxviii. astroïtidis genus. I. Boot. 298.*

12. Fungi; coralloïdis; astroïtidis; variæ species, colore, mole, stellarum figurâ, diversi; variis rupibus corallinis accreti, & inhærentes.

13. Fungus; coralloïdes; pezicæ formâ; perforatus poris, qui lamellis radiatis interstinguuntur; undas maris referens.

14. Fungus; coralloïdes; pezicæ formâ undulatus, sulcatus, lamellatus. *fungus; saxeus; minor. Rar. Mus. Besl. T. xxxviii. fungus; saxeus; minor. Clus. Exot. 125. fungus lapideus; major; undulatus. Sloane Jam. T. 18. Fig. 5. fungus in Nilo natus. J. B. 3. 813. Ic. 3.*

15. Fungus; coralloïdes; asteriscis cælatus. *fungus; lapideus; striatus. Rar. Mus. Besl. T. xxviii. astroïtes. Mercat. Metall. 235.*

16. Fungus; coralloïdes; foliaceus; agarici intybacei formâ.

17. Idem; laminis maximis. *Muscus; petrosus; Quorundam; Alcyonium; V; Dioscoridis. Imper. 642.*

Inhæret rupi, cui spongiæ, fungi astroïtides, fungi striati, ostrea, adcreta spectantur.

18. Idem; laminis magis undulatis; ornatur iisdem ac præcedens.

19. Fungus; coralloïdes; striatus; agarico intybaceo similis. *Vesicaria; marina; non ramosa; constans ex vesiculis formâ infundibuli, membranâ undulatâ exstante coronatis. Sloane Jam. T. 24. F. 3.*

20. Fungus; coralloïdes; albus; elegantissimè in gyros assurgens, interstitiis lamellatis.

21. Fungus; marinus; lapideus; boletum Tournefortianum referens; colore cinereo. *Pisolithi species. Mercat. Metall. 284.*

CORALLIA. *Raj. meth.* 3. *H.* 1. 60. 111. 2. *T. in Acad. Reg. Sc.* 1700.

*Forma solida, arbusculæ, vel suffruticis cortice muscoso
tecti; in apice bulla semine lacteo fæta.*

1. Corallum; rubrum. *T.* 572. 339. *Mercat. Metall.* 114. *Corallium rubrum.* *J. B.* 3. 803. *Corallium.* *Lob. Ic.* 251.
2. Corallum; album; pumilum; nostras; *Raj. Sloane Jam. T.* 18. *F.* 2.
3. Idem; candidum; magis brachiatum; & tenuius.
4. Idem; cinereo fusco colore ex Hispaniâ.
5. Idem; crassius ex Hispaniâ.
6. Corallum; cinereum.
7. Corallum; album; tenue; fragile; in cespitem concretum.
8. Idem; ramosius longè.
9. Corallum; album; fragile; polyschides; ramusculis contiguis dumosum. *M. H.* 3. *T. ult.* 24. magnitudine parvæ rupis.
10. Corallium; albidum; digitatum; ramis hinc, inde, contiguis, ad latitudinem dispositis. *U. H.* 3. *Tab.* 27. *rupicule innititur balcyoniis raris ornata.*
11. Idem; magnum; flavescens; adcretum rupi elegantissimæ, spongiis marinis, lapideis, fuscis, speciosis ornata.
12. Idem; magnum; pulcherrimum; rupi insitens; & ostreis adcretis speciosum.
13. Idem; magnum; multipliciter divisum; apicibus rubescentibus; multis, rarisque, Lithophytis ornatum.
14. Idem; adhuc ramosius; fuscum; Lithophytis variis pulchrum.
15. Idem; poris minimis pertusum; innixum rupi frondiporæ, in qua & astroites striata. *Boot.*
16. Idem; innixum rupi encephaloïdi, (8. fungo) in qua madrepora; cinerea, stellata, asteriscis creberrimis picta. *Pulcherrimum opus; cui & Trichomanes petrosus accrevit.*
17. Idem; innixum rupi encephaloïdi conchiferæ; cinereum.
18. Corallium; flavescens; fragile; polyschides; ramosissimum. *Accrevit rupi coralline mirabiliter figuratæ in cornua, echinos, &c. huic verò mirabilia, petrefacta, conchyliis bivalvia accreverunt.*
19. Idem; halcyoniis spongiæ similibus, flavis, corallinis, excellens.
20. Idem; omnium maximum; multis bivalvibus, partim ostreaceis, partim petrefactis, ornatissimum.
21. Eiusdem variæ, aliæ, species.
22. Corallium; album; minimum; ramosissimum; cespitem musci referens; ex Amboina. *Eschara; marina; frondipora.* *J. B.* 3. 809. *Imper.* 631. *T.* 576.

PLANTAE SUBMARINAE.

23. Corallium; nigrum; arboreum.
24. Corallium; album; geniculatum. *Hippuris saxea. Clus. Exot. 124. Equiseto similis, saxea. C. B. P. 365.*
25. Corallium; geniculatum; apice multifido; album. *An Corallina minima, capillacea, articulata. Sloan. Jam?*
26. Corallium; geniculatum; capillaceum; apice ramoso; album.
27. Corallium; geniculatum; capillaceum; apice ramoso; pallidè roseum.
28. Corallium; geniculatum; capillaceum; apice ramoso; roseum. *Ultimæ quinque species veram referunt hippuridis articulatae formam in quatuor postremis microscopio visibilem.*

OPUNTIOIDES marina.

Natura fragilis, dura; forma fere Opuntiae.

1. Opuntioïdes marina; parva; formâ Trichomanis. *Corallina; Opuntioïdes, ramulis densioribus, & foliis magis sinuatis, atque corrugatis. Sloan. Jam. T. 20. F. 2.*
2. Opuntioïdes marina; quæ corallina latifolia; & Opuntia marina. *Plukn. Phyt. T. 26. 1. Scutellaria, sive Opuntia marina. J. B. 3. 802. Lichen marinus. Clus. H. 2. 250. Sertolara. Imper. 653. fucus folio rotundo. T. 569.*

MADREPORA. T. 572. 340.

Natura Corallii, sed porosa.

1. Madrepora; vulgaris. T. 573. *Corallium; album; oculatum; officinarum. J. B. 3. 805. Corallium; album; fistulosum. Imper. 627.*
2. Madrepora; maxima; arborea. T. 573. *Porus; magnus. J. B. 3. 807. Imper. 624. Corallo affinis; Porus magnus. M. H. 3. 656. sect. 15. T. 10. F. 1.*
3. Eadem; densiori, lapidosa magis, indole; ramosa.
4. Madrepora; ramosa. Imper. 629. T. 573. *Coralliis affinis; Madrepora ramosa. C. B. P. 367. J. B. 3. 807.*
5. Madrepora; ramosa; candidissima; creberrimè & tenerrimè perforata; Amboinensis. *Madrepora; alba; elegantius stellata, & magis ramosa. T. 573. Porus; albus; ramosior; pumilus; creberrimè stellatus. Mus. Ashmol. M. H. 3. 657. Sect. 15. Tab. 10. Fig. 12.*
6. Eadem; flavescent.
7. Madrepora; abrotanoïdes. T. 573. *abrotanoïdes; saxea planta. J. B. 3. 807. Clus. Exot. 123. colore flavescente.*
8. Madrepora; abrotanoïdes; major; cinerea; apicibus acutis; *planta lapidea marina. Rar. Mus. Bess. T. XXVIII.*
9. Madrepora; abrotanoïdes; eadem; apicibus

10. Madrepora; eadem; candidissima.
11. Madrepora; erectior; ramosa; tuberculis crebris, sursum spectantibus. *T.* 573. *Porus*; albus; erectior; ramosus; tuberculis crebris, sursum spectantibus. *M. H.* 3. *T.* ult. *F.* 3. *Musci Calceolar* 12.
Accrevit supra concham margaritifera ita, ut liquidissimè hic spectare fas sit modum, quo semen corallinum petrescens affusum excreseat.
12. Madrepora; cinerea; stellis creberrimis elegantissima. *Corallium*; stellatum; *Corallii species*; minus solida, & minus alba. *Imper.* 627. Madrepora; alba; stellata; & verrucosa; minor. *T.* 573. *Porus*; sive *Corallium*; astroites; humilius; verrucosum; ramis alias latis & compressis, alias incertæ figuræ. *Mus. Ashm. M. H.* 3. 657. *T.* ult. *F.* 12. *An Corallium*; album; stellatum. *Sloane Jam.* *T.* 18. *F.* 4?
13. Madrepora; vesicaria; fimbriata; elegantissima; Amboinensis. *Retepora*; *Eschara marina*. *Imper.* 630. *Eschara Rondeletii* 133. *J. B.* 3. 809. *T.* 576. in eadem rupe frondepora; *Eschara marina*. *Imper.* 631.
14. Madrepora; cinerea; stellis creberrimis elegantissima; ramosissima; albicans; similis 7.
15. Eadem; ramosissima; ingens; fusca; halcyoniis, ostreisque, accretis, insignis.
16. Madrepora; alba; arborefcens; elegantissima. *Madrepore*; alba; cupressiformis. *T.* 573. *Porus*; albus; cupressiformis; sive *Porus*; albus; ramulis cornua capreoli quodammodo referentibus; tuberculis fistulosis densè admodum refertus. *Mus. Ashm. Oxon. M. H.* 3. 657. *T.* ult. *F.* 9. *Corallium*; album; maximum; porosum; muricatum. *Sloane Jam.* *T.* 18. *F.* 3. planta; lapidea; marina. *Rar. Mus. Bell. T.* xxviii.
- Speciosissimum opus hoc mirantis pellicit oculos fabrica sua; maximè, quum ostreis, fungis, conchis, halcyoniis, poris, arcibus Noë, adeò pulchrè ornatur, ut inter marina verè eximium sit.
17. Madrepora; alba; arborefcens; cornua cervina, ramosissima, densè contexta, exhibens. *Corallium*; porosum; album; minus; muricatum. *Sloane Jam.* *T.* 17. *F.* 2.
18. Madrepora; lata; cinerea; cornu alcis ferè similis. *Corallium*; porosum; album; latissimum; muricatum. *Sloane Jam.* *T.* 17. *F.* 3.
Hoc quoque insigne poris, halcyoniis, vermiculis lapideis, ostreis, conchis, latibulis, &c. incomparabile.
19. Eadem; raris halcyoniis, & vermiculis lapideis, insignis; rupi accreta.
20. Madrepora; arborefcens; ramosa; corallio ruberrimo undique enascente pulcherrima; alba.
21. Madrepora; arborefcens; candidissima; caule recto, in fastigio, ramis elegantissimè frondefcente.
22. Madrepora; retis instar concreta; hirsuta; fusca; Hispanica. *hirsuta, formâ Corallii.* *Rar. Mus. Bell. T.* xxi.
- idrepore; ramosissima; scabra; fusca.
- repore; hirsutic lapideâ scaberrima.

ESCHARA. T. 576.

Madrepora instar telæ, retif-ve contexta.

1. Eschara Rondeletii. 133. J. B. 3. 809. *Retepora Eschara marina*. Imper. 630. *Porus reticulatus*; & *Eschara marina*. Imper. C. B. P. 367.
2. Eschara; marina; frondipora. J. B. 3. 809. *frondipora Eschara marina*. Imper. 631. *frondipora*. Imper. C. B. P. 367. ex *Amboina elegantissima species*.
3. Eschara; qui *Porus cervinus*. Imper. 630. *alga marina πλαγιόκερος*, *porosa*. J. B. 3. 809.

TUBULARIA. T. 575. 342.

Madrepora tubulis eleganter coagmentatis constans.

1. Tubularia; purpurea. T. *Coralliis affinis*; *alcyonium*; *fistulosum*; *rubrum*. J. B. 3. 808. *Coralliis affine*; *alcyonium*; *rubrum*. C. B. P. 367. M. H. 3. T. & F. *ultima*. Tubularia; purpurea. Juxta quosdam *halcyonium*, *Milesum*. Imper. 822.

II. KERATOPHYTA.

Materies his lenta, pellucens, instar cornu, obducta sæpe crustâ cretaceâ, varii & elegantis quandoque coloris.

1. Keratophyton; maximum; cinereum; elegantissimè reticulatum. *Corallina reticulata*. Raj. syn. 4. *planta*; *marina*; *retiformis*. Clus. Exot. 121. *frutex*; *marinus*; *major*. Rar. Mus. Best. T. XXIV. *Arbor*; *marina*. Rochef. 234. *flabellum*; *marinum vulgò*.
2. Keratophyton; majus; nigrum; fibris tenuioribus elegantissimè, & densissimè, reticulatum. *Planta*; *retiformis*. Rar. Mus. Best. T. XXIV. *flabellum*; *marinum vulgò*.
3. Idem; nigerrimum; densissimum; splenis parenchymate liberi vascula ficcata referens.
4. Keratophyton; album; densè reticulatum; fibris latioribus. *Flabellum*; *marinum, vulgò*.
5. Idem; colore laccæ.
6. Idem; ex candido, & laccâ variegato.
7. Keratophyton; arboreum, nigrum. *Lithophyton*; *nigrum*; *arboreum*. T. 574. *Corallium*; *nigrum*; sive *antipathes*. J. B. 3. 804. Lob. Ic. 251. *Corallium*; *nigrum*. C. B. P. 366. Rar. Mus. Best. T. XXVIII.
8. Idem; tenuius; spinosum. *Corallina*; *nigra*; *velut spinosa*. C. B. P. 366.

9. Idem; tenuius; ramosissimum.
10. Idem; ramis candicantibus.
11. Keratophyton; cirrhis purpureis, tenuissimis; Afrum.
12. Keratophyton; polyrrhizon; instar caudæ adnatum ostreo.
13. Keratophyton; arboreum; album; ramosissimum; maximum; instar agarici fungosum.
14. Idem; rubrum; nodosum.
15. Keratophyton; arboreum; nigrum; ramosissimum; tenue. *Erica marina*. Rar. Mus. Best. T. xxiv.
16. Keratophyton; quæ corallina, fruticosa nodosa, abrotani folio. T. 572. *fruticosa marina planta; quibusdam conserva lignosa*. J. B. 3. 798.

III. TITANOKERATOPHYTA.

Præcedentibus eadem, sed crustâ calcariâ ornata.

1. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; marinum; albicans. Gesn. de Fig. Lap. 136. T. 574. *Corallina; fruticosa; recta; alba*. C. B. P. 366. *Coralloides; fruticosa; planta; marina; rectior*. J. B. 3. 806. *Corallina; alba*. Lob. Ic. 252. *quercus; marina; Theophrasti*. Clus. H. Exot. 121. Rar. Mus. Best. T. xxiv.
2. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; marinum; rubri, seu purpurei, coloris. Gesner. de Fig. Lap. 136. *Corallina; fruticosa; purpurea*. C. B. P. 366. *Corallina; rubens; antipathis facie*. Lob. Ic. 252.
3. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; luteum; punctatum. T. 579. *Corallina; alba; punctata*. C. B. P. 366.
4. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; album; nodosum. T. 574. *Corallina; alba; nodosa*. C. B. P. 366. *prodr.* 153. 2.
5. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; cortice verrucoso, albo. T. 574. *Coralloides; granulosa; alba*. J. B. 3. 809.
6. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; cinereum; rugosum. T. 574. *Corallina; cinerea; rugosa*. C. B. P. 366. *prodr.* 153.
7. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; minus; rugosum; albicans. T. 574. *Corallina; cinerea; rugosa; altera species*. C. B. *prodr.* 153.
8. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; pallidè flavescens; cortice lævi. T. 574. *Corallina; pallidè flavescens; cortice lævi*. C. B. P. 366. *Corallina; pallidè flavescens; levis*. C. B. *prodr.* 153.
9. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; Americanum; maximum; cinereum; cortice punctato. T. 574.
10. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; Americanum; flavescens; minus; cortice punctato. T. 574.
- Titanokeratophyton; quod Lithophyton; Americanum; maximum; tuberculis sursum spectantibus. T. 574.

12. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; Americanum; minus; album; tuberculis sursum spectantibus. *T.* 574.
13. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; Americanum; album divifurâ polypodii. *T.* 574.
14. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; partim luteum, partim roseum. *T.* 574.
15. Titanokeratophyton; quod Lithophyton; partim album; partim roseum. *T.* 574.
16. Titanokeratophyton; rubrum; colore boli Armenæ.
17. Titanokeratophyton; aureum, punctatum.
18. Titanokeratophyton; purpureum, & aureum.
19. Titanokeratophyton; cupressô simile; fuscum.
20. Titanokeratophyton; aureum.
21. Titanokeratophyton; purpureum, nodosum.
22. Titanokeratophyton; cirrhis tenuissimis, rubrum; pellucidum; Africanum.
23. Titanokeratophyton; rubrum.
24. Arbor; marina; ramosa; suber perfectè referens; cinerea; ubique eleganter; & ordinatâ serie pertusa. *Videtur certè huc referenda.*

IV. MARINA MOLLIORIS FABRICAE.

SPONGIA *T.* 575. 342.

Substantia mirè implicata, tenuis, bibula, Keratophyti fere mollior.

1. Spongia; ad usum præstantissima; foraminibus exiguis pervia. *T.* 575. *spongie; Schacchiæ. Imper. 636. Spongiæ; compressæ; Schiacchiæ. J. B. 3. 818.*
2. Spongia; compressa; magna. *C. B. P. 368. Spongie; Schiacchiæ; del Oceano. Imper. 636. Spongia, compressa; Schiacchiata; Oceani latissima. J. B. 3. 818. Spongia; marina; alba; & flava. Tab. Ic. 1119. 1120.*
3. Spongia; globosa. *Imper. 635.*
4. Spongia; cinerea; cava; vaginam referens.
5. Spongia; Americana; compressa; spinosa; echinata; eleganter punctata.
6. Spongia; Americana; infundibulum referens; spinosa; echinata; eleganter punctata.
7. Spongia; flava; Priapeja; cava; mirabilis.
8. Spongia; flava; cava; cylindrica; durior.
9. Spongia; fusca; cava; conica; tuberculosa; ingens.
10. Spongia; ramosa. *C. B. P. 368. Conservæ marinæ genus. Lob. Ic. 2. 257.*
11. Spongia; ramosissima; oculata.
12. Spongia; ramosa; fluvialis, Newtoni. *Raj. H. 8. Spongia; flu-*
via-

IV. MARINA MOLLIORIS FABRICAE.

vialis; anfractuosa; perfragilis; ramosissima; nostras. Plukn. Phyt. T. 112. F. 3.

13. Spongia; dura; ambarum griseum penitus referens.
14. Spongia; ingens; anomala; pelvim referens.
15. Spongia; dura; ramosa; nigra; suberis instar.
16. Spongia; ramosa; fistulosa; millepora.
17. Spongia; pulcherrima; reticulata; fistulosa; lacunata.

2. FUCUS. T. 567.

Lenta, coriacea, herbacea, materies.

Facies tota quasi foliacea.

Semina saepe in folliculis.

1. Fucus; maritimus; vel quercus; maritima; vesiculas habens. *C. B. P. 365. quercus; marina. Lob. Ic. 2. 255.*
2. Fucus; marinus; vesiculis majoribus, per intervalla dispositis. *M. H. 3. Sect. 15. T. 8. F. 2.*
3. Fucus; maritimus; nodosus. *C. B. P. 365. Fucus; marinus; tertius. Dod. p. 480.*
4. Fucus; marinus; alter; tuberculis paucissimis. *C. B. P. 365. Fucus; marinus; quartus. Dod. p. 480.*
5. Fucus; angustifolius; vesiculis latis, filiquarum æmulis. *Raj. H. 73.*
6. Fucus; seu quercus marina; latifolia; humilis; sine vesiculis. *Raj. Syn. 328.*
7. Fucus; marinus; humilior; & fruticosior; ceratophyllus; vesiculas habens. *M. H. 3. Sect. 15. T. 8. F. 9.*
8. Fucus; coronopi divisurâ. *T. 568.*
9. Fucus; tenuissimis, angustis, planis, foliolis; sine bullis.
10. Fucus; sine ramis, bullisque; longissimus; niger.
11. Fucus; sine ramis, bullisque; longissimus; sericeus; tenuis.
12. Fucus; qui muscus; marinus; virens; tenuifolius. *Dod. p. 478.*
13. Fucus; muscosus.
14. Fucus; marinus; scruposus; telam sericeam texturâ suâ æmulans; fuscus. *M. H. 3. Sect. 15. T. 8. F. 16.*
15. Fucus; spiralis; maritimus; major. *T. 568. Alga spiralis maritima, major. Raj. Syn. 5. Alga spiralis maritima. Bocc. Rar. 70.*
16. Fucus; lactuæ folio. *T. 568. Lactuca marina, sive intybacea. J. B. 3. 801. Muscus marinus, lactuæ folio. C. B. P. 364. Muscus marinus latifolius. Dod. p. 477.*
17. Fucus; qui muscus marinus latifolius. *Dod. p. 477.*
18. Fucus; quæ vesicaria marina duplex, non ramosa, & ramosa. *J. B. 3. 818.*

19. Fucus; ramosus; verrucosus; humilis.
20. Fuci marini, ramosi, polyschidi variae species.

3. MUSCUS MARINUS. *Raj. Meth.* 4.

1. Muscus; marinus; ericæ similis; fuscus. *Corallina, Hispanica, capillaceo folio fusco. T. 571.*
2. Muscus; marinus; ericæ similis; niger.
3. Muscus; marinus; capillaceus; niger.
4. Muscus; marinus; plumaceus; niger. *Erica marina quibusdam.*
5. Muscus; marinus; filici similis; tenuissimus.
6. Muscus; marinus; capillaceus; flavus.
7. Muscus; quæ abies marina Belgica. *Clus. H. 35. Abietis similis maritima. C. B. P. 365. Corallina marina, abietis formâ. T. 571. Musci marini genus, foliis pinnatis, & abies Clusii Belgica. J. B. 3. 799.*
8. Muscus; quæ cypressus marina Belgica Clusii. *J. B. 3. 799.*

4. ALCYONIUM. *T. 576.*

1. Alcyonium; perforatum. *Alcyonium quartum Dioscoridis. Imper. 641.*
2. Alcyonium; simile musco nostrati simili radici costi Indici. *Donat. 109.*
3. Idem; magis ramosum; & scabrum.
4. Idem; unde excrevit corallina fistulosa; fragilis; crassior. *J. B. 3. 811.*

Marina hæc, undique lecta, digesta, suos inscripta titulos, in usum prius proprium mihi comparaveram; jam in Armario Academiae publico locavi: ut noscæ queant ab iis, qui harum rerum studio capiuntur, atque facillè cum catalogo hoc conferre queant.



STIRPIUM SIMPLICISSIMÆ.

PLANTÆ TERRESTRES.

Quæ vel in aëre supra terram, vel infra eam crescunt, structurâ simplicissimâ; in quâ nec flos, nec fructus, apparent sensibus.

1. FUNGUS. T. 556. 327. 328. in Acad. Reg. Sc. 1707.

Radix mollis, tenella, rara.

Pedunculus levis, spongiosus.

Petasis in umbellam expansus, suprâ æquabilis, membranâ tectus, infrâ lamellis foliaceis, vel fistulis, appositis constructus, facit partem supremam apici pedunculi impositam. Hæc pars tota videtur conceptaculum seminis tenuissimi, copiosissimi, quod inde deorsum specie halitus decussum, & solo suo prægnanti creditum, fertile fit.

Totâ fabricâ levi, sicciore, fragili, vix in diversas partes distinguendâ, nisi quatenus fistulis exiguis, numerosissimis, conflata apparet.

1. Fungus; pileolo lato, & rotundo. C. B. P. 370. M. H. 3. 636. T. 556. Fungus campestris, albus supernè, infernè rubeus. J. B. 3. 824. Fungi vulgatissimi, esculenti. Lob. Ic. 271. IX genus esculentorum fungorum. Clus. H. CCLXVII. Fungi pratenses. Sterb. Th. Fung. T. 1. A. B. †.

2. Fungus; pileolo lato, & rotundo, livido. C. B. P. †.

3. Fungus; pratensis; pileolo latissimo, nivo; pedunculo brevi. Sterb. Th. Fung. 29. descr.

4. Fungus; piperatus; albus; lacteo succo turgens. J. B. 3. 825. Fungus albus, acris. C. B. P. 371. Sterb. Th. Fung. T. 8. B. †.

5. Fungus; orbicularis; exalbidus; pratensis. C. B. P. 370. Fungi D. Georgii, coloris subalbidi, cum paucâ flavitie, esculenti, pratenses. J. B. 3. 824. III genus esculentorum fungorum. Clus. H. CCLXIV. Fungi Divi Gregorii. Sterb. Th. Fung. T. 1. G. G. †.

6. Fungus; pileolo lato; longissimo pediculo, variegato. C. B. P.

12 PLANTAE TERRESTRES SIMPLICISSIMAE.

371. Fungi, longissimo pediculo, candicantes, sed maculati, esculenti. *J. B.* 3. 826. XVIII genus esculentorum fungorum. *Clus. H.* cclxiv. Fungus coronatus. *Sterb. Th. Fung. T.* 7. A. †.

7. Fungus; angulosus; & veluti in lacinias sectus. *C. B. P.* 371. Fungus luteus, sive pallidus, Chanterelle dictus, se contorquens, esculentus. *J. B.* 3. 832. Nemorum fungi. *Lob. Ic.* 273. Auricula leporis lutea. *Sterb. Th. Fung. T.* 4. B. †.

8. Fungus; oris laceris, & in lacinias divisus. *C. B. P.* 373. Fungi tres foetidi sub corylis, serpentini dicti, perniciosi. *J. B.* 3. 838. XVI genus noxiorum fungorum. *Clus. H.* cclxxxi. *Ic.* cclxxxi. Fungus comatus. *Sterb. Th. Fung. T.* 22. I. K. L. †.

9. Fungus; corylæus; orbicularis. *C. B. P.* 372. Fungi sub corylis, orbiculatæ figuræ. *J. B.* 3. 842. VI genus noxiorum fungorum. *Clus. H.* cclxxxviii.

10. Fungus; perniciosus; ex eodem pedunculo multiplex. *T.* 560. Fungi dumetorum ex uno pede prodeuntes. *C. B. P.* 374. Fungi multi ex uno pede perniciosi. *J. B.* 3. 835. XXII generis perniciosorum fungorum v species. *Clus. H.* cclxxxv. Hi colore, magnitudine, & numero, varii pro diversis, quibus innati, arboribus. †.

11. Fungus; clypeiformis; major. *C. B. P.* 373. Fungi multi ex uno pede, clypeiformes, lutei, & rubri. *J. B.* 3. 835. †.

12. Fungus; albus; pileolo inverso. *T.* 559. Fungi albi, pileolo inverso. *J. B.* 3. 847. †.

13. Fungus; minor; flavescent; infundibuli formâ. *C. B. P.* 373. Fungus infundibulum referens, flavescent, perniciosus. *J. B.* 3. 847. †.

14. Funguli; minuti; mulco innati. *Mentz. Pug. T.* 6. †.

15. Fungulus; hyemalis; pileolo albo; lamellis flavis. †.

16. Fungus; qui semi-fungus pallidus. *Sterb. Th. Fung. T.* 8. E. E. †.

17. Fungus; pallidus; marmoreus. *Sterb. Th. Fung. T.* 8. F. F. †.

18. Fungus; parvus; pediculo oblongo; pileolo hemisphærico; ex albo subluteus. *Raj. Syn.* 13. †.

19. Fungi; buxci; fasciculosi. *Sterb. Th. Fung. T.* 25. E. †.

20. Fungus; arboreus; clypeum referens; ingens; foetidissimus. †.

21. Fungus; parvus; pediculo oblongo, firmo, lento; pileolo in medio fastigiato. *Raj. Syn.* 13. †.

22. Fungus; lapis bufonis dictus. *Sterb. Th. Fung. T.* 23. F. F. †.

23. Fungus; VI genus esculentorum fungorum. *Clus. H.* cclxvi. †.

24. Fungus; perniciosus; 44. ex uno pede producens; non descriptus. *Commel. Indig.* 42. †.

25. Fungus; foetidus; penis imaginem referens. *C. B. P.* 374. Fungus phalloides. *J. B.* 3. 843. Fungi perniciosi XXXIII genus. *Clus. H.* cclxxxvi. Fungus penis virilis facie. *Lob. Ic.* 2. 275. *Vid. Sterb. Th. Fung.* 276. ad 283. Boletus phalloides. *T.* 562. †.

26. Fungus; aureus; crustæ instar cortici quercino

2. FUNGOIDES. T. 560.

Materies, forma, modus crescendi, fungo similes; sed caput excavatum sursum.

1. Fungoïdes; infundibuli formâ; semine foetum. T. 560. Fungi caliciformes, seminiferi. Mentz. Pug. T. 6. †. Est congeries minutorum fungulorum pileatorum, qui intra fungulum caliciformem nascuntur, singuli in suis pedunculis.

2. Fungoïdes; angulatum; acetabuli formâ. T. 560. Fungi pezicæ; πικηνοί Plinii. Col. 1. 335. †.

3. Fungoïdes; crispum; acetabuli formâ. T. 561. Fungi pezicæ altera species. Col. 1. 337. †.

3. MERULIUS.

Materies fungi magis lenta, & per siccitatem fere coriacea. Forma varia, vasis cavi, undique clausi. Superficies rugosa, seminifera tota, inde pulverulentâ facie.

1. Merulius; ingens; collo crasso, carneo-flavescente; capite ingenti flavo. Favus niger. Sterb. Th. Fung. T. 10. F. Fungus cavernosus, niger. J. B. 3. 836. †. Crescit quotannis in horto, sæpe in magnitudinem capitis infantis.

2. Merulius; qui fungus porosus; rugosus; albicans; quasi fuligine infestus. C. B. P. 370. Fungus rugosus, vel cavernosus, sive Merulius ex albo nonnihil rubescens. J. B. 3. 836. Primi generis esculentorum fungorum species 1. Clus. H. CCLXIII. descr. CCLXIV. Ic. Boletus esculentus, rugosus, albus, quasi fuligine infestus. T. 561. Fungi rugosi. Sterb. Th. Fung. T. 10. A. †.

3. Merulius; qui fungus porosus; coloris ex rufo fusci. C. B. P. 370. Fungus rugosus, vel cavernosus, sive Merulius fuscus. J. B. 3. 836. Primi generis esculentorum fungorum species 11. Clus. H. CCLXIII. descr. CCLXIV. Ic. Boletus esculentus, rugosus, fulvus. T. 561. Fungus moro similis, rotundus. Sterb. Th. Fung. T. 10. B. †.

4. Merulius; qui fungus porosus, amplior, & orbicularis. C. B. P. 561. Primi generis esculentorum fungorum species 111. Clus. H. CCLXIII. descr. Boletus esculentus, rugosus, amplior, & orbicularis. T. 561. Fungus rugosus, tuberans. Sterb. Th. Fung. T. 10. E. E. †.

5. Merulius; qui fungus porosus apud Sterb. Th. Fung. T. 10. H. †. Aprili, ex sparsis corticibus quercinis in scobem redactis, crescunt in Horto Academico promiscuè, anniversariâ sæturâ luxuriantes.

4. AGARICUS. T. 562. 330.

Forma fungo accedens.

Fabrica fere fistulosa, multiplici fistularum serie successivo ordine constans, quarum infimæ lignosæ, summæ villosæ, jam durior & lignosior, quandoque suberi similis, alias verò tenerior, friabilis, farinosa.

1. Agaricus; pedis equini facie. T. 562. Fungus in caudicibus nascens, unguis equini figurâ. C. P. B. 372. Fungi igniarii. Trag. 943. †.
2. Agaricus; igniarius; tuberis formâ; ingens. †.
3. Agaricus; auriculæ formâ. T. 562. Fungus membranaceus, auriculam referens, sive sambucinus. C. B. P. 372. Fungus auriculæ Judæ, coloris ex cineraceo nigricantis, perniciosus, in caudice sambuci nascens. J. B. 3. 840. 1 genus perniciosorum fungorum. Clus. H. CCLXXVI. Auricula Judæ. Sterb. Th. Fung. T. 27. H. H. †.
4. Agaricus; varii coloris; squamosus. T. 562. Fungus cerasorum imbricatim alter alteri innatus, variegatus. C. B. P. 372. V genus perniciosorum fungorum. Clus. H. CCLXXVI. Fungus mesentericus. Sterb. Th. Fung. T. 27. K. †.
5. Agaricus; lichenis facie; variegatus. T. 562. Fungus salignus, lichenis formâ, variegatus. C. B. P. 372. †.
6. Agaricus; intybaceus. T. 562. Fungus intybaceus. J. B. 3. 839. lignosus, aureus, querci fungus. Sterb. Th. Fung. T. 27. B. B.
7. Agaricus; flammeus; semi-orbicularis; hypocrateriformis.
8. Agaricus; ingens; aureus; odore vinoso; sapore acido. †.
9. Agaricus; fallus. Sterb. Th. Fung. T. 27. D. & fungus; albus; salignus; odore iridis. Ejusd. Ibid. †.
10. Agaricus; qui fungus flammeus; variæ figuræ. Sterb. Th. Fung. T. 13. A. B. C. D. & T. 14. E. F. G. V generis esculentorum fungorum 1. species. Clus. H. CCLXV. †.
11. Agaricus; digitatus; niger. T. 562. Hypoxylon; excrementum ligni putridi fungosum, digitatum. Mentz. Pug. T. 6. †.
12. Agaricus; fraxineus; niger; durus; orbiculatus. T. 562. Fungus fraxineus, niger, durus, orbiculatus. Raj. Syn. 18. H. 109. †.
13. Agaricus; tubæ Fallopiæ instar laciniatus. T. 562. Fungus, tubæ Fallopiæ æmulus. Raj. Syn. 20. †.
14. Agaricus; niger; parvus; cornua damæ referens. †.
15. Agaricus; foliaceus; variegatus; multiplex. Fungus mesentericus. Sterb. Th. Fung. T. 27. K. †.

5. LYCOPERDON. T. 563. 331.

Simplex spongiosa forma, intus fœtissima semine tenuissimo, ad lenes motus displodendo instar fumi, ubi maturuit.

1. Lycoperdon; vulgare. T. 563. Fungus, rotundus, orbicularis. C. B. P. 374. Fungus orbicularis. Dod. p. 484. Fungus pulverulentus, dictus crepitus lupi. J. B. 3. 848. Bovist officin. minus. †.

2. Lycoperdon; minus; & multiplex; sphaericum. T. 563. †.

3. Lycoperdon; minus; & multiplex; ovatum. T. 563. †.

4. Lycoperdon; Alpinum; maximum; cortice lacero. T. 563. An & Lycoperdon; medium; cortice lacero. T. 563. Fungus rotundus, orbicularis, capitis pueri magnitudine. C. B. P. Var. 375. Fungus maximus, pulverulentus, dictus Germanis Psofist. J. B. 3. 848. XXVI generis perniciosorum fungorum. 11. & 112. Bovist officin. majus. †.

5. Lycoperdon; semi-orbiculare. T. 563. Fungus niger, calicis figuram referens. C. B. P. 375. Fungus semi-orbicularis. Dod. p. 485. †.

6. Lycoperdon; Parisiense; minimum; pediculo donatum. T. 563. 331. Fig. E. E. Fungus pulverulentus, minimus, longo pediculo insidens. Raj. Syn. 16. †.

7. Lycoperdon; oblongum; utrinque introrsum emarginatum. T. 563. Fungus Boletus fuscus, basi globosâ. Bocc. Mus. 301. 4. †.

8. Lycoperdon; qui fungus globosus, levis, pallidus Ducis Poli & Rom. Bocc. Mus. 1. 303. 3. †.

9. Lycoperdon; parvum; mortarii bellici formâ. †.

10. Lycoperdon; ingens; conoïdes; pileatum; plerumque gemellum. †.

11. Lycoperdon; sphaericum; cortice tenaci castaneo. †.

6. TUBERA. T. 565. 333.

Homogenea fungosæ, & quasi lignescantis, naturæ corpora.

1. Tubera; testiculorum formâ. Mentz. Pug. †.

Ne mireris, me inseruisse enarratas hucusque Stirpes anomalas catalogo Horti: plurimæ harum caduci ævi se ostendunt tantum oculis in Horto ipso, cæterum omnes fere, arte duras, temporisque patientes redditas, anniversariâ demonstratione ostentare solco; ut & eas, quæ jam sequuntur.

STIRPES SIMPLICES QUIDEM, AT PRIORIBUS
COMPOSITAE MAGIS, ET VASORUM SEMI-
NALIUM ALIQUA SPECIE CONSPI-
CUA UT PLURIMUM.

1. LICHEN. T. 548. 325.

*Fabrica tenuis, coriacea, membranosa, subcornea quandoque;
nunc in chartaceas lamellas ramosas explicata, nunc
in teretes ramulos assurgens.*

*Vasa seminalia copiosissima, acetabuli formâ, sæta abun-
danti, pulverulento, semine.*

1. Lichen; Dioscoridis & Plinii secundus; colore cinereo. Col. 1.
331. Musco-fungus, lichenoïdes, minor, cinereus, vulgatissimus. M. H.
3. 634. Sect. 15. T. 7. Fig. 6. Muscus, crustæ modo arboribus adna-
scens, colore cinereo. C. B. P. 361. Muscus aridus, crustatus. Park. Th.
1313. †.

2. Lichen; Dioscoridis & Plinii secundus; colore viridante. Col. 1.
331. †.

3. Lichen; Dioscoridis & Plinii secundus; colore flavescente. Col.
1. 331. Musco-fungus, lichenoïdes, minor, vulgatissimus, flavus. M. H.
3. 634. †.

5. 4. Lichen; crustæ modo arboribus adcrefcens; pullus. T. 548.
Musco-fungus, lichenoïdes, minor, vulgaris, pullus. M. H. 3. 634. †.

5. Lichen; crustæ modo arboribus adnascens; tenuiter divisus.
T. 548. Musco-fungus, lichenoïdes, crustæ modo arboribus adnascens,
cinereus, mollior, & in angustiores lacinias divisus. M. H. 3. 634. †.

6. Lichen; crustæ modo asseribus adnascens; latior; mollior; vix
vasculosus; cinereus. Musco-fungus, lichenoïdes, crustæ modo adnascens,
major, cinereus. M. H. 3. 633. Sect. 15. T. 7. 1. †.

7. Lichen; crustæ modo asseribus adnascens; latior; mollior; vix
vasculosus; roseus. †.

8. Lichen; crustæ modo asseribus adnascens; latior; mollior; vix
vasculosus; eleganter variegatus ex roseo, albo, nigrescente. †.

9. Lichen; crustæ modo faxis adnascens; verrucosus; cinereus; &
veluti exustus. T. 549. †.

4. 10. Lichen; maritimus. Lob. Ic. 2. 247. Lichen, seu hepatica vul-
garis. Park. Th. 1315. Musco-fungus terrestris, latifolius, cinereus, he-
paticæ facie. M. H. 3. 632. Sect. 15. T. 7. 1. †. Hujus variet, ratioue
fimbriarum, visæ mihi in maritimis oris species.

11. Lichen; primus. *Lob. Ic. 2. 246. Lichen petræus, latifolius, sive hepatica fontana. C. B. P. 362. Lichen, seu hepatica fontana. J. B. 3. 758. †.*
12. Lichen; secundus. *Lob. Ic. 2. 246. Lichen petræus, stellatus. C. B. P. 362. Lichen, sive hepatica minor, stellaris. Park. Th. 1314. †.*
13. Lichen; tertius. *Lob. Ic. 2. 246. Lichen petræus, umbellatus. C. B. P. 362. Lichen, sive hepatica minor, umbellata. Park. Th. 1314. †.*
14. Lichen; caulifer; petræus; cauliculo calceato. *M. H. 3. 623. Lichen petræus, cauliculo calceato. C. B. P. 362. Lichen alter, minor, caule calceato, ὑποδεδυμένω. Col. 1. 331. Lichen alter, minor, folio calceato. Park. Th. 1314. Ic. 1315. descr. 5. †.*
15. Lichen; petræus; cauliculo pileolum sustinente. *C. B. P. 326. Lichen Plinii, primus, pileatus. Col. 1. 331. Lichen marinus, pileatus, & calceato folio. Park. Th. 1314. Ic. 1315. descr. 4. †.*
16. Lichen; seu hepatica lunulata; ἐπιφύλλονα π. D. Dale. *Raj. Syn. 41. †.*
17. Lichen; verrucosus. *D. Doody. Raj. Syn. 41. †.*
18. Lichen; qui musco-fungus; terrestris; minor; crispus; foliis supernè è flavo virefcentibus, infernè albicantibus. *M. H. 3. 632. Sect. 15. T. 7. 3. †.*
19. Lichen; qui musco-fungus; terrestris, minor; fuscus; foliis è latitudine crenatis; musco innascens. *M. H. 3. 632. Sect. 15. T. 7. 4. latior, & angustior. †.*
20. Lichen; qui musco-fungus; lichenoides; arborum; Hybernicus; scutellatus. *M. H. 3. 633. Sect. 15. T. 7. 3. †.*
21. Lichen; qui musco-fungus; arboreus; cinereus; scutellatus; marginibus pilosis. *M. H. 3. 634. Sect. 15. T. 7. 6. †.*
22. Lichen; arboreus; sive pulmonaria arborea. *J. B. 3. 759. Muscus pulmonarius, sive lichen arborum. Park. 1313. Musco-fungus arboreus, platyphyllos, ramosus, è viridi fuscus. M. H. 3. 634. Muscus pulmonarius. C. B. P. 361. Pulmonaria. Dod. p. 474. †.*
23. Lichen; arboreus; varius magnitudine, ramis, foliis, colore; ex variis arboribus lectus hyeme sævissimâ. †.
24. Lichen; cinereus; cornua damæ referens. *T. 549. †.*
25. Lichen; latifolius; ramosus; minor; hirsutus. *T. 551. 325. C. Muscus arboreus, capitulis cavis. C. B. P. 361. Muscus alter, πλατύφυλλος. Col. 1. 334. Musco-fungus arboreus, tenuior, scutellis vel capitulis cavis. M. H. 3. 634. †.*
26. Lichen; qui musco-fungus; arboreus; angustior; scutellatus; & peltatus. *M. H. 3. 634. Sect. 15. T. 7. 3. †.*
27. Lichen; pulmonarius; cinereus; mollior; in amplas lacinias divisus. *T. 549. 325. AB. †.*
28. Lichen; cinereus; latifolius; ramosus. *T. 550. Musco-fungus arboris rostratis. M. H. 3. 634. Sect. 15. T. 7. 5. Muscus alter,*

18 PLANTAE TERRESTRES SIMPLICIORES.

levis, latifolius, coralloïdes, ἄφωλλος. Col. 1. 334. *Muscus arboreus, coralloïdes.* C. B. P. 361. †.

29. Lichen; cinereus; arboreus; marginibus fimbriatis. T. 550. †.

30. Lichen; pyxidatus; major. T. 549. *Musco-fungus pyxidatus; muralis; major; & rugosior.* M. H. 3. 632. *Muscus terrestris, tubulis majoribus & candidioribus.* C. B. Prodr. 152. *Muscus terrestris, pyxidatus alabastriculos imitatus.* Lob. Ic. 2. 267. †.

31. Lichen; pyxidatus; minor. T. 549. *Muscus pyxioides, saxatilis.* C. B. P. 361. Prodr. 152. J. B. 3. 767. *Musco-fungus pyxidatus, saxatilis.* M. H. 3. 632. †.

32. Lichen; pyxidatus; minimus. *Lichen corniculis aduncis.* T. 549. †.

33. Lichen; pyxidatus; teres; acetabulis minoribus, repandis. T. 549. †.

34. Lichen; pyxidatus; non ramosus; acetabulis fimbriatis. T. 549. †.

35. Lichen; pyxidatus; prolifer. T. 549. †.

36. Lichen; pyxidatus; prolifer; acetabulorum fimbriis tumentibus, coccineis. *Lichen pyxidatus, acetabulorum oris coccineis & tumentibus.* T. 549. *vel & fuscis.* Id. Ib. *Musco-fungus pyxidatus, calice altero alteri innato, apicibus nonnunquam coccineis.* M. H. 3. 632. Sect. 15. T. 7. 4. *Muscus multiformiter pyxidatus, apicibus coccineis.* Plot. Nat. Hist. Stafford. 199. T. 14. F. 1. †.

37. Lichen; pyxidatus; acetabulorum oris fuscis & tumentibus. T. 549. †.

38. Lichen; pyxidatus; acetabulorum oris nigerrimis & tumentibus. †.

2. CORALLOIDES. T. 564. 332.

Materies arida, exsucca, lichenis materie durior, fragilis, lignescens.

Forma fere naturæ coralliorum similis, ramosa, apiculata.

Apiculis supremorum ramulorum accrescunt tubercula fungosa, per maturitatem aperienda, caduca, fieta semine tenuissimo.

1. Coralloïdes; cornua cervi referens, corniculis brevioribus. T. 565. *Muscus coralloïdes, saxatilis, cornua cervi referens.* C. B. P. 361. *Lithobryon coralloïdes.* Col. 2. 83. *Musco-fungus montanus, corniculatus, minor.* M. H. 3. 632. *Muscus corniculatus.* J. B. 3. 767. *Hæc, vel erectior assurgit, vel jacet humifusa, species, utraque obvia.* †.

2. Coralloïdes; cornua cervi referens, corniculis longioribus. T. 565. *Musco-fungus, montanus corniculatus, major.* M. H. 3. 632. Sect.

PLANTAE TERRESTRES SIMPLICIORES.

19

- Sett.* 15. *T.* 7. 1. *Muscus ceranoides*, major. *C. B. P.* 361. †.
 3. Coralloides; qui musco-fungus; ceranoides; albus; tuberculatus; apicibus nigris. *M. H.* 3. 633. *Muscus ceranoides*, albus, fungosus, apicibus nigris. *Plukn. Phyt. T.* 205. *F.* 6. †.
 4. Coralloides; qui musco-fungus; coralloides; montanus; ramosissimus; fuscus. *M. H.* 3. 633.
 5. Coralloides; corniculis candidissimis. *T.* 565. †.
 6. Coralloides; candida; ramosissima; exigua. †.
 7. Coralloides; candida; ramosissima; mollis. †.
 8. Coralloides; candida; ramosissima; mollis; capillaris. †.
 9. Coralloides; candida; ramosissima; mollissima; filis pilo tenuioribus. †.

3. LENTICULA. *C. B. P.* 362.

Nativitas in aquâ, atque in ejus superficie sedes.

Habitus totus simplex, foliaceus.

Radiculae tenues, capillaceae, pellucidulae.

1. Lenticula; palustris; vulgaris. *C. B. P.* 362. *Lens palustris.* *Dod.* p. 587. *J. B.* 3. 784. †.
 2. Lenticula; palustris; major. *Commel. Ind.* 63. †.
 3. Lenticula; aquatica; trifulca. *C. B. P.* 362. *J. B.* 3. 786. *Hederula aquatica.* *Lob. Ic.* 2. 36. †.

PLANTAE TERRESTRES, FLORE NON CONSPECTO HACTENUS.

MUSCUS. *T.* 550. 326.

Radiculae tenues, capillaceae, saepe Parasiticae.

Foliola multa, tenella, absque ordine, cauliculis circumposita.

Flores vix unquam apparent, nisi una forte ab aliis distincta valde specie.

In fine pedunculi fructus, qui constat vasculo oblongo, cylindrico, vel quadrangulo, tecto operculo conico, per maturitatem deciduo, intra vasculum semina multa, minutissima.

1. Muscus; vulgatissimus. *C. B. P.* 360. *Muscus terrestris*, & *hortensis.* *J. B.* 3. 764. *Muscus squamosus major*, sive vulgaris. *T.* 553. *Muscus terrestris vulgaris.* *Lob. Ic.* 2. 242. †.

C 2

2. Mu-

2. Muscus; squamosus; cypressiformis. *T.* 554. *Muscus cypressiformis, ramosus.* *C. B. P.* 361. *Muscus cypressiformis.* *C. B. Prodr.* 152. †.
3. Muscus; terrestris; vulgaris; minor; adianthi aurei capitulis. *M. H.* 3. 625. *Muscus terrestris, minor, maximo similis, omnium vulgarissimus.* *Raj. Syn.* 36. †.
4. Muscus; terrestris; vulgaris; præcedenti minor; adianthi aurei capitulis. †.
5. Muscus; squamosus; ramosus; crassior; capitulis incurvis. *T.* 553. †.
6. Muscus; squamosus; ramosus; tenuior; capitulis erectis. *T.* 553. †.
7. Muscus; squamosus; ramosus; viridissimus. †.
8. Muscus; trichoides; montanus; albidus; fragilis. *M. H.* 3. 630. *Seet.* 15. *T.* 6. *F.* 22.
9. Muscus; densis foliolis juniperinis, in cespitem aggestis. †.
10. Muscus; ramosus; erectus; major. *C. B. Prodr.* 151. †.
11. Muscus; squamosus; ericæ folio; ramosissimus. *Muscus terrestris, surculis filamentosis, tenacibus, abietinis, semel tantum divisis.* *M. H.* 3. 626. *Seet.* 15. *T.* 5. *F.* 222. †.
12. Muscus; terrestris; erectior; foliis reflexis. *Raj. Syn. M. H.* 3. 624. *Seet.* 15. *T.* 5. *F.* 2. †.
13. Muscus; squamosus; linariæ folio; minor; crispus; capitulis recurvis. *T.* 554. †.
14. Muscus; ad polytrichoidem accedens; ramosus; foliis longis, lucidis, & veluti crispis. *M. H.* 3. 630. *Seet.* 15. *T.* 6. *F.* 1.
15. Muscus; polytrichoides; elatior; foliis angustis, & fere membranaceis. *M. H.* 3. 630. *Seet.* 15. *T.* 6. *F.* 2. *Raj. Syn. Plukn. Phyt. T.* 44. *F.* 7. †.
16. Muscus; polytrichoides; humilior; foliis brevioribus, raris, pallide viridantibus, & vix pellucidis. *M. H.* 3. 630. *Seet.* 15. *T.* 6. *F.* 3. †.
17. Muscus; terrestris; vulgari similis; lanuginosus. *Raj. Syn.* 37. †.
18. Muscus; terrestris; tenuioribus foliis; cespitosus; varius. †.
19. Muscus; terrestris; medius; supinus; & repens; foliolis crebris in acutos mucrones desinentibus. *Raj. Syn.* 37. †.
20. Muscus; montanus; flagellis longis, tenuibus, cypressinis; ut plurimum indivisis. *M. H.* 3. 624. *Seet.* 15. *T.* 5. *F.* 7. *Muscus montanus, gracilis, ramosus, viticulis longioribus, glabris.* *Plukn. Phyt. T.* 47. *F.* 4. †.
21. Muscus; filicinus; minor; capitulis longis, gracilibus, acutis. †.
22. Muscus; filicinus; major. *C. B. P.* 360. *Muscus filicinus.* *J. B.* 3. 764. †.

23. Muscus; filicinus; minor. *C. B. Prodr.* 151. *M. H.* 3. 625. *Seet.* 15. *T.* 5. *F.* 2. †.

24. Muscus; terrestris; repens; veluti spicatus. *M. H.* 3. 625. *Seet.* 15. *T.* 5. *F.* 21. *Muscus ramosus, repens, veluti spicatus. C. B. Prodr.* 151. †.

25. Muscus; repens; ramosus; pennatus; subtilissimè divisus; foliolis crispis. †.

26. Muscus; repens; ramosus; pennatus; subtilissimâ divisurâ. *An muscus capillaceus, minimus, plumosus, elegans. T.* 552? †.

27. Muscus; repens; ramosus; pennatus; subtilissimè divisus; foliolis crispis, reflexis. †.

28. Muscus; capillaceus; albus; montanus. †.

29. Muscus; coronatus; major; pileolo villoso, aureo. *M. H.* 3. 630. *Muscus aureus, capillaris, medius. H. L. Muscus capillaceus major, pediculo & capitulis crassioribus. T.* 550. *Polytrichon aureum, majus. C. B. P.* 356. *Park.* 1052. *Polytrichum Apuleji majus quibusdam. J. B.* 3. 760. *Adiantum aureum majus. Gerard.* 1559. *Adiantum aureum. Tab. Ic.* 797. & in *Opere pag.* 1186. †.

30. Muscus; coronatus; medius; pileolo villoso, tenuiore. *M. H.* 3. 630. *Seet.* 15. *T.* 7. *F.* 6. †.

31. Muscus; coronatus; humilis; rigidior; capitulis longis, acutis, sessilibus, erectis. *M. H.* 3. 630. *Seet.* 15. *T.* 7. *F.* 8.

32. Muscus; coronatus; humilis; tenuifolius; pileolo magno, acuto, infra aperto, exstinctorium referente. *M. H.* 3. 630. *Seet.* 15. *T.* 7. *F.* 12. †.

33. Muscus; coronatus; humilis; tenuifolius; pileolo minore, acutiore, ruberrimo. †.

34. Muscus; coronatus; medius; foliis tenuissimis, pallidis, longioribus; capitulis erectis. *M. H.* 3. 630. *Seet.* 15. *T.* 7. *F.* 11. †.

35. Muscus; capillaris; floribus in apice coccineis, expansis. †. *Hec una species veros elegantesque flores ferre videtur satis manifestos; qui apici insidentes caliculo foliaceo succincti discum formant, pelliculis flavis, coccineisve, constructum.*

36. Muscus; terrestris; ramosus; foliolis latioribus, longioribus, crispis; capitulis cylindricis, nutantibus; major, & minor. †.

37. Muscus; coronatus; minor; foliolis latiusculis, ad caulem convolutis; capitulis cernuis, & obtusis, aureis. *M. H.* 3. 631. *Seet.* 15. *T.* 7. *F.* 17. *Muscus capillaris, pediculis bulbosis, uncialibus, pallidis, capitula oblonga, reflexa, sustinentibus. Raj. Syn.* 34.

38. Muscus; aureus; capillaris; minimus; capitulo longo, subflavo. *H. L. Polytrichum aureum, minimum, capitulatum, oblongo-rotundum, colore subviridi. Commel. Ind.* 91. †.

39. Muscus; aureus; capillaris; minimus; capitulo oblongo, rotundo, subviridi. *H. L. Polytrichum aureum, minimum, capitulatum,*

oblongo-rotundum, colore subviridi. Commel. Ind. 91. †.

40. Muscus; coronatus; minimus; foliolis & capitulis oblongis in pediculis brevissimis. *M. H. 3. 631. Sect. 15. T. 7. F. 18. †.*

41. Muscus; aureus; capillaris; minor. *L. H. Polytrichon aureum, minus. C. B. P. 357. Polytrichum Apuleji, minus, quorundam. J. B. 3. 760. †.*

42. Muscus; subtilissimus omnium; ramosus; terrestris; capitulis falcatis; minimus. *An muscus terrestris capillaris, capsulâ oblongâ. Commel. Ind. 77. †.*

43. Muscus; terrestris; non ramosus; fili aranæ tenuitate; capitulis falcatis. †.

44. Muscus; minor; denticulatus; sericeus; nostras; capitulis adianthi. *M. H. 3. 626. Sect. 15. T. 6. F. 35. †.*

45. Muscus; capillaris; humilis; confertissimè nascens; capitulo cylindrico operculo rostrato.

46. Muscus; saxatilis; squamosus; dentatus; capitulis adianthi. †.

47. Muscus; saxatilis; viridissimus; foliolis longioribus, crispis. †.

48. Muscus; capillaceus; lanuginosus; minimus. *T. 552. Muscus trichoides, hirsutus, capitulis oblongis, reflexis, pediculis brevibus insidentibus. D. Doody. M. H. 3. 629. Sect. 15. T. 6. F. 21. †.*

49. Muscus; minimus; è viridi argenteus; capitulis oblongis, cernuis. *M. H. 3. 629. Sect. 15. T. 6. F. 17. †.*

50. Muscus; denticulatus; major. *C. B. P. 360. Muscus pulcher, parvus, repens. J. B. 3. 765. Muscus, terrestris, denticulatus. Lob. Ic. 2. 243.*

51. Muscus; denticulatus; minor. *C. B. P. 360. Muscus terrestris, Lusitanicus. J. B. 3. 765. Muscus terrestris, denticulatus, alter. Lob. Ic. 2. 244. †.*

52. Muscus; abietis facie. *C. B. P. 360. J. B. 3. 765. †.*

53. Muscus; aquaticus, conserva dictus. *Raj. Syn. 24. Alga viridis, capillaceo folio. C. B. P. 364. T. 569. Conserva Plinii. Lob. Ic. 2. 257. †.*

Hæ sunt species muscorum, quas variis anni temporibus legere licuit in locis urbi vicinis; sunt quidem plures aliæ, ut curioso Scrutatori abundans in hisce superfit materies. Certè enarratæ omnes, quasi viverent, servatæ facillè recenseri possunt. Subtilis seminum tenuitas effecit, ut acutissimi Observatoris oculos fugerit hætenus prima fœti seminis in plantulam germinatio: quare anceps hæreo, quanam lobi in his seminalis species.

PLANTÆ CAPILLARES.

Plantæ, Capillares dictæ, Europææ, veram familiam constituentes, carent caule, & flore hætenus visibili; semina verò oculo nudo præ tenuitate vix conspicua in vasculis intra binas membranulas tenues positis gerunt. Ipsa hæc vascula in foveis foliis certâ serie insculptis locantur: unde Epiphyllispermæ appellantur.

I. FOLIO SIMPLICIORE.

LINGUA CERVINA. T. 544. 319. 320. 321. Malp. An. Pl. 72. 298. Grew. An. of pl. LXXII.

Capsulæ seminales in pronâ parte folii, serie vermiculari, tenui cuticulâ tectæ, quæ perrumpitur à maturis hiscè fructibus. Constant tenui pelliculâ orbiculari, lenticulari, cavâ, annulo elastico cinctâ, quæ maturum fructum rumpens, semina displodit tenuissima.

Folia simplicia, longa, integra, vel laciniata, aut & rarissimè ramosa in peregrinis.

1. Lingua Cervina; officinarum. C. B. P. 353. Phyllitis. Dod. p. 467. Phyllitis; vulgaris. Clus. H. ccxiii. M. H. 3. 556. Phyllitis; sive Lingua Cervina vulgi. J. B. 3. 756. †.

2. Lingua Cervina; angustifolia, lucida, folio serrato. HRPar. Phyllitis; crispa. J. B. 3. 757. Lingua Cervina; seu Phyllitis latifolia, per margines undulata. M. H. 3. 557.

3. Lingua Cervina; majore folio, in duas tresve lacinias & profundius dissecto. HRPar.

4. Lingua Cervina; maxima; folio auriculato, parum undulato, in duas tresve lacinias secto.

5. Lingua Cervina; maxima; undulato folio, auriculato per basin. HRPar. M. H. 3. 557. descr. & Ic. Phyllitis, seu Lingua Cervina maxima, undulato folio, auriculato per basin. Plukn. Phyt. cexlviii. 1. Lingua Cervina, maxima, undulato per oras folio & auriculato per basin. Morini. Jonquet. Hort.

6. Lingua Cervina; minima; folio undulato. HRPar. Lingua Cervina, minima. Joncq. Hort.

7. Lingua Cervina; folii magni, crispî, nervo exterius aculeato. Lingua Cervina; medio folii nervo in aculeum abeunte. HRPar.

Sett. 14. T. 1. Ic. 9.

9. Lin-

24 PLANTAE TERRESTRES SIMPLICIORES.

9. Lingua Cervina; medio folii fimbriati nervo in aculeum abeunte. *Vaill.*

10. Lingua Cervina; multifido folio. *C. B. P.* 353. *M. H.* 3. 557. *Sect.* 14. *T.* 1. *lc.* 2. *Phyllitis*, *polyschides*. *J. B.* 3. 757. *Phyllitis laciniato folio*. *Clus. H.* ccxiii. *Phyllitis laciniata*. *Dod.* p. 467.

11. Lingua Cervina; quæ Phyllitis; major; ex uno pedunculo, quandoque bifolia. *M. H.* 3. 557.

12. Lingua Cervina; minor; ex uno pedunculo quandoque trifolia. *HRPar. Phyllitis*, seu *Lingua Cervina minor*, *crispa*, *folio multifido*, *ramosa*. *Plukn. Phyt.* ccxlviii. 2.

13. Lingua Cervina; ramosa; folio per summum in orbem convoluto. *HRPar.*

14. Lingua Cervina; ramosa; major; foliis multifidis & crispis. *HRPar.*

15. Lingua Cervina; folio maximo, infra auriculato, supra in amplas lacinias foliaceas explicato.

HEMIONITIS. *T.* 546. 322. 323. *Raj. Meth.* 11.

Folia simpliciora, ad basin excavata in sinum, unâ cum appendicibus duabus instar auricularum, vel instructa laciniiis ad basin.

Cætera fere ut Linguae Cervinae.

1. Hemionitis; vulgaris. *C. B. P.* 353. *Hemionitis*. *J. B.* 3. 758. *Hemionitis vera*. *Clus. H.* ccxiii. *M. H.* 3. *Tab. post.* 596.

II. FOLIO MAGIS COMPOSITO.

POLYPODIUM. *T.* 540. 316. *Raj. Meth.* 12. *Malp. An. Pl.* 72. 299.

Planta non ramosa.

Folio ad nervum usque secto in partes angustas, oblongas, non adherentes pediculo, sed basi latâ complectentes nervum; saepe laciniae non ad rachin usque sunt divisa, sed foliosâ structurâ continuatae.

Instructus duplici serie nervo laciniae parallelâ in singulis laciniiis nascuntur, pelliculâ tenui tecti, membranacei, circulo crenato cincti elastico, qui in rectam lineam se explicans displo- dit semina, intra binas teneberrimas membranulas nata, angulosa.

1. Polypodium vulgare. *C. B. P.* 359. *Polypodium*. *J. B.* 3. 746. *Polypodium majus*. *Dod.* p. 464. *M. H.* 3. 562. *♂ fig. T.* 2. *post.* 596. †.

2. Polypodium minus. *An C. B. P.* 359. *Dod.* p. 464. †.

3. Po-

PLANTAE TERRESTRES SIMPLICIORES. 25

3. Polypodium sensibile; aut polypodium Virginianum. Munt. H. 289. 290. Ic. & descr. Herba viva, foliis polypodii. C. B. P. 359. Filix Indica, osmundæ facie. Bod. a Stap. in Theoph. 320. Polypodium Virginianum, osmundæ facie tenerius. M. H. 3. 563. descr. & Tab. 11. post. 596. Filix Indica, polypodii facie. Mentzel. Filix Indica, vel herba viva, foliis polypodii. Sim. Pauli. Filix, seu polypodium Indianum, foliis profundè sinuosis, marrubii aquatici æmulis. Plukn. Alm. 153. Phyt. T. 30. F. 3.

4. Polypodium Cambro-Britannicum; pinnulis ad margines laciniatis. Raj. H. 137. Filix, amplissima, lobis foliorum laciniatis, Cambrica. Plukn. Phytogr. T. xxx. F. 1.

5. Polypodium tenerum minus. Dryopteris, vel querna filix. Lob. Pac. Diss. Lib. 4. Cap. Advers. 363. Ic. 475. observ. Filix minor, non ramosa. J. B. 3. 740. *art Dryopteris*

6. Polypodium; angustifolium; folio vario. T. 540. Lonchitis minor. C. B. P. 359. Lonchitis altera, folio polypodii. J. B. 3. 744. Lonchitis aspera. Dod. p. 469. †

ASPLENIUM. T. 544. 318. Scolopendria, seu asplenium etiam Ceterach. Raj. Meth. 13. Malp. An. Pl. 72. 299.

Folio in segmenta breviora, & rotundiora, minus altè incisa, alternatim quasi & undulatim serpentina dissecto.

Fruëtibus occupantibus totam aversam pinnae faciem, cæterum similibus polypodii.

1. Asplenium; five Ceterach. J. B. 3. 749. Ceterach officinarum. C. B. P. 354. Asplenium. Dod. p. 468. Scolopendria vera Anguill. Tabern. †

LONCHITIS. T. 538. 314. Raj. Meth. 12.

Folio filicis, pinnulis ad basin auriculatis.

Fruëtus ut filicis.

1. Lonchitis; aculeata; major. T. 538. Filix aculeata, major. C. B. P. 358. Filix mas, aculeata, major. C. B. Prodr. 151. †

TRICHOMANES. T. 539. 315.

Folia foliis subrotundis constantia quasi conjugata.

Fruëtus ut filicis.

1. Trichomanes; five Polytrichon; officinarum. C. B. P. 356. Trichomanes, five Polytrichon. J. B. 3. 754. Trichomanes. Dod. p. 471.

2. Trichomanes; foliis eleganter incis. T. 539. Adiantum mas. Tabern. Ic. 797.

ADIANTHUM. T. 545. 317.

*Folia subrotundula.**Fructus in foliis instar fere polypodii.*

1. Adiantum; foliis longioribus; pulverulentis; pediculo nigro. C. B. P. 355. *Adiantum*, nigrum officinarum. J. B. 3. 742. *Dryopteris nigra*. Dod. p. 466. *Filicula*, quæ adiantum nigrum officinarum, pinnulis obtusioribus. T. 542.

2. Adiantum Americanum. Corn. Ic. 6. *descript.* 7. *Ruta muraria maxima*. Sloan. *Jam.* T. 48. F.

RUTA MURARIA. T. 541. 317.

*Folia rutæ similia.**Fructus in foliis, polypodii similes.*

1. *Ruta muraria*. C. B. P. 356. J. B. 3. 753. Dod. p. 470. T. 541. Tab. 317. *Salvia vitæ*. Lob. †.

FILIX. T. 536. 310. 311. 312. 313. Malp. An. Pl. 72. 300.

Folio ex aliis foliis composito, quæ costæ adhærent ita, ut utrinque pinnulas ad nervum usque sectas habeant.

Fructu ut polypodii.

1. *Filix*; non ramosa; dentata. C. B. P. 358. *Filix* vulgò mas dicta, sive non ramosa. J. B. 3. 737. *Filix mas*. Dod. p. 462. *vid.* Fig. in M. H. 3. Tab. 3. post. 596.

2. *Filix*; non ramosa; latifolia; dentata. T. 536. *Filix*; non ramosa; major, pinnulis latiusculis, longioribus, in profundiores denticulos divis. M. H. 3. 579. N^o. 11. *descr.* Ic. Tab. 3. post. 596. *Filix*, mas, ramosa, pinnulis dentatis. Ger. *emac.* *Filix*, non ramosa; dentata; in orbem nidum avis exprimentem excrescens. H. L. †.

3. *Filix*; non ramosa; latifolia; dentata profundius; pinnulis maximis.

4. *Filix*; non ramosa; minor; pinnulis in summo leviter incis. Flor. 1. 147. *An filix*, mollis, vulgari mari accedens. J. B. 3. 738. Tab. 3. post. 596. M. H. 3. ? *Hujus folia præ fertili abundantia seminum crispata evadunt.*

5. *Filicula*; fontana; major; sive adiantum album; filicis folio. C. B. P. 358. *Adiantum*, album, folio filicis. J. B. 3. 741. *Dryopteris*, candida. Dod. p. 465. *Dryopteris*, alba. *Noddae* Lued 1227.

6. *Filix*; baccifera. Corn. 5.

7. Filix saxatilis Tragi. *J. B.* 3. 755. *Park. Filicula saxatilis, corniculata. T.* 542. *Adiantum, acrostichon, seu furcatum. Thal. Filix saxatilis V; seu corniculata. C. B. P. Muscus corniculatus. Ger. Ic.* 1561. *Hæc singulari formâ; a reliquis separari potest.*

8. Filicula; saxatilis; regia; pinnulis ad fumariam accedentibus. *Vaill.*

9. Filicula; saxatilis; pinnulis brevioribus acutis. *T.* 542. *Filix saxatilis, non ramosa, minima. Raj. Syll.*

OSMUNDA. *T.* 547. 314.

Flore carens; fructu in racemis.

1. Osmunda vulgaris, & palustris. *T.* 547. *Filix, ramosa, non dentata, florida. C. B. P.* 357. *Filix palustris. Dod. p.* 463. *Osmunda regalis, sive filix florida. Park. Theatr.* 1038. *Filix, floribus insignis. J. B.* 3. 736. †.

2. Osmunda; foliis lunatis. *T.* 547. *Lunaria, racemosa, minor, vel vulgaris. C. B. P.* 354. *Lunaria, botrytis. J. B.* 3. 709. *HEyft. vern. o. Arb. & Frut. f.* 3. fig. 3. *Lunaria. Dod. p.* 139. †.

OPHIOGLOSSUM. *T.* 548. 325.

Folio unico.

Fructu lingulato, diviso in multas cellulas, duplici ordine positas, semine plenas.

Ophioglossum vulgatum. C. B. P. 354. *Ophioglosson. J. B.* 3. 708. *Dod. p.* 139. *HEyft. vern. o. 6. f. 7. fig. 2. †.*

Universa hæc familia Stirpium umbrosa amat, atque humore irriguo madentia semper, loca; neque facile dictu, quonam apparatu semina sata has primò producant: unde ignoro, monocotyledonibus, dicotyledonibus, an polycotyledonibus, accensere has oporteat.

Ceterum puto, contemplatione ductus modi, quem natura fere ubique observat, in ipsâ fabricâ simplici Plantarum hucusque recensitarum industriam humanam detecturam esse flosculorum fructuumque simile quid. Quis enim de eo dubitet, post observatos Malpighio in ficu tectos flosculos integros, atque fructus? Certè seminalia organa requiri in his, & ovaria, tota natura clamat.

DE PLANTIS MAGIS PERFECTIS.

Plantæ flore & fructu manifesto præditæ, adeoque compositâ magis ex organis diversis fabricâ.

Hæ commodè satis, ex lege naturæ, in binas ordi-
nantur lineas; quarum prior Dicotyledonum, Mo-
nocotyledonum altera, titulo insignitur: nam exhaurit
hæc bifariam instituta divisio numerosissimum Stirpium
floriferarum genus, manifestis patet indiciis, ipsique
sanè Disciplinæ Herbariæ usum præstat. Polycotyledo-
nes quam paucissimæ hucusque se obtulerunt: ut non-
dum cogamur tertium hisce ordinem fingere.

PLANTÆ DICOTYLEDONES.

Habent semen vel ovum, constans binis lobis seminalibus, & embryo his utrinque per radículas innato, atque inter hos recondito; quibus defenditur in longam diem, atque prægnanti succo alimentoso primò nutritur. Vid. Malp. An. Pl. 75. 301. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. Grew. an of pl. C. 1. T. 1. totâ, T. 2. F. 1. 2. 3. 4.

Harum quidem prima series est.

C L A S S I S GYMNOPOLYSPERMARUM.

*Quibus flos hermaphroditus, petalis tribus, pluribusve, constans, natis ex ambitu basios ovarii, plerunque expansis circa illud, staminibus intra hæc & ovarium natis. Ova-
rium tumescenti apici pedunculi innatum constat axi erecto ex
centro basios ovarii, cui undique, ut placentæ, accreti hæ-
rent utriculi semen vel ovum condentes, quod cum involucris
suis deciduum per maturitatem*

I. GENUS.

CHELIDONIUM MINUS. *Dod. p. 49.**Radix grumosa, vel glandulosa, perennis.**Folia subrotunda.**Caules procumbentes, florigeri; in apice gerunt placentulam, cujus basi succrescit perianthium, plerunque triphyllon, quandoque tetraphyllum, rarius pentaphyllum, semper caducum.**Flos rosaceus, polypetalus, pentapetalus ad minimum, expansus, petalis natis, ex ambitu infimæ basios placentulæ, intra calicem, cum staminibus numerosis natis ex ambitu infimo placentæ, intra petala & ovarium.**Placentæ ovarium innascitur globosum, cujus singula conceptacula, vel ova, unâ incurvâ vaginâ apice fungoso donatâ instructa sunt.*

1. *Chelidonium; minus. Dod. p. 49. HEyst. Vern. o. 1x. F. 1. Fig.*
 2. *Chelidonia rotundifolia, minor. C. B. P. 309. Ranunculus, vernus, rotundifolius, minor. T. 286. Ranunculus, præcox, rotundifolius, radice granulosa. M. H. 2. 446. Scrophularia minor. J. B. 3. 30. 468. Hemorrhoidum herba. Hier. Brunsw. †.*

2. *Chelidonium; minus; folio anguloso, maculoso. Chelidonia rotundifolia, minor, folio maculoso. C. B. P. Var. †.*

3. *Chelidonium; minus; flore pleno. Camerar. Hort. 40. †.*

4. *Chelidonium; minus; folio majori, anguloso. Chelidonia rotundifolia, major. C. B. Prod. 137. †. Huic calix frequentissimè quinque foliolis præditus, atque cauliculi ramosi.*

2.

HEPATICA TRIFOLIA. *Clus. H. CCXLVI.**Radix fibrosa, restibilis.**Pediculi foliorum e radice surgentes.**Folia trilobata.**Caules nudi, florigeri, simplices, ex radice surgentes.**Perianthium monophyllum, in tria ferè, rarò in quatuor, segmenta profundè dissectum, stabile.**Flos rosaceus, polypetalus, pentapetalus naturaliter; staminibus numerosis ornatus.*

D 3

Fru-

Fruētus globosus; cujus conceptacula singula unā tubā incurvā instructa; ut in chelidonio minore cetera.

1. Hepatica; trifolia; cæruleo flore. *Clus. H. CCXLVII. Hepatica nobilis; flore simplici, cæruleo. H. L. Trifolium hepaticum; flore simplici, cæruleo. C. B. P. var. 330. M. H. 2. 433. Ranunculus tridentatus, vernus, flore simplici, cæruleo. T. 286. Trifolium hepaticum, sive trinitatis herba, flore cæruleo. J. B. 2. 389. Hepatica aurea, flore cæruleo. HEyst. Vern. o. 2. F. 3. Fig. IV. Ranunculoïdes; qui ranunculus tridentatus vernus, flore cæruleo simplici. T. 1. Vaill.*

2. Hepatica; trifolia; flore cæruleo, pleno. *Clus. H. CCXLVII. Hepatica aurea, flore pleno, & cæruleo. HEyst. Vern. o. 2. F. 2. Fig. 1.*

3. Hepatica; trifolia; rubro flore. *Clus. H. CCLXVIII. Hepatica aurea, flore rubro. HEyst. vern. o. 2. F. 3. Fig. V.*

4. Hepatica; trifolia; flore rubro, pleno. *Hepatica nobilis, flore rubro, pleno. H. L.*

5. Hepatica; trifolia; flore albo, simplici. *Hepatica nobilis, flore simplici, albo. H. L. Hepatica aurea; flore albo. HEyst. vern. o. 2. F. 2. Fig. 2.*

6. Hepatica; trifolia; flore carneo, simplici. *Hepatica nobilis, flore carneo, simplici. H. R. Par. 108.*

7. Hepatica; trifolia; flore cinereo, simplici. *Hepatica nobilis, flore cinereo, simplici. H. R. Par. 108.*

3.

RANUNCULUS. T. 285. 149.

Perianthium pentaphyllum plerunque, quandoque hexaphyllum, fere caducum.

Flos rosaceus, pentapetalus plerunque, aut hexapetalus; petala vide apud Malp. An. Pl. 47. 167. cum staminibus numerosis.

Fruētus rotundus, vel oblongus; cujus conceptacula singula instructa sunt tubā incurvā variā in variis speciebus. Cetera ut in chelidonio minore.

Foliis dissectis majoribus aconiti vel geranii.

1. *1. Ranunculus pratensis; erectus; acris. C. B. P. 178. M. H. 2. 439. Ranunculus, rectus, non repens, flore simplici, luteo. J. B. 3. 416. Ranunculus pratensis, surrectis cauliculis. Lob. Ic. 665. Ranunculus hortensis, erectus, flore simplici, luteo. HEyst. vern. o. 1. F. 14. Fig. 1. †.*

2. Ranunculus pratensis; erectus; acris; in folii medio maculatus. C. B. P. var. †.

3. Ra-

3. *Ranunculus pratensis*; erectus; dulcis. *C. B. P. M. H.* 2. 439. *Ranunculus, oleraceus, erectus, flore simplici, luteo.* *HEyft. vern. o. 2. F.* 14. *F. 1. †.*

4. *Ranunculus hortensis*; erectus; flore pleno. *C. B. P.* 179. *Ranunculus, erectus, hortensis, flore pleno, luteo.* *HEyft. vern. o. 1. F.* 14. & *Ranunculus, erectus, minimus, flore pleno, luteo, prolifero.* *Ibid. Fig.* 3. *Ranunculus, rectus, non repens, pleno flore.* *J. B.* 3. 416. *Vid. Malsp. An. Pl.* 44. 151. †.

5. *Ranunculus*; rectus; foliis pallidioribus, hirsutis. *J. B.* 3. 417. *Ranunculus, oleraceus, major.* *Tab. Ic.* 52. a.

6. *Ranunculus pratensis*; repens; hirsutus. *C. B. P.* 179. *Ranunculus pratensis, procumbens, aut inclinans, hirsutus.* *M. H.* 2. 439. *Ranunculus, repens, flore luteo, simplici.* *J. B.* 3. 419. †.

7. *Ranunculus hortensis*; inclinans. *C. B. P.* 179. *Ranunculus, repens, flore pleno.* *J. B.* 3. 420. & *Ibid. append.* 857. *Ranunculus hortensis, flore pleno.* *HEyft. vern. o. 1. F.* 13. *Fig.* 2. †.

8. *Ranunculus*; magnus; valde hirsutus; flore luteo. *J. B.* 3. 417. *Ranunculus, montanus, major, flore luteo.* *HEyft. vern. o. 1. F.* 14. *Fig.* 2. †.

9. *Ranunculus pratensis*; repens; hirsutus; foliis ex albo variis. *H. R. Par.*

10. *Ranunculus*; polyanthemos; simplex. *Lob. Ic.* 666. †.

11. *Ranunculus*; montanus; aconiti folio; albus; flore minore. *C. B. P.* 182. *Ranunculus, albus, simplici flore.* *J. B.* 3. app. 860. *Ranunculus montanus, IV Clus. H.* 236. *Aconitum, ranunculoïdes, flore albo simplici.* *M. H.* 2. 450.

12. *Ranunculus*; folio aconiti; flore albo, multiplici, *C. B. P.* 179. *Ranunculus, albus, flore denso.* *J. B.* 3. app. 860. *Ranunculus, albus, flore pleno.* *HEyft. vern. o. 1. F.* 12. *Fig.* 1. *Ranunculus, pleno flore, albo.* *Clus. H.* 236. *Helleborus, ranunculoïdes, flore albo multiplici.* *H. L. Aconitum, ranunculoïdes, flore albo pleno.* *M. H.* 2. 450.

13. *Ranunculus pratensis*; radice verticilli modo rotundâ. *C. B.* 3. *P.* 179. *M. H.* 2. 439. *Ranunculus, tuberosus, major.* *J. B.* 3. 417. *Ranunculus bulbosus.* *Lob. Ic.* 667. *Ranunculus, flammula dictus.* *Ge-sner. Hort.* †.

14. *Ranunculus*; bulbosus; flore pleno. *C. B. P.* 179. *Ranunculus, radice tuberosâ, flore pleno & prolifero.* *C. B. P.* 179. *Ranunculus, maxima tubere, flore pleno magno.* *J. B.* 3. 418. *Ranunculus, bulbosus, major.* *HEyft. vern. o. 1. F.* 12. *Fig.* 3. *Rapum Divi Antonii vulgô.*

15. *Ranunculus*; hirsutus; annuus; flore minimo. *Raj. Syn.* 135. *Ranunculus, arvensis, annuus, hirsutus, flore omnium minimo, luteo.* *M. H.* 2. 440. †. a.

16. *Ranunculus*; palustris; apii folio; lævis. *C. B. P.* 180. *M. H.* 2. 441. *Ranunculus, palustris, flore minima.* *J. B.* 3. app. 858. *Ranun-*

culus sylvestris I. Dod. p. 426. *Scelerata* Apulejo. *Herba Sardoæ*. Guiland. *Apium risus* vulgò. †. a.

17. *Ranunculus*; chærophyllus; asphodeli radice. C. B. P. 181. *Ranunculus*, montanus, leptophyllus, asphodeli radice. Col. 1. 311.

18. *Ranunculus*; folio subrotundo; Virginianus; flore parvo; molliori folio. H. L. *Ranunculus*, Virginianus, auricomus. Bobart.

19. *Ranunculus*; nemorosus, seu sylvaticus; folio subrotundo. C. B. P. 178. M. H. 2. 438. *Ranunculus*, rotundifolius, vernus, sylvaticus. J. B. 3. app. 841. *Ranunculus*, auricomus. *Ranunculus dulcis* Tragi. Lob. Ic. 669. *Flos huic, vel calice, vel petalis, destitutus.*

20. *Ranunculus*; rotundifolius; vernus; sylvaticus; major; vel Cassubicus; foliis thoræ sive calthæ. Breyn. Prodr. 1. 45. *Flos & huic, vel calice, vel petalis, carens.*

21. *Ranunculus*; stellatus; echinatus; Creticus. C. B. P. 180. M. H. 2. 440. *Ranunculus*, stellatus, palustris, echinatus. J. B. 3. app. 858. *Ranunculus palustris*, echinatus. C. B. P. 180. Prodr. 95. M. H. 2. 440. *Ranunculus Apuleji* quibusdam. Clus. H. 223. *Ranunculo echinato* di Candia. Pon. Ital. Bald. 41. a.

22. *Ranunculus*; arvensis; echinatus. C. B. P. 179. M. H. 2. 440. J. B. 3. 859. †. a.

23. *Ranunculus*; arvensis; seminibus magis echinatis. Sherard. hoc titulo accepi ex Angliâ. a.

24. *Ranunculus*; lanuginosus; angustifolius; grumosa radice; major. C. B. P. 181. M. H. 2. 446. *Ranunculus*, Illyricus, radicibus bulbosis, foliis longis. J. B. 3. 863. *Ranunculus*, Illyricus, major. Clus. H. 240. *Ranunculus Illyricus*. HEyst. vern. o. i. F. 13. Fig. 1.

25. *Ranunculus*; lanuginosus; angustifolius; grumosa radice; minor. C. B. P. 181. M. H. 2. 446. *Ranunculus*, grumosa radice; IV Clus. H. 240.

26. *Ranunculus*; Lusitanicus; folio subrotundo; parvo flore. T. 286. *Ranunculi grumosa radice* I species II Clus. Hist. 238. *Ranunculus autumnalis*. Clus. Hisp. 316. *Ranunculus*, autumnalis, folio lato, rotundo, serrato. J. B. 3. 866. t.

27. *Ranunculus*; arvensis; parvus; folio trifido. C. B. P. 179. *Ranunculus minimus*, Apulus. Col. 1. 316. a.

Foliis dissectis minoribus.

28. *Ranunculus*; folio rutæ; flore aureo, simplici. Ind. 3. t.

29. *Ranunculus*; rutaceo folio; flore pleno, luteo, minori. Fl. 2. 3. t.

30. *Ranunculus*; tenuifolius; montanus; luteus. J. B. 3. 416.

31. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore sanguineo. C. B. P. 181. M. H. 2. 436. *Ranunculus Constantinopolitanus*, flore sanguineo, pleno. J. B. 3. app. 864. *Ranunculus Asiaticus*, grumosa radice, pleno flore. I Clus. H. 242. *Ranunculus Asiaticus*, grumosa radice, flore pleno, ruberrimo. HEyst. vern. o. 1. F. 15. Fig. 2. t.

32. Ra-

32. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore subphoeniceo, rubente. *C. B. P.* 181. *Ranunculus Asiaticus*, grumosa radice, pleno flore. *Clus. II. H.* 243. *t.*
33. *Ranunculus*; asphodeli radice; prolifer; miniatus. *C. B. P.* 181. *M. H.* 2. 436. *Ranunculus Asiaticus*, grumosa radice, pleno flore. *Clus. III. H.* 243. *Ranunculus Asiaticus*, grumosa radice, flore pleno, sanguineo, prolifero. *H. Eyst. Vern. o. i. F.* 15. *Fig. i. t.*
34. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore sanguineo, maximo. *H. R. Par. Hujus simplex species. Ranunculus Asiaticus*, grumosa radice, flore phoeniceo ruberrimo. *H. Eyst. Vern. o. i. F.* 15. *F. 4. t.*
35. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore magno, pleno, albo, roseo. *H. R. Monsp. t.*
36. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, albo, parvo, rubris striis distincto. *H. R. Monsp. t.*
37. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, ex albo virescente. *H. R. Monsp. t.*
38. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore flavo, venis rubris distincto. *H. R. Par. t.*
39. *Ranunculus*; flore pleno flavescente, & rubris lineis elegantissime variegato. *H. R. Par. t.*
40. *Ranunculus*; alepus; grumosa radice; flore miniato, per oras luteo. *H. R. Par. Hujus simplex species. Ranunculus Asiaticus*, grumosa radice, flore flavo, rubris venis distincto. *H. Eyst. Vern. o. i. F.* 15. *F. 5. t.*
41. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, ex albo viridi; petalis angustis undulatis. *t.*
42. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, ex aureo & rubro eleganter vario; petalis angustis, acuminatis. *t.*
43. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore luteo, variegato. *H. R. Par. t.*
44. *Ranunculus*; Constantinopolitanus; Gigas; flore aureo, ingenti, centifolio. *t.*
45. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, ex albo virescente. *H. R. Monsp. t.*
46. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, ex albo virescente; flaminibus atris. *t.*
47. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, ex albo coronato; apiculis suaverubentibus. *t.*
48. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, magno, ex carneo, pallido, & viridescente, vario; petalis convolutis. *t.*
49. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, lacteo, punctis rubris ad apices ornato. *t.*
50. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, rubello; apiculis purpureis, & roseis. *t.*

51. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno; petalis undulatis, ex albo viridescens, apicibus rubellis. *t.*

52. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno; petalis angustis, ex flavo & rubro variis. *t.*

53. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, globoso, minori, coccineo. *t.*

54. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno; petalis purpureis, marginibus argenteis. *t.*

55. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, flavo, apiculis atropurpureis. *t.*

56. *Ranunculus*; asphodeli radice; flore pleno, magno, lacteo, superius lituris rubris eleganter picto. *t.*

57. *Ranunculus*; aquaticus; folio rotundo & capillaceo. *C. B. P.* 180. *M. H.* 2. 442. *Ranunculus aquatilis*, albus, tenuifolius. *J. B.* 3. 781. *†. aq.*

58. *Ranunculus*; aquaticus; capillaceus. *C. B. P.* 180. *M. H.* 2. 442. *† Millefolium aquaticum*, foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo. *C. B. P.* 141. *Ranunculus aquaticus*, omnino tenuifolius. *J. B.* 3. 781. *Ranunculus aquaticus*, alter, fœniculaceus, τριχόφυλλον. *Col.* 1. 316. *†. aq.*

59. *Ranunculus*; aquatilis; albus; fluitans; peucedami foliis. *H. L.* *Ranunculo*, sive polyanthemo aquatili albo affine, millefolium marathriphyllon, fluitans. *J. B.* 3. 782. *Millefolium aquaticum*, foliis fœniculi, ranunculi flore, & capitulo. *C. B. P.* 141. *†. aq.*

60. *Ranunculus*; ceratophyllus; seminibus falcatis, in spicam adactis. *M. H.* 2. 440. *Melampyrum luteum*, minimum. *C. B. P.* 234. *Perpusillum melampyrum*, luteum. *Lob. Ic.* 37. *Lugd.* 420. *a.*

Foliis integris.

61. *Ranunculus*; gramineo folio; flore caudato; seminibus in capitulum spicatum congestis. *T.* 293. *Holosteum affinis*, cauda muris. *C. B. P.* 190. *M. H.* 3. *Seet. Tab.* 17. *Ic. ult.* *Muosurus*. *J. B.* 3. 512. cauda murina. *Dod. p.* 112. *a. †.*

5. 62. *Ranunculus*; longifolius; palustris; major. *C. B. P.* 180. *M. H.* 2. 443. *Ranunculus*, longo folio, maximus, lingua Plinii. *J. B.* 3. 865. *†. aq. co.*

6. 63. *Ranunculus*; longifolius; palustris; minor. *C. B. P.* 180. *M. H.* 2. 443. *Ranunculus longifolius*, aliis flammula. *J. B.* 3. 864. *Flammula ranunculus*. *Dod. p.* 432. *†. aq. co.*

64. *Ranunculus palustris*, longifolius, minor, serratus. *M. H.* 2. 443. *Ranunculus palustris*, serratus. *C. B. P.* 180. *Flammula ranunculus*, folio serrato. *Dod. p.* 432. *†. aq. co.*

65. *Ranunculus*; montanus; folio gramineo. *C. B. P.* 180. *M. H.* 2. 444. *Ranunculus pumilus*, gramineis foliis. *J. B.* 3. 866.

66. *Ra-*

*ol. r. p. 102 and
cc. p. 160.*

66. *Ranunculus*; montanus; foliis plantaginis. *C. B. P.* 180. *M. H.* 2. 444. *Ranunculus Pyrenæus*, foliis sublongis, non laciniatus, albo flore. *J. B.* 3. 864. *Ranunculus Pyrenæus*, albo flore. *Clus. app. ult. auct.*

67. *Ranunculus*; Alpestris; palustris; lignosus; folio ocymi; echinatus. *H. C. a.*

68. *Ranunculus*; folio cyclaminis; radice asphodeli; major. *T.* 285. *Ranunculus*, asphodeli radice, dictus phthora major. *M. H.* 2. 449. *Ranunculus*, radice asphodeli, Thora dictus. *Flor.* 2. 4. Thora, folio cyclaminis. *J. B.* 3. 650. Phthora Valdensium, montis Baldi. *Clus. H.* 239. *Acronitum pardalianches*, I. seu Thora major. *C. B. P.* 184. Thora Valdensium. *Lugd.* 1735. t.

69. *Ranunculus*; aquaticus; hederaceus. *M. H.* 2. 441. *Ranunculus aquaticus*, hederaceus, luteus. *C. B. P.* 180. *Ranunculus hederaceus rivulorum*, se extendens, atrâ maculâ notatus. *J. B.* 3. 782. †. aq.

4

ADONIS. *C. B. P.* 178.

Folia fœniculacea, vel chamæmeli.

Flos rosaceus, polypetalos, cum calice pentaphyllo.

Capitulum seminale oblongum.

Semen vid. apud Malp. An. Pl. 50. 191.

1. Adonis; hortensis; flore minore, atrorubente. *C. B. P.* 178. *Flos adonis vulgô*, aliis *eranthemum*. *J. B.* 3. 125. *Eranthemum*. *Dod. p.* 260. *Ranunculus arvensis*, foliis chamæmeli, flore minore, atrorubente. *T.* 291. *Ranunculus*, folio anthemidis, flore rubicundo & splendente. *Cæsalp.* 546. *Anemone*, tenuifolia. *Cordi.* *Chamæmelum rubrum*. *Gesner. Hort.* *Eranthemum*, flore rubro & flammeo. *H. Eyst. Æst.* v. 5. F. 11. fig. 2. & 3. *Oculus Diaboli vulgô. a.*

2. Adonis; sylvestris; flore luteo; foliis longioribus. *C. B. P.* 178. *Var. Ranunculus arvensis*, foliis chamæmeli, flore citrino. *T.* 291. a.

3. Adonis; hellebori radice; bupthalmi flore. *H. L. Ranunculus*, fœniculaceis foliis, hellebori nigri radice. *H. R. Monsp. & T.* 291. *Helleborus niger*, tenuifolius, bupthalmi flore. *C. B. P.* 186. *Bupthalmum Dodonæi*, aliis *consiligo tenuifolia*. *J. B.* 3. 637. *Helleborus Hippocratis*. *Tab. Ic.* 721. *Bupthalmum Dodonæi*, pseudo-helleborus niger. *Clus. H.* 333. *H. Eyst. Hyem.* o. i. F. 4. fig. 3. *Huic quindecim petala.*

4. Adonis; sylvestris; flore phœniceo; ejusque foliis longioribus. *C. B. P.* 178. *Flos adonis vulgô*, aliis *eranthemum*. *J. B.* 3. L. 26. 125. a. 5. †.

ANEMONOIDES. *Hotton. Raj. meth.* 190.

Radix fibrosa, excepta quartâ, cui grumosa est, perennis, repens.

Folia dissecta, caulem instar coronæ ambientia, terna plerumque.

Caulis singularis, unus, floriger.

Flos nudus, polypetalos, vario petalorum numero, stamina numerosissima habens.

Ovarium fit capitulum rotundum, non papposum, ut ranunculo; semen ranunculi simile desinit in tubam longam erectam.

1. Anemonoides; flore albo. *Anemone, nemorosa, flore majore. C. B. P.* 176. *Anemone V. Dod. p.* 432. *Ranunculus nemorosus, flore majore. M. H.* 2. 437. *H. L. Ranunculus phragmites, albus, vernus. J.* 3. 412. *T.* 285. *Ranunculus nemorosus, albus. H. Eyst. Hyem. o. i. F.* 6. fig. 4. †. co.

2. Anemonoides; flore ex purpurâ rubente. *Anemone nemorosa, flore majore, ex purpurâ rubente. C. B. P. var.* 176. *Ranunculus phragmites, purpureus, vernus. J. B.* 3. 412. †. co.

3. Anemonoides; flore pleno, purpureo. *Anemone nemorosa, flore pleno, purpureo. C. B. P. var.* 177. *Ranunculus sylvarum, flore pleno, purpurascens. Clus. H.* 247. & *Anemone λευκάνθη, pleno flore. Id. Ib. Ranunculus nemorosus, flore pleno. H. Eyst. Vern. o. F.* 3. Fig. 1. †. co.

4. Anemonoides; flore majore, intensiore cæruleo. *Huic acerrima grumosa radix. co.*

5. Anemonoides; polyphyllos; flore herbaceo. *Anemone nemorosa affinis, peregrina secunda, flore herbacei coloris. C. B. P.* 177. *Ranunculus sylvarum, pleno albo flore. Et anemone, λευκάνθη, pleno albo flore. Clus. H.* 247. *Ranunculus nemorosus, flore herbacei coloris, folioso. H. L. Ranunculus nemorosus, flore pleno, foliis cincto. T.* 285. co.

6. Anemonoides; flore pleno, ex albo & viridi vario. co.

7. Anemonoides; trifolia; flore purpurascens. *Anemone trifolia. C. B. Phyt.* 317. *Dod. p.* 436. *M. H.* 2. 424. *J. B.* 3. 412. *Ranunculus nemorosus, trifolius. H. L. T.* 285. co.

8. Anemonoides; flore luteo unico. *Ranunculus nemorosus, luteus. C. B. P.* 178. *M. H.* 2. 437. *H. L. H. Eyst. Vern. o. i. F.* 3. Fig. 2. *Ranunculus phragmites, luteus, nemorosus. J. B.* 3. 413.

9. Anemonoides; flore luteo, bino, & terno. †. co.

10. Anemonoides; flore albo pleno. *Ranunculus sylvarum, flore albo & pleno. H. Eyst. Vern. o. i. F.* 2. Fig. 5. *Ranunculus nemorosus, flore albo pleno. M. H. Blef. Ranunculus nemorosus, flore majore, albo, pleno. H. L. co.*

11. Anc-

11. Anemonoides; flore pallidè viridescente. †. co.

12. Anemonoides; flore pallidè purpurascente. †. co.

Præter primam & secundam, has binas posteriores in sylva Haganâ mense Martio distinctas observavi.

6.

ANEMONE. T. 275. 147.

Radix tuberosa, nodosa; exceptâ Virginianâ, & tertiâ Matthioli, quibus fibrosa, perennis.

Folia ranunculi terna, simul caulem, instar coronæ, ambientia.

Caulis simplex, in fastigio unum florem gerens. Apex caulis tumet in placentulam, in ambitu basios hujus nascitur

Flos nudus, polypetalos; cum staminibus numerosissimis natis ex ambitu basios intra petala.

Ovarium placentæ pedunculi innatum est capitulum oblongum, cujus axi longo adhærent ova numerosa, emittentia vaginam apice globoso instructam, obvoluta calyptrâ lanuginosâ.

1. Anemone; sylvestris; alba; major. C. B. P. 176. M. H. 2. 425. *Anemone sylvestris, flore albo. H. Eyst. Vern. o. i. F. 13. Fig. 3. Anemone sylvestris, I. Clus. H. 244. Anemone alba, magna, plurimâ parte anni florens. J. B. 3. 411.*

2. Anemone; Virginiana; tertiâ Matthioli similis; flore parvo. H. L. App. 745. Par. Bat. 18. Ic. H.

3. Anemone; gerani rotundo folio; purpurascens. C. B. P. 173. M. H. 2. 425. *Anemone hortensis, latifolia, simplici flore, III. Clus. H. 249. Anemone Italica, latiusculis, spinosis, foliis, III. Clus. J. B. 3. 402. t.*

4. Anemone; folio œnanthes; flore violaceo, hexaphyllo. C. B. P. 174. M. H. 2. 425. *Anemone hortensis, tenuifolia, flore simplici, II. Clus. H. 255. Anemone tenuifolia, flore purpureo violaceo. H. Eyst. Vern. o. i. f. 17. Fig. 1. t.*

5. Anemone; tenuifolia; flore amplo, atrorubente. C. B. P. 175. T. 278. *Anemone tenuifolia, kermesina, XVII. Clus. H. 259. J. B. 3. 407. t.*

6. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis, & foliolis, coccineis. H. R. Par. *Anemone tenuifolia, flore multiplici, colore coccineo. H. Eyst. Vern. o. i. F. 18. Fig. 1. t.*

7. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis, & foliolis, acuminatis, rubris; oris albis. t.

E 3

8. An-

38 PLANTAE GYMNOPOLYSPERMAE.

8. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis, & foliolis, multifidis, ex albo & rubro elegantissimè variis; major. *t.*
9. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis, & foliolis, multifidis, ex albo & rubro elegantissimè variis; minor. *t.*
10. Anemone; tenuifolia; flore pleno, ex albo & rubro eleganter vario. *t.*
11. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis coccineis; foliolis ex rubro & obsoleto flavescente variis. *t.*
12. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis ex albo & rubro, foliolis ex rubro & flavescente variis. *t.*
13. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis ex viridescente flavo & rubro, foliolis ex viridi & rubescente variis. *t.*
14. Anemone; tenuifolia; flore pleno; ignis fulgore ardens, & innocenter flammea. *H. R. Par. t.*
15. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis & foliolis ex albo & rubro variis; apiculis flavescentibus. *t.*
16. Anemone; tenuifolia; flore pleno, violaceo; major. *H. R. Par. t.*
17. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis rubris ex pallido rubellis maculatis; foliolis rubroflavis. *t.*
18. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis & foliolis ex rubro, albo, flavescente, variegatis, numerosissimis. *t.*
19. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis coccineis & carneis; foliolis ex viridescente, flavo, & rubro variis. *t.*
20. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis coccineis & carneis; foliolis ex rubro & flavo deliquescente variis. *t.*
21. Anemone; tenuifolia; flore pleno, purpureo, Caccini. *Clus. Cur. post. in fol.* 28. *Anemone tenuifolia, multiplex, purpurea. C. B. P. 176. t.*
22. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis ex coccineo & carneo, foliolis fistulosis ex rubro & flavo variis. *t.*
23. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis & foliolis ex albo, flavo, rubro, variis. *t.*
24. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis & foliolis ex albo, flavo, rubro, per lituras tenuiores variis. *t.*
25. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis & foliolis ex carneo & roseo eleganter variis. *t.*
26. Anemone; tenuifolia; flore pleno; petalis angustis, multifidis, coccineis, coronâ foliaceâ succinctis. *t.*
27. Anemone; tenuifolia; flore plenissimo; petalis angustis, ex albo & rubro variis. *t.*
28. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis pallidè purpurascentibus; staminibus atropurpureis. *t.*
29. Anemone; tenuifolia; flore pleno; foliis & foliolis ex cinereo dilutè violaceis. *t.*
30. Anc-

30. Anemone; tenuifolia; flore simplici, villosa, ex albo & ker-
mesino variegato. 1.

7.

PULSATILLA. T. 284. 148.

Radix fibrosa, perennis.

*Folia dissecta, caulem instar coronae amplectentia, ut in
anemonoide & in anemone.*

*Caulis apicem expandit in placentulam, cujus infimum ba-
sios ambitum coronat*

*Flos nudus, hexapetalos; cum staminibus numerosissimis
intra petala ex imâ placentâ ortis.*

*Ovarium fit capitulum globosum, cui adnascuntur utriculi
villosi plurimi, instructi vaginâ longâ, villosâ, quasi esset
desinens in tenue, longum capillamentum, instar caudæ plu-
mosæ.*

1. Pulsatilla; folio crassiore; & majore flore. C. B. P. 177. Pulsatilla,
folio crassiore, flore majore, dilutior. M. H. 2. 428. Pulsatilla purpurea,
cærulea-ve. J. B. 3. 409. Pulsatilla. Dod. p. 433. Pulsatilla flore cæruleo.
H. Eyst. Hyem. o. i. F. 6. Fig. 2. 1. H.

2. Pulsatilla; flore minore, nigricante. C. B. P. 177. Pulsatilla, flo-
re minore, saturatiore, quasi nigricante, folio magis & tenuius inciso. M.
H. 2. 428. Pulsatilla, flore clauso, cæruleo. J. B. 3. 410. Lob. Ic. 283. 1. H.

8.

QUINQUEFOLIUM. T. 296. 153.

Radix fibrosa, perennis.

*Folia ternis plura summo pedunculo ad unum centrum ad-
nata.*

*Calix monophyllus, stabilis, quasi octophyllos, vel deca-
phyllos, instar stellæ expansus, cum staminibus numerosis-
simis ex ambitu basios ovarii.*

*Flos rosaceus, pentapetalos, rarius tetrapetalos, petalis
ex ambitu basios ovarii.*

*Ovarium est capitulum seminale, calice involutum, he-
misphaericum, & ova plura habet instructa tubâ erectâ longâ.*

1. Quinquefolium; rectum; luteum. C. B. P. 325. Quinquefolium
majus. H. Eyst. Æstiv. o. 10. F. 9. Fig. 2. Quinquefolium rectum, majus.
J. B. 2. 397. Quinquefolium alterum, vulgare. Dod. p. 116. Pentaphyl-
lum, seu potius heptaphyllum, majus, luteum, montanum, flore majore.
M. H. 2. 188.

2. Quin-

3. *Fragaria*; fructu parvi pruni magnitudine. *C. B. P.* 227. *M. H.* 2. 186. *Fraga*, fructu magno. *H. Eyst. Vern.* o. 7. *F. 8. Fig. 1.*
 4. *Fragaria*; fructu rotundo, suavissimo; flore duplici. *H. R. Par.* 72.
 5. *Fragaria*; Virginiana; fructu coccineo. *M. H.* 2. 186.
 6. *Fragaria*; crassis, rugosis, foliis; flore & semine carens.

II.

FRAGARIA STERILIS. *Raj. meth.* 68.*Habitus fragariæ.**Caules sine flagellis.**Calix, flos, & fructus pentaphylli.*

1. *Fragaria*; sterilis; Alpina; caulescens. *H. R. Par. Fragaria*, pentaphylli fructu. *M. H. R. Bles. Pentaphylloides*, fragariæ folio. *Bot. Monsp. app.* 309. *Fragaria*, sterilis, caulescens, foliis & crenis obtusioribus. *Horti Chelseani. Rand.*
 2. *Fragaria*; sterilis. *C. B. P.* 327. *Fragaria sterilis*, seu minimè vesca, hirsuta, minimè incana. *M. H.* 2. 186. *Fragaria*, non fragifera, vel non vesca. *J. B.* 2. 395. *Pentaphylloides*, foliis ternis, quinquefolii albi effigie. *Flor.* 2. 7.

Si fragarias steriles familiæ pentaphylloïdum inferendas velis, haud video, quid repugnem: nec obsto his, qui fragariis illas, ob formam, potius subjungunt, ut hîc factum.

12.

CARYOPHYLLATA. *T.* 294. 151.*Radix fibrosa, perennis.**Folia nervosa, veluti pinnata, agrimonöidea.**Calix monophyllus, decaphylloides, stabilis.**Flos pentapetalos, nunc calathi, jam rosæ, effigie; cum staminibus multis, ex uno ambitu basios ovarii.**Fructus fere globosus semina habet multa, longa, apposita, instructa tubâ, quæ longâ plumulâ ornatur.*

1. *Caryophyllata*; vulgaris; *C. B. P.* 321. *M. H.* 2. 430. *Lob. Ic.* 693. *Caryophyllata. Dod. p.* 137. *Caryophyllata*, vulgaris, flore parvo, luteo. *J. B.* 2. 398. *Herba benedicta. Brunsf.* 4. *Sanamunda vulgô.* †
 2. *Caryophyllata*; Alpina; lutea. *C. B. P.* 322. *Caryophyllata*, Alpina, lutea, major. *M. H.* 2. 430. *Caryophyllata*, montana, flore luteo, magno. *J. B.* 2. 398. *Caryophyllata*, montana. *Dod. p.* 137. *Caryophyllata*, montana, II, & *Caryophyllata*, Alpina, aureo flore. *Clus. H. c. 11.*
 3. Ca-

3. Caryophyllata; Alpina; flore croceo.
 4. Caryophyllata; aquatica; flore nutante. C. B. P. 321. *Caryophyllata, montana*, I, & *Caryophyllata, Alpina*, nutante flore. Clus. H. CIII. *Caryophyllata, aquatica*, nutante flore, purpureo, calathi effigie. M. H. 2. 431. *Caryophyllata, aquatica*, flore rubro, striato. J. B. 2. 398.
 5. Caryophyllata; Virginiana; albo flore, minore; radice inodorâ. H. L.
 6. Caryophyllata; montana; flore luteo, nutante. C. H. R. Par. 39. *Caryophyllata, montana*. HEyst. Vern. o. 1. F. 5. Fig. 2.
 7. Caryophyllata; montana; flore rubro, nutante, prolifero.
 8. Caryophyllata; Alpina; chamædryos folio. M. H. 2. 432. *Chamædryos Alpina*, cisti flore. C. B. P. 248. *Chamædryos Alpina*, flore fragariæ albo. J. B. 3. 290. *Chamædryos III*, seu montana. Clus. H. 351.

13.

FILIPENDULA. T. 293. 150.

Radix fibrosa, cum bulbis appensis glandulosis, perennis.
Folia tenuiter secta instar millefolii.

Calix monophyllos, denticulatus, in septem segmenta vel sex retroflexa divisus.

Flores hexapetali, vel heptapetali, paniculatim sparsi, in caulibus longis, fere nudis; stamina numerosa ex orâ reflexâ calicis.

Fructus fere rotundus, semina plura aggesta habens suis instructa tubis.

1. Filipendula; vulgaris; an molon Plinii? C. B. P. 163. *Filipendula*. J. B. 3. 27. 189. Dod. p. 56. *Filipendula, vulgaris*. HEyst. Æst. o. 13. F. 3. Fig. 2. †.

2. Filipendula; omni parte major; folio angustiori. an *Filipendula minor*. C. B. P. 163. Prodr. 85?, Vix videtur congruere descriptioni.

14.

THALICTRUM. T. 270. 143. M. U. 60. 61. 91.

Radix fibrosa, exceptâ ultimâ.

Folia lobata, tripartita, umbelliferarum æmula.

Flos nudus, tetrapetalos, vel pentapetalos, rosaceus, petalis fugacibus, valde staminosus, ex ambitu basios ovarii stis in umbelliferæ formam.

F 2

Ova-

Ovarium constat ex multis parvis vasculis, vel alatis, vel non alatis, tubâ longâ instructis, continentibus semina singularia ut plurimum oblonga.

1. Tetrapetala. α. folliculo triangulari, alato.

1. *Thalictrum*; Canadense. *Corn.* 186. *Majus, caulibus purpurascen-
tibus. Flor.* 2. 9. *Thalictrum*, Canadense, caule purpurascen-
te, *aquilegæ* foliis, *florum staminibus albis. T.* 271.

2. *Thalictrum*; Canadense; majus; caulibus viridantibus. *Flor.* 2. 9.

3. *Thalictrum*; Canadense; caule viridescen- & purpurascen-
te; *staminibus saturatius purpurascen-
tibus.*

4. *Thalictrum*; majus; *florum staminibus purpurascen-
tibus. C. B. P.* 337. *Thalictrum*, majus, folliculis angulosis, caule levi. *J. B.* 3.
487. *Thalictrum*, magnum, *IV Dod. p.* 58. *Thalictrum*, *Alpinum*, fo-
liis *aquilegæ*, *florum staminibus purpurascen-
tibus. T.* 270. *Thalictrum*,
flore incarnato. HEyst. Vern. o. 1. F. 11. *Fig.* 1.

5. *Thalictrum*; foliis amplissimis, rugosis; *florum staminibus
albis.*

β. Semine striato, minore.

6. *Thalictrum*; majus; *filiquâ angulosâ, aut striatâ. C. B. P.* 336.
Thalictrum, *flore albo. HEyst. Vern. o. 1. F.* 11. *Fig.* 2. *Thalictrum*, ni-
grius, caule & semine striato. *J. B.* 3. 486. *Thalictrum*, magnum. *Dod.*
p. 58. *Pseudorhabarbarum quibusdam.*

7. *Thalictrum*; montanum; album; altius. *C. B. P.* 337. *Thali-
trum*, montanum, *I Clus. H.* 234. *Thalictrum*, *Alpinum*, majus, *aqui-
legæ* foliis, *florum staminibus albis, caule viridi. T.* 270.

8. *Thalictrum*; majus; flavum; *staminibus luteis, vel glauco folio.
C. B. P.* 336. *Thalictrum*, *speciosissimum, glaucum, semine & caule stria-
to. J. B.* 3. 486. *Thalictrum*, magnum, *tertium. Dod. p.* 51. & *Thali-
trum flore luteo, caule anguloso, folio minore. Ind.* 7. *Differentia quippe
primò notari visa evanuit deinde.*

9. *Thalictrum*; praten- & angustifolium. *C. B. P.* 337. *J. B.* 3. 487
Ruta, praten- & angustifolia. Tab. Germ. 121. *It. & descr. †.*

10. *Thalictrum*; praten- & angustissimo folio. *C. B. P.* 337. *Tha-
lictrum, angustissimo folio. C. B. Prodr.* 146.

11. *Thalictrum*; minus. *C. B. P.* 337. *Dod. p.* 58. *Thalictrum, mi-
nus, sive ruta praten- & minus, semine striato. J. B.* 3. 487.

12. *Thalictrum*; minimum; foetidissimum. *C. B. P.* 337. *Prodr.*
147. J. B. 3. 488.

13. *Thalictrum*; minimum; montanum; atrorubens; foliis splen-
dentibus. *Raj. Syn.* 100. *Flosculo tetrapetalo, tenuissimo, purpurascen-
to.*



THALICTRUM; *minimum*; *montanum*; *atrorubens*; *foliis splendentibus*. *Raj.*
Syn. 100.

A. radix fibrosa.

B. nativa magnitudo folii.

C. planta tota, ut solet crescere.

2. Flore pentapetalo, rosaceo. α . radice fibrosâ.

14. *Thalictrum*; *Canadense*; minus. *S. B. Par.* 152. *Thalictrum*, *Americanum*, minus. *Park. Th.* 265. t.

β . Radice grumosâ.

15. *Thalictrum*; minus; grumosâ radice; floribus majoribus. *Flor.* 2. 9. *Thalictrum*, minus, *asphodeli radice*, magno flore. *T.* 271. *Ranunculus*, *thalictri folio*, *asphodeli radice*. *M. H.* 2. 438. *H. L.* *Oenanthe Myconi*. *Lugd.* 785. *J. B.* 3. 2. 192. *Oenanthe*, *foliis hederæ*. *C. B. P.* 163. t.

15.

PLANTAGO AQUATICA. *C. B. P.* 190. *Raj. meth.* 67.

Radix valde fibrosa, in bulbum coëuns.

Folia plantaginea.

Caulis erectus, fere umbelliferus.

Finis pedunculi explicatur in calicem monophyllum, trifidum, instar stellæ expansum primò, dein retroractum.

Flos tripetalos, rosaceus, petalis ex margine reflexi calicis, stamina sex, ex ortu cujusque petali bina.

Ovarium fit fructus trigonus ex aggestis seminibus in majoribus, in minore in globum echinatum, instructis suâ tubâ.

1. *Plantago*; *aquatica*; *latifolia*. *C. B. P.* 190. *Plantago*, *aquatica*. *J. B.* 3. 787. *Ranunculus*, *palustris*, *plantaginis folio ampliore*. *T.* 292. *Plantago*, *palustris*, *sive aquatica*. *Tab. Ic.* 734. *Plantago aquatica*, *major*. *Ger.* 417. *Park.* 1245. *M. H.* 3. 618. \dagger . *aq.*

2. *Plantago*; *aquatica*; *angustifolia*. *C. B. P.* 190. *Plantago*, *aquatica*, *minor*. *Park.* 1245. *M. H.* 3. 618. *Tab. Ic.* 734. *Ranunculus*, *palustris*, *plantaginis folio angustiori*. *T.* 292. \dagger . *aq.*

3. *Plantago*; *aquatica*; *minima*. *Clus. H. cx.* *Plantaginella*, *palustris*. *C. B. P.* 190. *M. H.* 3. 605. *Ranunculus*, *palustris*, *minimus*, *folio plantaginis*. *H. L.* *Ranunculus*, *aquaticus*, *plantaginis folio angustissimo*. *T.* 292. \dagger . *aq.*

17.

SAGITTA. *C. B. P.* 194.

Radix fibrosa, crassa, fungosa, repens.

Folia primò plantaginis, postea sagittæ cuspidem alatham referentia.

Caulis ut in umbelliferis.

F 3

Flos

2. Flore pentapetalo, rosaceo: α . radice fibrosâ.

14. Thalictrum; Canadense; minus. S. B. Par. 152. Thalictrum, Americanum, minus. Park. Th. 265. t.

β . Radice grumosa.

15. Thalictrum; minus; grumosa radice; floribus magnis. Fior.

2. 9. Thalictrum, minus, asphodeli radice, magno flore. T. 271. Ranunculus, thalictri folio, asphodeli radice. M. H. 2. 438. H. L. Oenanthe Myconi. Lugd. 785. J. B. 3. 2. 192. Oenanthe, foliis bederae. C. B. P. 163. t.

15.

PLANTAGO AQUATICA. C. B. P. 190. Raj. meth. 67.

Radix valde fibrosa, in bulbum coeunt.

Folia plantaginea.

Caulis erectus, fere umbelliferus.

Finis pedunculi explicatur in calicem monopetalum, trifidum, instar stellæ expansum primò, deinde retrusum.

Flos tripetalos, rosaceus, petalis ex margine reflexis calicis, stamina sex, ex ortu cujusque petali bina.

Ovarium sit fructus trigonus ex aggregatis seminibus in majoribus, in minore in globum echinatum, infractis sed tabâ.

1. Plantago; aquatica; latifolia. C. B. P. 190. Plantago, aquatica. J. B. 3. 787. Ranunculus, palustris, plantaginis folio ampliore. T. 292. Plantago, palustris, sive aquatica. Tab. Ic. 734. Plantago aquatica, major. Ger. 417. Park. 1245. M. H. 3. 618. t. 29.

2. Plantago; aquatica; angustifolia. C. B. P. 190. Plantago, aquatica, minor. Park. 1245. M. H. 3. 618. Tab. Ic. 734. Ranunculus, palustris, plantaginis folio angustiori. T. 292. t. 29.

3. Plantago; aquatica; minima. Clus. H. ex. Plantaginella, palustris. C. B. P. 190. M. H. 3. 605. Ranunculus, palustris, minimus, folio plantaginis. H. L. Ranunculus, aquaticus, plantaginis folio angustissimo. T. 292. t. 29.

17.

SAGITTA. C. B. P. 194.

Radix fibrosa, crassa, fungosa, repens.

Folia primò plantaginis, postea sagittæ cuspidem alatam referentia.

Caulis ut in umbelliferis.

Flos tripetalos, ut plantaginis aquaticæ.

Fructus instar fragi ex adunatis seminibus.

1. Sagitta; aquatica; major. C. B. 194. Sagitta, major. J. B. 3. 790. Tab. Ic. 743. Ranunculus, palustris, folio sagittato, maximo. T. 292. Sagittaria Europæa major. M. H. 3. 618. †. aq.
2. Sagitta; aquatica; minor; latifolia. C. B. P. 194. Sagitta. J. B. 3. 789. Sagitta, minor. Tab. Ic. 743. Sagittaria Europæa, minor, latifolia. M. H. 3. 618. Ranunculus, palustris, folio sagittato, minori. T. 292. †. aq.
3. Sagitta; aquatica; minor; angustifolia. C. B. P. 194. Sagitta, minor, angustifolia. J. B. 3. 789. Tab. Ic. 744. Sagittaria Europæa, minor. M. H. 3. 618. Ranunculus, palustris, folio sagittato, angustiori. T. 292. †. aq.
4. Sagitta; aquatica; major; folio angustiore. †. aq.

+

17.

CLEMATITIS. T. 293. 150.

Radix fibrosa, perennis.

Folia conjugata.

Flos nudus tetrapetalos, vel pentapetalos rarius, fere crucis formâ dispositus; stamina multa, villosa, densè congesta, ex imâ orâ basios ovarii.

Apex pedunculi abit in placentam, cui undique adnascuntur ova multa, instructa tubâ longâ plumatâ.

1. Clematitis; sive flammula surrecta; alba. J. B. 2. 127. M. H. 3. 616. Flammula, recta. C. B. P. 300. HEyst. Æst. o. 13. F. 10. Fig. 1. Flammula, altera. Dod. p. 405. subm.
2. Clematitis; sylvestris; latifolia. C. B. P. 300. Clematitis, sive viorna vulgi Lobelii. HEyst. Æst. o. 6. F. 5. Fig. 3. Clematitis, latifolia, dentata. J. B. 2. 125. Vitalba. Dod. p. 404. Viorna vulgò. Flor. 2. 12. subm.
3. Clematitis; peregrina; foliis pyri incis. C. B. P. 300. Clematis, altera, Bætica. Clus. H. 123. Clematis Bætica Clusii. J. B. 2. 126. t. H. subm.
4. Clematitis; Canadensis; trifolia; dentata; flore albo. H. R. Par. t. H. subm.
5. Clematitis; cærulea; erecta. C. B. P. 300. M. H. 3. 616. Clematis, cærulea, Pannonica, I. Clus. HEyst. Æst. o. 13. F. 7. Fig. 1. Clematis, Pannonica, flore cæruleo, surrecta. J. B. 2. 129. Clematis, cærulea, Pannonica. Clus. H. 123. subm.
6. Clematitis; cærulea, vel purpurea; repens. C. B. P. 300. Clematis, peregrina, purpurea, simplici flore HEyst. Æst. o. 13. F. 7. Fig. 3. Cl-

3. *Clematis*, sive *flammula*, flore purpureo, scandens. *J. B. 2. 128. Clematis*, altera. *Dod. p. 406. Clus. H. 122. subm.*

7. *Clematitis*; repens; rubra. *An Clematis*, peregrina, incarnata, simplici flore? *HEyst. Æst. o. 13. F. 7. Fig. 2. subm.*

8. *Clematitis*; orientalis; folio apii; flore ex viridi flavescente, posterius reflexo. *T. Cor. 20. t. subm. Clematitis Virginiana*, præcedenti similis. ex *H. A. Ind. 8. quum languens brevi dein defecerit ab edito Indice*, nec satis consideratè cognita fuerit, forte fuit eadem.

9. *Clematitis*, cærulea; flore pleno. *C. B. P. 301. Clematis*, peregrina, purpureocærulea, plena. *HEyst. Æst. o. 13. F. 10. Fig. 2. Clematis*, purpurea, flore pleno, scandens. *J. B. 2. 129. Clematis*, altera, flore pleno. *Clus. Cur. post. in fol. 7. subm.*

10. *Clematitis*; Alpina; geranifolia. *C. B. P. 300. Prodr. 135. M. H. 3. 616. Clematis*, cærulea, serrato folio. *J. B. 2. 129. Clematis cruciata*, Alpina. *Pon. Bald. Ital. 175. & Latine apud Clus. H. cccxxxv. Plukn. Phyt. 84. 7. H. subm.*

11. *Clematitis*; Hispanica; surrecta; altera; & humilior; flore albicante. *H. R. Par. H. subm.*

12. *Clematitis*; crecta; folio fraxini. *Facies haud multum diversa a Clematide*, quum tamen veteris horti incolæ nec florem hætenus viderim, neque spectaverim fructum, anceps sum, an *Bignoniis associanda*, an bis inferenda sit.

GENS PLANTARUM,

quæ vocantur

GYMNODISPERMÆ UMBELLIFERÆ.

Apex pedunculi florigeri sustinet ovarium; pericarpio nudum; constans binis ovis, arctissimè contiguâ superficie concretis, dum immatura crescunt, dissilientibus ubi maturuerit, tumque adhuc cohærentibus apiculis supremis pedunculi ex centro apicis pedunculi ovarii orti, & latentis intra ova; ovarii cacumen coronatur placentâ fungosâ, balsamiferâ, crassulâ, bifidâ ut ovarium; quælibet placentæ hujus pars emittit unam tubam erectam, apiculo rotundulo instructam; ova parte contiguâ plana & glabra, sulcata verò aversâ parte spectantur & gibba ut plurimum.

Flos quinquepetalos, rosaceus; petala nascuntur ex commisurâ placentæ & ovarii, absque calice, expansa plerunque, quandoque & introrsum complicata, citò caduca; est plerunque hermarphroditus, raro masculinus cum hermaphrodito in

ea-

48 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

dem umbella; stamina habet quinque, orta inter petala, ex eadem commissurâ.

Fastigia caulium Gramorum exeunt in pedunculos eodem ortu multos, coronâ foliaceâ frequenter succinctos, horum quilibet iterum in alios similiter positos, qui ovaria floresque gerunt umbellatim disposita fere in omnibus.

Si tamen ovarium & flos legem dictam sequuntur, umbellæ verò forma abest, huic interim genti accensebuntur & ille stirpes.

Gens hæc in binas dividitur lineas: sunt enim vel compositis foliis, vel simplicibus.

1. Foliis compositis.

Hujus lineæ ordo primus foliis tenuissimè divisis, ut vix lobi appareant, & seminibus minoribus parum modò striatis.

FOENICULUM. T. 311. 164.

Radix fibrosa.

Folia capillacea.

Petala florum integra.

Semina oblonga, crassiuscula, gibba, striata. Malp. An. Pl. 50. 192.

1. Fœniculum; vulgare; Germanicum. C. B. P. 147. M. U. 3. M. H. 3. 270. Fœniculum. Dod. p. 297. Μαράθρον Dioscoridi. Lob. adv. 347.

2. Fœniculum; vulgare; Italicum; semine oblongo; gustu acuto. C. B. P. 147. M. H. 3. 270. Fœniculum, vulgare, minus, acriori & nigriori semine. J. B. 3. 2. 2. a.

3. Fœniculum; foliis atrovirentibus. H. Edinb. 122. Fœniculum, foliis nigricantibus. C. B. P. 147. Var.

4. Fœniculum; dulce. C. B. P. 147. M. U. 3. M. H. 3. 270. Fœniculum, majori & albiore semine. J. B. 3. 2. 4.

5. Fœniculum; sylvestre. C. B. P. 147. Fœniculum, sponte virens in agris Narbonensium. Lob. Adv. 347.

6. Fœniculum; sylvestre; glauco folio. T. 311. Daucus glauco folio, similis fœniculo tortuoso. J. B. 3. 2. 16. b.

7. Fœniculum; marinum; altissimum; angustifolium. H. C. 1. H.

8. Fœniculum; tortuosum. J. B. 3. 2. 16. Saxifraga montana, minor, fœniculum tortuosum dicta. M. H. 3. 273. Sefeli Massiliense, fœniculi folio, quod Dioscoridis censetur. C. B. P. 161. Sefeli Massiliense Dioscoridis. Clus. H. cxciii. Sefeli Massiliense, folio fœniculi crassiore. Lob. adv. 352. 1. H. Cu-

GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE. 49

CUMINUM. Raj. meth. 50.

Radix annua.

Folia fœniculi.

Semina longiora fœniculaceis, odore singulari prædita.

Parvitas plantæ.

1. Cuminum. M. U. 4. M. H. 3. 271. Lob. adv. 330. obs. 428. Cuminum, sive Cuminum sativum. C. B. P. 146. J. B. 3. 2. 22. Fœniculum Orientale, Cuminum dictum. T. 312. a.

AMMOIDES. C. B. P. 159.

Radix annua.

Folia fœniculi, paulò minus capillacea.

Flosculi & semina valde exigua. Cætera fœniculi.

1. Ammoides; majus; odore origani. Ammi perpusillum. Lob. Ic. 725. Ammi parvum, foliis fœniculi. C. B. P. 159. M. H. 3. 295. Ammi semine tenuissimo & odoratissimo. J. B. 3. 2. 25. Ammi verum. Gesn. Hort. Fœniculum annuum, origani odore. T. 312. a.

2. Ammoides. C. B. P. 159. Ammi pusillum. Cæsalp. 286. M. H. 3. 295. Fœniculum Lusitanicum, minimum, acre. T. 312. Saxifraga parva, annua, acris, millesolii terrestris folio tenuissimo. M. H. 3. 273. a.

MEUM. Raj. meth. 50.

Radix perennis.

Folia capillacea, fœniculaceis longè tenuiora.

Semina longa, fœniculaceis majora, latiora.

1. Meum. Dod. p. 305. Meum, foliis anethi. C. B. P. 148. Meum vulgare, sive radix ursina. J. B. 3. 2. 11. Meum Athamanticum. M. U. 4. Meum vulgare, tenuifolium. Clus. H. cxcviii. M. H. 3. 270. Fœniculum, Alpinum, perenne, capillaceo folio, odore medicato. T. 312.

VISNAGA. Raj. meth. 52.

Radix fibrosa, annua.

Folia fœniculaceis latiora, breviora, obtusiora.

Umbella contracta fere & clausa.

Semina minutiora longè fœniculaceis.

1. Visnaga. J. B. 3. 2. 31. Gingidium, umbellâ longâ. C. B. P. 151. M. H.

50 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

M. H. 3. 275. *Gingidium alterum*. Dod. p. 702. *Visnaga*, seu *gingidium*.
M. U. 6. a.

SESELI.

Radix perennis, in ultimâ biennis.
Folia latiora, breviora, fœniculaceis.
Semina fœniculaceis longiora.

- 1. Sefeli; perenne; folio glauco breviori. Vaill. *Fœniculum sylvestre*, perenne, ferulæ folio breviori. T. 311. *Meum latifolium*, adulterinum. C. B. P. 148. *Meum spurium*. M. U. 5. *Meum alterum*, *Italicum* quibusdam. J. B. 3. 2. 15. *Saxifraga montana*, minor, *Italica*, foliis in breviores partes divisis. M. H. 3. 272.
- 2. Sefeli; perenne; folio glauco longiori. Vaill. *Fœniculum sylvestre*, elatius, ferulæ folio longiori. T. 311. *Saxifraga Matthioli*, tenuifolia, & umbellifera. J. B. 3. 2. 18. *Saxifraga montana*, minor, *Italica*, vel *Gallica*, longiori folio. M. H. 3. 272.
- 3. Sefeli; quæ ferulæ facie, *Thapsia*, sive *Turbith Gallorum*. J. B. 3. 2. 45. *Thapsia*, fœniculi folio. C. B. P. 148. *Thapsia secunda*, vel *tenuifolia*. Clus. H. cxcii. 1.
- 4. Sefeli; quæ saxifraga *Pannonica* Clusii H. cxcvi. *Saxifraga montana*, minor, multifido folio, *Pannonica*. M. H. 3. 273. *Daucus montanus*, multifido brevique folio. C. B. P. 150. *Daucus montanus*, multifido longoque folio. M. U. 6. b.

BULBOCASTANUM. T. 307. 161.

Radix perennis, carnosâ, tuberosa, pelle coriaceâ tectâ.
Folia fœniculaceis latiora, petroselinî similiora.
Semina exigua, oblonga, sulcata, & gibba.

- 1. Bulbocastanum; majus; folio apii. C. B. P. 162. M. H. 3. 274. *Bulbocastanum*. J. B. 3. 2. 30. Dod. p. 334. M. U. 5. *Pancascolus*. Cæsalp. 293. †.
 - 2. Bulbocastanum; minus; saxatile; peucedani folio. T. 307. *Camminum bulbosum*. Col. 2. 20.
 - 3. Bulbocastanum; minus. C. B. P. 162? M. H. 3. 274.
- Linæ primæ ordo fecundus, foliis lobatis, majoribus plerunque, semine striato longo.

OENANTHE. T. 312. 166.

Radix longis, magnis, carnosis, fuso similibus tuberibus constans.
Floris petala, inæqualia, cordis figurâ.

Ova-

GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE. 51

Ovarii apex placentâ coronatur emittente tubas longas; succingitur orâ supremâ ovarii expansâ instar calicis in quinque pinnulas floris petala ut perianthium sustinentes; pinnulae hæ semini maturo aculeorum formâ adherent, ut & tubæ ipsæ sic durescunt.

1. Oenanthe; chærophylli foliis. C. B. P. 162. Oenanthe, apii folio, maxima, succo viroso, cicutæ facie. M. U. 16. 19. Oenanthe, succo viroso, cicutæ facie Lobelio. J. B. 3. 2. 193. M. H. 3. 288. Oenanthe, cicutæ facie, succo viroso, croceo. Lob. Ic. 730.

2. Oenanthe; maxima; folio apii; caulibus atropurpureis; flore albo. Oenanthe maxima, foliis paludapii. Bobart. An Oenanthe maritima, apii nigriori & crassiori folio. H. R. Monsp.?

3. Oenanthe; apii folio; caule firmiore. M. U. 16. M. H. 3. 288. Oenanthe, apii folio. C. B. P. 162. Oenanthe, sive filipendula Monspessulana, folio apii. J. B. 3. 2. 190.

4. Oenanthe; staphylini foliis aliquatenus accedens. J. B. 3. 2. 191. Oenanthe aquatica, pimpinellæ saxifragiæ divisurâ. Plukn. Phyt. 49. 4. M. H. 3. 289. Oenanthe, pastinacæ sylvestris folio, semine atriplicis. C. B. P. 162.

5. Oenanthe; Cretica. Pon. Mont. Bald. Ital. 213. Oenanthe prolifera, Apula. C. B. P. 163. M. H. 3. 289.

6. Oenanthe; aquatica. C. B. P. 162. Oenanthe, sive filipendula aquatica. J. B. 3. 2. 191. Oenanthe aquatica, angustifolia, erecta, vulgaris. M. H. 3. 289. †

7. Oenanthe; aquatica; minor. Ind. 9. †.

8. Oenanthe; Lusitanica; semine crassiore, globoso. T. 313. b. H.

9. Oenanthe; quod bulbocastanum; folio leviter inciso; Lusitanicum.

10. Oenanthe; folio apii rotundiori.

SILAUM. J. B. 3. 2. 170.

Folia tenuiora, breviora, fœniculaceis accedentia, sed latiora.

Semina longa, sulcata, foliaceis quasi limbis instructa.

1. Silaum quibusdam; flore luteolo. J. B. 3. 2. 170. Seseli pratense. M. U. 17. Seseli pratense, Monspeliensium. M. H. 3. 287. Seseli pratense, silaus forte Plinio. C. B. P. 162. Siler alterum pratense. Dod. p. 310. Angelica pratensis, apii folio. T. 313.

2. Silaum; quod Ligusticum; ferulæ folio. T. 324. An & Ligusticum Pyrenaicum, amplissimo tenuique folio. T. 323? †.

3. Silaum; quod Ligusticum Creticum; folio fœniculi; caule nodoso. T. C. 23. †.

G 2

4. Si-

52 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

4. Silaum; quæ angelica; pratenfis; altera; apii folio. T. 313. *Angelica peregrina*. Hofmann. An *sefeli montanum*, *cicutæ folio*, *subhirsutum*. C. B. P. 161. Prodr. 85. descr?

5. Silaum; quod Ligusticum; *cicutæ folio*; glabrum. T. 323. *Seseli montanum*, *cicutæ folio*, glabrum. C. B. P. 161. M. H. 3. 286. *Seseli Alpinum*, sive *montanum*, I Clusio, folio *splendente*, *flosculis albis*. J. B. 3. 2. 168. *Seseli I montanum*, *Pannonicum*. Clus. H. CXCI. t.

SILER. M. U. 8.

Folia lobata majora, segmentis integris, longis, obtusis, sine tripartito.

Semina oblonga, magna, striata.

1. Siler; foliis *aquilegiæ*. M. U. 7. 8. *Siler montanum*, foliis *aquilegiæ*. M. H. 3. 276. *Ligusticum Rawolfii*, foliis *aquilegiæ*. J. B. 3. 2. 148. *Libanotis latifolia*, *aquilegiæ foliis*. C. B. P. 157. Prodr. 83. descr. *Angelica montana*, *perennis*, *aquilegiæ folio*. T. 313. t.

2. Siler; *montanum*; majus. M. U. 7. 8. *Siler montanum*. Dod. p. 310. Clus. H. cxcv. M. H. 3. 276. *Ligusticum*, quod *sefeli officinarum*. C. B. P. 162. T. 323. t.

3. Siler; *montanum*; minus. M. U. 7. *Siler montanum*, *angustifolium*. Park. M. H. 3. 276. *Ligusticum*, sive *Siler montanum*, *angustifolium*. C. B. P. 162. Prodr. 85. T. 323. t.

LIGUSTICUM. T. 323. 171.

Folia lobata, margine inciso, apii foliis accedentia.

Semina ut sileri.

1. *Ligusticum*; *Scoticum*; apii folio. T. 324. *Ligusticum humilius*, *Scoticum a maritimis*, seu *apium maritimum*, dulce, *Scoticum*. Plukn. Phyt. 96. 2. *Seseli maritimum*, *Scoticum*. Par. Bat. *Imperatorie affinis*, *umbellifera*, *maritima*, *Scotica*. H. Edinb. App. *Seseli maritimum*, *humile*, *Scoticum*, foliis *Imperatorie*. Flor. 2. 15. *Siler montanum*, *hipposelini foliis*, *humilius*. M. H. 3. 276.

2. *Ligusticum*; *Græcum*; folio apii. T. C. 23. H.

3. *Ligusticum*; *vulgare*; foliis apii. J. B. 3. 2. 122. *Ligusticum*. M. U. 7. *Ligusticum vulgare*; an *Libanotis fertilis Theophrasti*? C. B. P. 157. *Levisticum*. M. H. 3. 275. *Levisticum vulgare*. Dod. p. 311. *Angelica montana*, *perennis*, *paludapii folio*. T. 313.

ANGELICA. T. 313. 167.

Folia alata, divisa in amplas partes, ramosa fere.
Semina striata, magna, crassa.

1. Angelica; Scandiacæ; umbellâ flavâ; femine rotundiori; Archangelica dicta. C. B. P. 155. Var. M. U. 9. Archangelica. J. B. 3. 2. 143. Clus. H. cxcv. Dod. p. 318. Imperatoria Archangelica dicta. T. 317. b.

2. Angelica; sativa. C. B. P. 155. J. B. 3. 2. 140. M. U. 9. M. H. 3. 280. Angelica major. Dod. p. 318. Imperatoria sativa. T. 317. b.

3. Angelica; sylvestris; major. C. B. P. 155. M. H. 3. 280. Angelica aquatica. C. B. P. 156. Angelica sylvestris M. U. 9. Dod. p. 318. Angelica sylvestris, magna, & vulgatiôr. J. B. 3. 2. 144. Imperatoria, pratensis, major. T. 317. b.

4. Angelica; sylvestris; minor; five erratica. C. B. P. 155. T. 313. Angelica sylvestris, repens. J. B. 3. 2. 145. M. H. 3. 281. Angelica podagraria dicta, M. U. 9. Podagraria. Lob. Ic. 700. Herba Gerardi. Dod. p. 320. †.

5. Angelica; Acadienfis; flore luteo. H. R. Par. 55. Angelica humilior & minor, flore luteo. M. H. 3. 281. t.

6. Angelica; Alpina; ad nodos florida. T. 313. An Ligusticum quorundam, foliis aquilegiæ. J. B. 3. 2. 147? t.

7. Angelica; Canadensis; atropurpurea. Corn. 199. M. H. 3. 281. H.

8. Angelica; lucida; Canadensis. Corn. 197. M. H. 3. 281. M. U.

9. Imperatoria lucida, Canadensis. T. 317. b. t.

9. Angelica; montana; maxima; flosculis candicantibus; ad nodos caulium umbellifera. Plukn. Alm. Phyt. 134. 1. M. H. 3. 281. t.

10. Angelica; sylvestris; Italica; amplis foliis. t.

11. Angelica; sylvestris; Italica; altera; minor. t. Binæ posteriores necdum ad frugem progressæ videntur diversæ.

IMPERATORIA. T. 316. 168.

Folia tripartitò divisa & subdivisa, minus ramosa.
Semina plana, ovata, leviter striata, marginata.

1. Imperatoria; major. C. B. P. 156. Imperatoria. J. B. 3. 2. 137. M. U. 77. M. H. 3. 278. Astrantia. Dod. p. 320. Clus. H. cxciii.

2. Imperatoria; Alpina; maxima. T. 317. Imperatoria Alpina, maxima, latissimo folio. Sch. Bot. Par. M. H. 3. 278.

3. Imperatoria; quod laserpitium prosperi Alpini. Exot. 211. An potius smyrnio inferas? b. t.

54 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

SMYRNIUM. T. 315. 168.

Folia magna, varia, quandoque perfoliata.

Semina crassa, hemisphaerica, lunata, gibbosa, canaliculata, nigra.

1. Smyrnum. Matth. 773. Hippofelinum Theophrasti, vel Smyrnum Dioscoridis. C. B. P. 154. Macerone quibusdam; Smyrnum, semine magno, nigro. J. B. 3. 2. 126. Smyrnum, majus. M. U. 11. M. H. 3. 277. Olus atrum. Cord. in Diosc.

2. Smyrnum; peregrinum; rotundo folio. C. B. P. 154. Smyrnum, Creticum, perfoliatum. J. B. 3. 2. 125. Smyrnum, Creticum. M. U. 12. M. H. 3. 277. Smyrnum Amani montis. Dod. p. 698. a. b.

3. Smyrnum; peregrinum; folio oblongo. C. B. P. 154. Prodr. 82. descr. a. b.

SISARUM. T. 309. 163.

Radix napiformis, plurimis ab uno capite pendentibus, perennis.

Folia pinnata, costae adnata, uno impari extremo.

Semina angusta, striata.

1. Sisarum Germanorum. C. B. P. 155. Sisarum multis. J. B. 3. 2. 153. Dod. p. 681. M. U. 12. M. H. 3. 283. Elaphoboscon Dioscoridis. Col. Phytob. 88. 89.

TRAGOSELINUM. T. 309. 163.

Radix cauliformis, acris, in multis.

Folia pinnata pimpinellae sanguisorbæ.

Floris petala bifida, inaequalia, in multis.

Semina oblonga, gibba, striata.

1. Tragofelinum; majus, umbellâ candidâ. T. 309. Pimpinella, saxifraga, major, umbellâ candidâ. C. B. P. 159. M. U. 12. M. H. 3. 284. Saxifraga, hircina, major. J. B. 3. 2. 109. Saxifraga, magna. Dod. p. 315.

2. Tragofelinum; majus; umbellâ rubente. T. 309. Pimpinella, saxifraga, major, umbellâ rubente. C. B. P. 159.

3. Tragofelinum; alterum; majus. T. 309. Tragofelinum, minus. Tabern. Germ. 253. Saxifraga, minor, foliis sanguisorbæ. H. L. 537. Pimpinella, saxifraga, major, altera. C. B. P. 159. Saxifraga, hircina, minor, foliis sanguisorbæ. J. B. 3. 2. 111. Pimpinella, saxifraga, mi-

minor. M. U. 12. Pimpinella, saxifraga, vulgaris, pimpinellæ minoris folio. M. H. 3. 285.

4. *Tragofelinum; minus. T. 309. Pimpinella, saxifraga, minor. C. B. P. 160. M. U. 1c. T. 5. Pimpinella, saxifraga, minor, foliis dissectis. M. H. 3. 285. Saxifraga, hircina, minima, pimpinella crispa Tragi. J. B. 3. 2. 113. Saxifraga, parva. Dod. p. 315. Saxifraga, minor, crispa, umbellâ candidâ. H. L. 538. Saxifraga, pimpinella, Germanica, minor. Clus. H. cxcvii. †. b.*

5. *Tragofelinum; majus; degener; umbellâ albâ. Pimpinella, saxifraga, major, degener, seu foliis longius dissectis. M. H. 3. 284. Pimpinella saxifraga, major, degener. M. U. 1c. T. 5.*

6. *Tragofelinum; quæ pimpinella; saxifraga; minor; crispa. M. U. 1c. T. 5.*

7. *Tragofelinum; parvum; folio apii; umbellâ albâ. Sher.*

8. *Tragofelinum; folio apii; minimum.*

9. *Tragofelinum; perenne; folii apii majus. Amplissimus Sberard misit.*

Sium. T. 308. 162.

Radix cauliformis, fibrosa, lignosa.

Folia pinnata, conjugatim adnata uni costæ, uno impari claudente extremum.

Florum petala bifida.

Semen subrotundum, gibbum, striatum.

1. *Sium; latifolium. C. B. P. 154. Sium, maximum, latifolium. J. B. 2. 175. Sium, aquaticum, latifolium. M. U. 12. M. H. 3. 282. Sium Dioseoridis, sive pastinaca aquatica major. Park. Tb. 1240. †.*

2. *Sium; crucæ folio. C. B. P. 154. Sium, aquaticum, rugosis foliis, multifidis, trifidis, & dentatis. M. U. 12. Ic. T. 5. Sium aquaticum, foliis multifidis, longis, & serratis. M. H. 3. 283. Sium, alterum. Dod. p. 589. Cicuta, aquatica, Gesneri. J. B. 3. 175. Cicuta, maxima. H. Eyf. Vern. o. 7. F. 2. Fig. 2. Herba venenosa. Lob. †.*

3. *Sium; sive apium palustre; foliis oblongis. C. B. P. 154. Sium. Dod. p. 589. Sium, umbelliferum. J. B. 3. 172. Sium, aquaticum, angustifolium. M. U. 15. Ic. T. 5. †.*

4. *Sium; medium; ad alas floridum. M. U. 63. Sium, aquaticum, procumbens, ad alas floridum. M. H. 3. 283. & Apium, palustre, minus, cauliculis procumbentibus, ad alas floridum. H. L. †. b.*

5. *Sium; arvense, sive segetum. T. 308. Sium, terrestre, umbellis rarioribus. M. H. 3. 283. Selinum, Sii foliis. Ger. emac. 1018. Selinum, segetale. Park. Tb. 932. a. b.*

6. *Sium; aromaticum; Sison officinarum. T. 308. Sison. M. U. 12. M. H.*

56 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

M. H. 3. 283. *Sison*, quod *amomum officinis nostris*. *C. B. P.* 154. *Sison*, sive officinarum *amomum*. *J. B.* 3. 2. 107. *Petroselinum*, *Macedonicum*, *Fuchsi*. *Dod.* p. 697. *a. b. t.*

Ordo tertius, foliis nunc lobatis, nunc foeniculaceis, nunc medio modo divisis.

1. Semine oblongo, striato.

CICUTARIA. *T.* 322. 171.

Radix crassa, magna.

Caulis crassus, cavus, geniculatus.

Folia cicutæ majora, crassiora.

Semen crassum, longum, gibbum, lunatum, valde striatum.

1. *Cicutaria*; *latifolia*; *foetida*. *C. B. P.* 161. *Cicutaria*, *latifolia*, *foetidissima*. *M. U.* 18. *M. H.* 3. 291. *Cicutaria*, *latifolia*, *foetidissima*, *perperam seseli Peloponense quorundam*. *Lob. obs.* 423. *Seseli*, *Peloponense*, *Matthioli*. *Cicutaria quorundam*. *J. B.* 3. 2. 184.

CICUTA. *T.* 306. 160.

Radix fibrosa, magna satis, & crassa.

Folia minutim, multumque, divisa.

Floris petala bifida, cordiformia, inæqualia.

Semen breve, rotundum, striatum.

1. *Cicuta*; *major*. *C. B. P.* 160. *M. U.* 18. *Cicuta*. *Dod.* p. 461. *J. B.* 3. 2. 175. *Cicuta*, *major*, *vulgaris*. *Clus. H. cc.* *Cicuta*, *major*, *vulgaris*. *M. H.* 3. 290. *a. †.*

2. *Cicuta*; *minor*; *petroselino similis*. *C. B. P.* 160. *M. H.* 3. 290. *M. U.* 18. *Cicutaria*, *apii folio*. *J. B.* 3. 2. 197. *Cicutaria fatua*. *Lob. adv.* 327. *Petroselini vitium*. *Trag.* †. *a.*

PHELLANDRIUM. *T.* 306. 161.

Radix fibrosa.

Caulis crassissimus.

Folia amplissima, minutissimè divisa.

Florum petala cordiformia.

Semina exigua, gibba, leviter striata.

1. *Phellandrium*. *Dod.* p. 591. *Phellandrium*, vel *cicutaria aquatica quorundam*. *J. B.* 3. 2. 183. *Cicutaria*, *palustris*, *tenuifolia*. *C. B. P.* 161. *Lob. obs.* 424. *M. U.* 18. *M. H.* 3. 291. †.

2. *Phel-*

GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE. 57

2. Phellandrium; folio thyssellini; caule rotundo. *Ind.* 2.
3. Phellandrium; thyssellini folio; caule sulcato. *Ind.* 2. *Cicutaria Cassubica, thyssellini folio. Breyn. Prodr.* 1. *Raj. H.* 1868.

CRITHMUM. T. 317. 169.

Radix fibrosa, sparsa.

Folia succulenta, crassiuscula, angusta, trifida, divisa & subdivisa.

Semen planum, leviter striatum, involucrum ponens.

1. Crithmum; five fœniculum maritimum minus. *C. B. P.* 288. *M. U.* 20. *Crithmum multis, five fœniculum marinum. J. B.* 3. 27. 194. *M. H.* 3. 289. *Crithmum marinum. Dod. p.* 705. *Baticula, quasi parva batis. Cæsalp. t. R. P.*

2. Crithmum; five fœniculum marinum; majus; odore apii. *C. B. P.* 288. *M. U.* 20. *M. H.* 3. 290. *Crithmum, five fœniculum marinum, grandius, cui succus luteus. J. B.* 3. 2. 195. *Crithmum, Siculum, baticulæ alterum genus Cæsalpini. Bocc. Rar.* 53. 54. *Baticulæ alterum genus, ex Sicilia. Cæsalp. t. R. P.*

AMMI. T. 304. 159.

Radix fibrosa.

Flos petalis cordiformibus, inæqualibus.

Semina exigua, gibba, striata.

1. Ammi; majus. *C. B. P.* 159. *Ammi, annuum. M. U.* 21. *Ammi, vulgare. Dod. p.* 301. *Ammi, vulgare, majus, latioribus foliis, semine minus odorato. J. B.* 3. 2. 27. *M. H.* 3. 295. a.

2. Ammi; majus; foliis plurimum incis, & nonnihil crispis. *C. B. P.* 159. *Var. a.*

3. Ammi; perenne. *M. U.* 22. *Ammi quorundam Dalechampii. Lugd.* 696. *Ammi, perenne, repens, foliis longioribus, serratis. M. H.* 3. 294. *Eryngium, arvense, foliis serræ similibus. C. B. P.* 386. *Eryngium, quartum Matthioli, umbelliferum. J. B.* 3. 2. 195. *Eryngium, quartum. Dod. p.* 732. co.

APIUM. T. 305. 160.

Radix satis magna in plurimis.

Folia alata ad costam ramosam, divisa in segmenta plerumque minora.

H

Flo-

58 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

Floris petala equalia, integra.
Semina gibba, striata.

1. Seminibus glabris.

1. Apium; hortense; vel petroselinum vulgô. C. B. P. 153. M. H. 3. 292. Apium, sativum, vulgare, sive petroselinum. Col. 1. 113. Apium, hortense. Dod. p. 694. Apium, hortense, quod petroselinum multis, palato gratum, planum. J. B. 3. 2. 97. Apium, sativum, vel hortense, vulgatius, latifolium, planum. M. U. 22. b.

2. Apium; vel petroselinum; crispum. C. B. P. 153. M. U. 22. M. H. 3. 292. Apium, sativum, Sardum. Col. Apium, hortense multis, quod petroselinum vulgô, palato gratum, crispum. J. B. 3. 2. 97. b.

3. Apium; hortense; latifolium. C. B. P. 153. Apium, hortense, maximum. C. B. Prodr. 81. M. H. 3. 292. Apium, latifolium, seu hortense maximum. M. U. 21. Apium, hortense, magnum, vulgari hortensi sive petroselino vocato sapore idem, sive Anglicanum quibusdam. J. B. 3. 2. 99. b.

4. Apium; hortense; latifolium; maximâ, crassissimâ, suavi, & eduli, radice. K. Ind. 12. b.

5. Apium; montanum; folio tenuiore. C. B. P. 153. Apium, sativum, hortense, angustifolium. M. U. 23. Saxifraga, montana, Gratianopolitana, folio tenuiore. M. H. 3. 273. Apium, quod petroselinum Dalechampii, folio tenui, apii hortensis semine, subrubro, amaro, radice nigra. J. B. 3. 2. 19. b.

6. Apium; palustre; & apium officinarum. C. B. P. 154. M. H. 3. 293. Apium, palustre, paludapium dictum. M. U. 21. 23. Apium, vulgare, ingratius. J. B. 3. 2. 100. Elæoselinum. Dod. p. 695. Paludapium. Lob. Adv. 315. Obs. 405. b. †.

7. Apium; dulce; celeri Italarum. H. R. Par. Selinum, sive apium dulce. Park. Tb. 926. Apium, palustre, seleri dictum. M. U. 21. Apium, Italicum, seleri dictum. M. U. 22. b.

8. Apium; dulce, celeri Italarum; folio variegato. K. b.

9. Apium; degener; foliis longius dissectis. M. U. 22. Ic. T. 7. Apium, hortense, degener, foliis longis & angustis. M. H. 3. 292. b.

10. Apium; Lusitanicum; maximum; folio trilobato; flore luteolo. Petroselinum, Lusitanicum, facie selini. Volk. Petroselinum, Siculum, folio selini. H. Mauroc. An apium, sui folio, annuum, Lusitanicum. Grisl. Virid. 6? b. H.

11. Apium; Græcum; saxatile; folio crithmi. T. Cor. 21. Voy. 1. 130. Ic. & descr. H.

12. Apium; Pyrenaicum; thapsiæ facie. T. 305. Seseli Pyrenaicum, thapsiæ facie. D. Fagon. Sch. Bot. par. Selinum, Pyrenaicum, lobis foliorum acutioribus. Vaill. H.

13. Apium;

GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE. 59

13. Apium; montanum; sive petræum; album. *J. B. 3. 2. 105. H.*
2. Seminibus villosis.

14. Apium; Macedonicum. *C. B. P. 154. M. H. 3. 293. T. 305.*
Apium, semine villoso, seu incano, Macedonicum. M. U. 21. Apium, seu petroselinum Macedonicum multis. J. B. 3. 2. 102. Daucus secundus Dioscoridis. Col. 1. 103. Daucus Macedonicus, Apii folio Flor. 2. 17. b. H.

15. Apium; peregrinum; foliis subrotundis. *C. B. P. 154. C. B. Prodr. 81. M. H. 3. 293. Apium, semine villoso, incano, peregrinum, primum Clusii. M. U. 21. Selinum, peregrinum, I. Clus. H. cxcix. Vismaga, minor quorundam, selinum peregrinum Clusii, semine birsuto. J. B. 3. 2. 94. Daucus, tertius Dioscoridis, secundus Plinio. Col. 1. 108. It. 109. Daucus, peregrinus, foliis subrotundis pinnatis. Flor. 2. 17. b. H.*

3. Seminibus odoratissimis.

16. Apium; anisum dictum; semine suaveolenti majore. *Anisum Herbariis, semine majore. C. B. P. 159. Anisum Veteribus. J. B. 3. 2. 92. Anisum, vulgare. Clus. H. ccii. M. U. 25. Anisum, vulgatum, minus, annuum. M. H. 3. 297. a.*

CARUI. *T. 306. 160.*

Radix annua, fibrosa.

Folia tenuiter laciniata, costæ conjugatim adnata, sine pedunculis.

Floris petala bifida, cordiformia, apice introrsum flexo.

Semina longiuscula, exigua, gibba, striata.

1. Carui. *Cæsalpini 291. Cuminum pratense, Carui officinarum. C. B. P. 158. Carum, sive Carui. M. U. 24. M. H. 3. 296. Caros. J. B. 3. 2. 69. Carum. Dod. p. 299. a. b.*

2. Carui; semine majore. *Vaill. a.*

3. Carui; Alpinum. *C. B. P. 158. Prodr. 84. descr. a.*

2. Semine globoso.

CORIANDRUM. *T. 316. 168.*

Radix annua, fibrosa.

Folia inferiora lata, superiora tenuiter incisa.

Petala florum inæqualia, cordiformia.

Fructus ex duobus seminibus hemisphæricis, vel sphaericis, constat.

1. Coriandrum; majus. *C. B. P. 158. M. H. 3. 269. Coriandrum, sativum, majus. M. U. 8. Coriandrum. J. B. 3. 2. 89. a.*

2. Coriandrum; minus; testiculatum. *C. B. P. 158. M. H. 3. 269. Coriandrum, minus, odorum. J. B. 3. 2. 91. a.*

H 2 3. Co-

60 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

3. Coriandrum; sylvestre; foetidissimum. C. B. P. 158. a.

3. Semine alâ foliaceâ cincto.

THAPSIA. T. 321. 171.

Radix in plerisque crassa, lactescens, in aliis fibrosa.

Folia pluribus tenuiter secta.

Semen longum, striatum, alâ foliaceâ amplissimâ cinctum utrinque emarginatâ.

1. Thapsia; latifolia; villosa. C. B. P. 148. *Thapsia quorundam, hirsuta, & aspera, cicutæ folio, flore luteo, semine lato, aliis seseli Peloponesiacum.* J. B. 3. 2. 185. M. H. 3. 319. *Thapsia I Clus. H. cxcii. H.*

2. Thapsia; foliis libanotidis; foetidissima. C. B. P. 148. M. H. 3. 319. *Thapsia III Clusii, Tuero vocata, foliis glutinosis, radice nigra.* J. B. 3. 2. 186. *Thapsia IIII Clus. H. cxcii. H.*

3. Thapsia; foliis apii; Lusitanica; foetidissima; flore albo. T. 322. t.

4. Thapsia; foliis apii; foetidissima; flore luteo. *An & Thapsia, tenuifolia, carotæ effigie.* M. H. 3. 319. ? t.

5. Thapsia; tenuiori folio; Appula. T. 322. *Thapsia, tenuifolia, petiolis foliorum radiatis.* M. H. 3. 319. *Panax, asclepium.* Col. 1. 86. *Panax, asclepium, semine folioso.* C. B. P. 158. H.

2 6. Thapsia; Orientalis; anethi folio; semine eleganter crenato. T. Cor. 22. *Gingidium, folio fœniculi.* C. B. P. 151. *Anetho similis planta, semine lato, laciniato.* J. B. 3. 2. 7. *Gingidium.* Rarwolf. Camer. Hort. It. XVI. a.

7. Thapsia; Alpina; lucida; thalictri aut carotæ folio; flore albo. Bocc. Mus. p. 2. 84. Tab. 77.

1 8. Thapsia; sive Turbith Garganicum; semine latissimo. J. B. 3. 2. 50. H.

9. Thapsia; maxima; folio latissimo. C. B. P. 148. M. H. 3. 318. *Thapsia III Clus. H. cxcii. Thapsia Salmanticensis, sive III Clusii, magna, flore luteo, semine lato.* J. B. 3. 2. 186. H.

4. Semine molendinaceo.

LASERPITIUM. T. 324. 172.

Radix vivax, magna, acris, lactescens.

Folia lata, magna, magis minusve lobata.

Floris petala cordiformia, expansa, infrâ angusta, suprâ lata.

Ovarii summum, infrâ placentulam, exit in denticulos susti-

GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE. 61

sustinentes instar caliculi brevis placentulam albam, magnam.

Semen gibbum, instructum quatuor alis foliaceis per longitudinem decurrentibus, planis vel crispis.

1. *LasERPitium*; foliis latioribus, lobatis, nigrioribus; semine plano. *t.*

2. *LasERPitium*; foliis latioribus, lobatis. *M. U.* 29. *Libanotis*, latifolia, altera, sive vulgatio. *C. B. P.* 159. *Libanotis Theophrasti quorundam*, sive *seseli Æthiopicum Matthioli*, cervaria alba. *J. B.* 3. 2. 164. *Seseli Æthiopicum. Herba. Dod.* p. 313. *Seseli Æthiopicum Matthioli. Clus. H. CXCI. III.* *LasERPitium*, lobis latioribus, semine plano. *M. H.* 3. Sect. 9. Tab. 19. N. 6. *t.*

3. *LasERPitium*; majus; Alpinum; foliis rotundioribus. *T.* 324. *And LasERPitium*, foliis angelicæ, semine plano. *M. H.* 3. 21? *t.*

4. *LasERPitium*; foliis amplioribus; semine crispo. *T.* 324. *Libanotidi Theophrasti quorundam valde similis*, costus amara dicta, semine crispo. *J. B.* 3. 2. 165. *LasERPitium*, latifolium, semine crispo, alis foliorum rotundioribus. *M. H.* 3. 321. *LasERPitium*, lobis latioribus, semine crispo, & verrucoso. *M. H.* 3. Sect. 9. *T.* 19. N. 1. *t.*

5. *LasERPitium*; humilius; paludarii folio; flore albo. *T.* 325. *Libanotis Theophrasti minor. Lobelio Ic.* 705. *J. B.* 3. 2. 167. *LasERPitium*, apii folio, semine crispo, aspero. *M. H.* 3. 321. *t.*

6. *LasERPitium*; humilius; paludarii folio; flore purpurascente. *T.* 325. *t.*

7. *LasERPitium*; foliis angustioribus, saturatius virentibus. *M. U.* 28. 64. *LasERPitium*, lobis angustioribus, saturatè virentibus & lucentibus, semine crispo. *M. U. Elench. Tab.* 4. *LasERPitium*, lobis angustioribus, saturatè virentibus. *M. H.* 3. Sect. 9. Tab. 19. N. 8. *LasERPitium*, è regione Massiliæ repertum. *Lob. Adv.* 313. *LasERPitium*, è regione Massiliæ allatum. *J. B.* 3. 2. 137. *LasERPitium*, Gallicum. *C. B. P.* 156. *t.*

8. *LasERPitium*; lobis angustioribus, dilutè virentibus, plurifariam divisis. *M. U.* 64. 28. *M. Bloes.* 278. *M. H.* 3. 321. *LasERPitium*, selinoides, semine cristato, lævi. *Plukn. Almag.* 207. *LasERPitium*, lato, glauco, splendente, trifido, folio; flore albo; umbellâ sphericâ. *Ind.* 13. *t.*

9. *LasERPitium*; folio angusto, multifido; flore albo; alis seminum planis. *LasERPitium*, lobis angustioribus, longioribus, & dilutè virentibus, plurifariam divisis. *M. U.* 28. 64. *Plukn. Phyt.* 198. 6. ut figurâ expressit. *t.*

10. *LasERPitium*; latifolium; non sinuatum. *T.* 324. *LasERPitium*, latiore folio, non sinuatum. *Sc. B. P. M. H.* 3. 321.

11. *LasERPitium*; angustifolium; non sinuatum; semine crispo. *LasERPitium*, angustifolium, non sinuatum. *H. R. P.* *LasERPitium*, foliis longioribus, dilutè virentibus, conjugatim positis. *M. U.* 28. 64. *Plukn.* 198.

62 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

Fig. 3. *LasERPitium*, angustifolium, segmentis non divisis. M. H. 3. Sect. 9. Tab. 19. N. 9. *LasERPitium*, angustifolium, majus, segmentis longioribus, & indivisis. M. H. 3. 321. t.

12. *LasERPitium*; felinoides; semine crispo. T. 324. t.

13. *LasERPitium*; angustifolium; umbellâ contractâ & concavâ. T. 324. Schot. Bot. 167. Plukn. Phyt. 199. Fig. 1. t.

14. *LasERPitium*; tenuifolium; lobis obscurè virentibus. Plukn. Phyt. 198. Fig. 4. *LasERPitio Lobelii similis*, angustifolia. J. B. 3. 2. 137. *LasERPitium*, angustissimo, & oblongo, folio. T. 324. t.

15. *LasERPitium*; foliis angustis, nigricantibus, multifidis; flore purpurascente; alis seminum planis. t.

16. *LasERPitium*; Orientale; folio mei; flore luteo. T. Coc. 23. t.

5. Semine villosa.

DAUCUS. T. 307. 161.

Radix carnosâ in plerisque.

Folia tenuiter secta.

Petala cordiformia, inaequalia.

Umbella matura cava, contracta, nidum avis exprimens, in plerisque, succincta foliis latiusculis.

Semina villosa instar pediculorum.

1. *Daucus*; vulgaris. Clus. H. cxcviii. *Pastinaca*, tenuifolia, sylvestris Dioscoridi, vel *Daucus officinarum*. C. B. P. 151. M. U. 31. M. H. 3. 305. *Pastinaca*, sylvestris, sive *staphylinus Græcorum*. J. B. 3. 2. 62. a. b. †.

2. *Daucus*; sativus; radice albâ. T. 307. *Pastinaca*, tenuifolia, sativa, seu *hortensis*, radice albâ. M. U. 31. C. B. P. 151. M. H. 3. 305. *Pastinaca*, sativa, sive *carota alba*. J. B. 3. 2. 64. b.

3. *Daucus*; radice, & umbellâ, luteis. T. 307. b.

4. *Daucus*; sativus; radice aurantii coloris. T. 307. b.

5. *Daucus*; sativus; radice atrorubente. T. 307. *Pastinaca*, tenuifolia, sativa, radice atrorubente. C. B. P. 151. M. H. 3. 305. *Pastinaca*, sativa, sive *carota rubra*. J. B. 3. 2. 64. *Pastinaca*, sativa, rubens. Dod. p. 678. b.

6. *Daucus*; folio tordylii; flore albo; altissimus. *Caucalis*, daucoides, altissima, *pastinacæ sylvestris* folio, flore albo. H. Maur.

7. *Daucus*; maritimus; lucidus. T. 307. *Pastinaca*, tenuifolia, marina, foliis obscurè virentibus, & quasi lucidis. Bot. Monsp. *Pastinaca*, folio ænanthes. Bocc. Rar. 74. *Gingidium*, folio *cherophylli*. C. B. P. 151. Ex communicatione D. Vaillant.



CAVALIS : grā : folio minoris Rutæ. Ind. 15.

A. capillata radix. B. folium formæ & magnitudinis nativæ. C. flosculus vera magnitudinis. D. maturum semen.

6. Semine aculeato.

CAUCALIS. T. 323. 171.

*Petala inaequalia, cordiformia.**Semen oblongum, plus minusve sulcatum juxta longitudinem, jugis denticulatis & veluti aculeatis.*

1. *Caucalis*; arvensis; echinata; magno flore. C. B. P. 152. M. H. 3. 308. *Lappula*, *Canaria*, flore pulchro, magno, albo. J. B. 3. 2. 79. *Caucalis*. Dod. p. 700. an? H. Eyst. Vern. o. 8. F. 8. Fig. 2? *Echinophora*, *πυκνόκαρπ*. An *gingidium* *Dioscoridis*. Col. 1. 91. ? a.

2. *Caucalis*; major; daucoides; *Tingitana*. M. U. 65. M. H. 3. 308. a.

3. *Caucalis*; *Monspeliaca*; echinata; magno fructu. C. B. P. 153. M. U. 33. M. H. 3. 308. *Echinophora*, asperior, altera, *πλατύκαρπ*. Col. 1. 94. a.

4. *Caucalis*; arvensis; echinata; latifolia. C. B. P. 152. M. U. 33. *Lappula*, *Canaria*, latifolia, sive *Caucalis*. J. B. 3. 2. 86. *Echinophora*, quarta, major, *πλατύφυλλ*, purpurea. Col. 1. 97. a.

5. *Caucalis*; dauci sylvestris folio; echinato magno fructu. Botan. Monsp. App. 292. a.

6. *Caucalis*; semine aspero; flosculis rubentibus. C. B. P. 152. Prodr. 80. *Anthriscus* quorundam, semine aspero, hispido. J. B. 3. 27. 83. *Daucus*, annuus, minor, flosculis rubentibus. T. 308. *Caucalis* minor, flore rubente. Park. M. H. 3. 308. a. †.

7. *Caucalis*; segetum; minor; anthriscis hispido similis. Raj. Syn. 113. *Caucalis*, pumila segetum, goodyero. Ger. emac. a.

8. *Caucalis*; daucoides; *Syriaca*; altissima; folio pastinacæ sylvestris; flore albo. H. Mauroc. 43. b.

9. *Caucalis*; Orientalis; altissima; folio ferulæ. T. Cor. 23. b. H.

10. *Caucalis*; *Africana*; folio minori rutæ. Ind. 15. a. Flosculis albis, semine aromatico.

11. *Caucalis*; sylvestris; folio chærophylli. Flor. 2. 18. *Chærophylum* sylvestre, seminibus brevibus, subbirsutis. T. 314. *Myrrhis*, sylvestris, seminibus asperis. C. B. P. 160. *Myrrhis*, annua, semine striato, aspero, brevi. M. U. 44. *Myrrhis*, sylvestris, nova *Æquicolorum*. Col. 1. 112. a. †.

12. *Caucalis*; nodoso, echinato, semine. C. B. P. 153. Prodr. 80. M. H. 3. 308. *Caucalis*, nodoso, echinato, semine, anthriscis hispido affinis, si non ejus varietas. J. B. 3. 2. 83. *Daucus*, annuus, ad nodos floridus. T. 308. a.

64 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

ECHINOPHORA. T. 656. 423.

Calix monophyllus, quinquefidus, stellatus, umbellæ pedunculum includens.

Fructus unicapsularis, echinatus, includens semen unum longum.

1. Echinophora; pastinacæ folio. T. 656. Pastinaca, echinophora, Apula, & scandix. Col. 1. 101. Pastinaca, sylvestris, angustifolia, fructu echinato. C. B. P. 151.

7. Semine nuciformi.

CACHRYS. T. 325. 172.

Radix ingens, vivax.

Folia peucedani similia.

Fructus ovatus, fungosus, constat binis semiorvatis, fungosis vasculis, intus tenentibus nucleum, quod fit semen longum.

1. Cachrys; semine fungoso, fulcato, plano, minore; foliis peucedani. M. U. 62. M. H. 3. 268. Ic. post. pag. 332. t. H.

2. Cachrys; semine fungoso, fulcato, aspero; foliis peucedani latiusculis. M. U. 62. M. H. 3. 267. Ic. post. pag. 352. Hippomarathrum, Siculum. Bocc. Rar. 37. t. H.

8. Semine lato, compresso.

FERULA. T. 321. 170.

Radix valida, succulenta, lactescens.

Caules fungosi, medullâ pleni, igni suscipiendo apti.

Semina perampla, ovata, tenuia, involucrum ponentia, plerumque per maturitatem nigra.

1. Ferula; durior; seu rigidis & brevissimis foliis. Barrel. Ic. 77. Obs. 61. Pag. N^o. 638. Boccon. Mus. 2. 84. Tab. 76. t. H. R. D.

4 2. Ferula; major; seu fœmina Plinii. M. U. 35. Ferula, tenuiore folio, seu fœmina Plinii. C. B. P. M. H. 3. 309. Ferula, fœmina Plinii. C. B. P. 148. Ferula, folio fœniculi, semine latiore & rotundiore. J. B. 3. 2. 43. Ferula. Dod. p. 321. t.

7 3. Ferula; glauco folio; semine lato, oblongo; quibusdam thapsia ferulacea. J. B. 3. 2. 45. t. H.

3 4. Ferula; galbanifera. Lob. Obs. 451. J. B. 3. 2. 52. Ferulago, latiore folio. C. B. P. 148. M. H. 3. 309. Ferulago. Dod. p. 321 t. H.

GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE. 65

5. Ferula; Africana; galbanifera; folio & facie ligustici. Par. Bat. *Ferula*, fruticosa, sempervirens, foliis anisi. Par. Bat. Prodr. 334. Oreoselinum, anisoides, arborescens, ligustici foliis & facie, flore luteo, Capit. Bonæ Spei. Breyn. Prodr. 2. Oreoselinum, Africanum, galbaniferum, frutescens, anisi folio. T. 319. Anisum, Africanum, frutescens, folio & caule rore cæruleo tinctis. Plukn. Phyt. 12. 2. H. R. D.
6. Ferula; Tingitana; folio latissimo, lucido. H. Edinb. *Ferula*, Tingitana, lucida. Par. Bat. *Ferula*, Tingitana, lucida, foliis laserpii. M. H. 3. 309. t. H.
7. Ferula; Tingitana; lucida; folio angusto. H. L. t. H.
8. Ferula; foliis capillaceis, erectis, cachryos; semine glauco. Hanc amplissimi Sherardi munere ex seminibus missis hortus possidet. An ferula Orientalis, folio & facie cachryos. T. Cor. 22? T. Voy. 2. 379. videtur. t. H.
9. Ferula; Africana; galbanifera; folio myrrhidis. H. A. 2. 115. H. R. P.
10. Ferula; foliis libanotidis brevioribus; Alpestris; umbellâ amplissimâ. Ferulacea, Alpestris, umbellâ maximâ, foliis libanotidis brevioribus. H. Maur.
11. Ferula; Alpestris; foliis seselios Massiliensis. Libanotis, Alpestris, minor, foliis seseli Massiliensis. H. Maur.
12. Ferula; quæ libanotis; folio fœniculaceo; semine folioso. C. B. P. 158. t. H.
13. Ferula; minor; ad singulos nodos umbellifera. T. 321. Libanotis, ferulæ folio & semine. C. B. P. 158. t. H.

ANETHUM. T. 317. 169.

Radix annua, tenera, fibrosa.

Folia capillacea, fœniculacea.

Semina ovata, plana, striata, marginata.

1. Anethum; hortense. C. B. P. 147. M. H. 3. 311. Anethum. J. B.
2. 6. Dod. p. 298. M. U. 36. a.
2. Anethum; verum; Pernambuccense. Zanon. Anethum Pernambuccense. H. L. a.
3. Anethum; segetum; semine minori. Virid. Lusit. a.

PEUCEDANUM. T. 318. 169.

Radix vivax, altè depacta, comosa.

Folia alata, angusta, graminea, trifariam divisa.

Semen planum, fere ovatum, leviter striatum, marginatum.

1. Peucedanum; majus; Italicum. C. B. P. 149. M. U. 36. Tab.
9. Ic. M. H. 3. 312. Lob. Obs. 454. J. B. 3. 2. 36. Peucedanum, foliis longioribus. Dod. p. 317. t.
2. Peu-

66 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

2. Peucedanum; majus; Italicum; foliis longis, angustis. *An ferula Orientalis, peucedani folio.* T. Cor. 22? t. H.

3. Peucedanum; Germanicum. C. B. P. 149. M. U. 36. *Peucedanum, majus, brevioribus foliis, Germanicum.* M. H. 3. 312. *Peucedanum, minus, Germanicum.* J. B. 3. 2. 36. *Peucedanum, fœniculum porcinum.* Lob. Adv. 350. Obs. 453. t.

SPHONDYLIIUM. T. 319. 170.

Radix perennis, longa.

Folia maxima, variè laciniata, & in magnas lacinias.

Florum petala bifida, cornuta, petalo exteriori cæteris majore.

Semen amplum, planum, ovatum, apice introrsum emarginato, striatum, involucrum plerumque deponens, lituris nigris in superficie contactus.

1. Sphondylium; vulgare; hirsutum. C. B. P. 157. M. U. 38. M. H. 3. 313. *Sphondylium quibusdam, sive branca ursina Germanica.* J. B. 3. 2. 160. *Sphondylium.* Dod. p. 307. †.

2. Sphondylium; maximum; Transilvanicum; ricini folio. Breyer. Prodr. 2. *Panaces Heracleum.* Matth. 544.

3. Sphondylium; hirsutum; folio angustiore, minutius laciniato; caule atropurpureo; flore rubello. *An Sphondylium, foliis angustioribus, atropurpureis.* H. R. Monsp. T. 320?

4. Sphondylium; majus; sive panax Heracleum quibusdam. J. B. 3. 2. 161. *Panax, Sphondylii folio, sive Heracleum.* C. B. P. 157. *Panaces Heracleum, vel potius Sphondylium alterum.* Dod. P. 307. *Sphondylium, humilius, latioribus foliis, umbellâ ampliore.* M. H. 3. 313.

5. Sphondylium; hirsutum; foliis angustioribus. C. B. P. 157. Prodr. 83. *Sphondylium, folio frequentius laciniato.* Ind. 16. *An Sphondylium, folio laciniato.* Ponc. Mont. Bald. Ital. 190?

6. Sphondylium; Alpinum; glabrum. C. B. P. 157. Prodr. 83. J. B. 3. 163.

PASTINACA. T. 319. 170.

Radix crassa, carnosâ, succulenta.

Folia lata, ampla, grandia, costâ crassâ fulta.

Semen ovatum, amplum, tenue, marginatum, involucrum deponens.

2. 1. Pastinaca; sylvestris; latifolia. C. B. P. 155. M. U. 39. M. H. 3. 314. *Pastinaca, sylvestris, Germanica, quibusdam elaphobot.* J. B. 3. 2. 149. b.

GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE. 67

2. Pastinaca; sativa; latifolia. C. B. P. 155. M. U. 39. M. H. 3. 1
314. Pastinaca, sativa, latifolia, flore luteo. J. B. 3. 2. 150. b.
3. Pastinaca; sylvestris; altissima. T. 319. Panax costinum. C. B. P. 156. Sphondylion, vel potius Pastinacæ Germanicæ affinis, panax, sive pseudocostus, flore luteo. J. B. 3. 2. 156.
4. Pastinaca; olusatrici folio. Panax, pastinacæ folio; an Syriacum Theophrasti. C. B. P. 156. Panax Heracleum. M. H. 3. 315. Panax, altera Recentiorum, olusatrici aut pastinacæ folio. Lob. Adv. & Observ. 400. H.
5. Pastinaca; folio quasi libanotidis latifoliæ. Umbelliferæ folio panacis nomine misit Illustris Sherard. Panax, folio glabro, nitente, lato. Ind. 16. H.
6. Pastinaca; semine longissimo. Umbellifera, folio panacis, semine longissimo. Sher. Panax, folio glabro, nitente, lato, altior. Ind. 16. H.
7. Pastinaca; sylvestris; altissima. T. 319. Hoc nomine misit D. Salvador, differt à tertia, foliis majoribus, scabris, asperis.
8. Pastinaca; sativa; radice turbinatâ. Vaill. b.

THYSSELINUM. T. 319. 169.

Radix vivax, magna, succo lacteo plenissima, ut & tota planta.

Folia ferulæ vel phellandrii.

Semen ovatum, planum, amplum, striatum, marginatum, involucrium quandoque deponens.

1. Thysselinum Plinii. Lob. Obs. 409. Ic. 711. Thysselinum. M. U. 42. Ic. Tab. 10. M. H. 3. 317. Apium, sylvestre, lacteo succo turgens. C. B. P. 153. Apium, sylvestre, Dodonæi, Thysselinum quorundam, planta lacteo succo turgens, locis humidis proveniens. J. B. 3. 2. 188. Apium, sylvestre, sive Thysselinum. Dod. p. 699. †. aq.
2. Thysselinum; palustre. T. 319. Thysselinum, palustre, foliis ferulaceis. H. L. 598. Seseli, palustre, lactescens, acre, foliis ferulaceis, flore albo, semine lato. J. B. 3. 2. 188. Seseli, palustre, lactescens. C. B. P. 162. Prodr. 85. Ic. An & pyrethrum umbelliferum. C. B. P. 148? Sanè videtur. aq.

OREOSELINUM. T. 319. 169.

Radix dauci tenuior, non lactescens.

Folia apii, vel cicutæ.

Semina ovata, plana, ampla, striata, marginata, involucrium ponentia.

1. Oreoselinum; apii folio; majus. T. 318. Libanotis nigra, Theophrasti. M. H. 3. 318. Daucus, montanus, apii folio, major. C. B. P.

68 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

150. *Libanotis*, *Alsatia*, quorundam, aliis dicta *cervaria nigra*. *J. B.* 3. 2. 165. *Daucus*, *selinoides*, *secundus*. *Lob. Ic.* 720. *Seseli*, *montanum*, *Pannonicum*. *Clus. H.* cxciii. *H.*

2. *Oreoselinum*; *apii folio*; *minus*. *T.* 318. *Oreoselinum*, *majus*. *Clus. H.* cxcv. *M. H.* 3. 317. *Oreoselinum*, *sive Vcelgutta* *Dod. p.* 696. *Apium*, *montanum*, *nigrum*. *C. B. P.* 153. *Apium*, *montanum*, *folio ampliore*. *Id. lb.* *Apium*, *montanum*, *Dalechampi*. *J. B.* 3. 2. 103. *Apium*, *montanum*, *nigrum*. *J. B.* 3. 2. 104. *H.*

3. *Oreoselinum*; *pratense*; *cicutæ folio*. *T.* 318. *Daucus*, *Alsaticus*. *C. B. Prodr.* 77. *Umbellifera*, *Alsatia*, *magna*, *umbellâ parvâ*, *subluteâ*. *J. B.* 3. 2. 106. *Angelica*, *pratensis*, *apii folio*, *altera*. *T.* 313. ?

9. *Semine margine crenato.*

TORDYLIUM. *T.* 320. 170.

Radix annua, *fibrosa.*

Petala inæqualia, *cordiformia*, *profundè bifida.*

Semen orbiculatum, *planum*, *margine elato*, *ut plurimum denticulato*, *involucrum deponente.*

1. *Tordylium*; *maximum*. *T.* 320. *Tordylium*, *maximum*, *semine sphondylii aculeato*. *M. U.* 40. *Tordylium*, *majus*, *vulgare*, *seminibus limbo quasi lævi*. *M. U.* 66. *Tordylium*, *majus*, *foliis acutioribus*, *viridibus*. *M. H.* 3. 316. *Caucalis*, *maxima*, *sphondylii aculeato semine*. *C. B. P.* 152. *an* *Seseli Creticum*, *majus*. *C. B. P.* 161? *Caucalis*, *major*, *Clus. H.* cci. *J. B.* 3. 2. 85. *Seseli Creticum*, *major*, *semine minus pulchro*, *hirsuto*. *J. B.* 3. 2. 85. *a.*

2. *Tordylium*; *minus*; *limbo granulato*; *Syriacum*. *M. U.* 37. 40. *Tordylium*, *Syriacum*, *humilius*, *semine granulato*, *maiore*. *M. H.* 3. 317. *Gingidium*, *foliis pastinacæ latifoliæ*. *C. B. P.* 151. *Caucalis*, *Syriaca*, *cum maximo semine*. *J. B.* 3. 2. 86. *Gingidium*, *primum*. *Dod. p.* 702. *a.*

3. *Tordylium*; *Narbonense*; *minus*. *T.* 320. *Tordylium*, *Creticum*. *H. Eyf. Æst.* o. 12. *F.* 9. *Fig.* 1. *Tordylium*, *erectum*, *hirsutius*, *seminibus limbo granulato minore*. *M. H.* 3. 316. *Seseli*, *Creticum*, *minus*. *C. B. P.* 161. *Caucalis*, *minor*, *pulchro semine*, *sive Bellonii*. *J. B.* 3. 2. 84. *Seseli Creticum*. *Dod. p.* 314. *a.*

4. *Tordylium*; *Apulum*; *minimum*. *Col. l.* 124. *M. H.* 3. 316. *Seseli Creticum*, *minimum*. *C. B. P.* 161. *a.*

5. *Tordylium*; *album*; *facie Tordylii luteo*, *Columnæ*. *H. C.* *a.*

6. *Tordylium*; *folio longo*, *angusto*, *flore albo*, *magno*; *semine elegantissimè & profundissimè crenato*, *albo*. *a.*

7. *Tordylium*; *Orientale*; *Secacul Arabum dictum Rawolfio*. *Nissole*. *Sisarum Syriacum*. *C. B. P.* 155. *Secacul Arabi* *sive pastinaca Syriaca*. *Rawolfii*. *Lugd. App.* *a.* *b.*

Dale p. 116.

Dale p. 124.

GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE. 62

10. Semine mucronato.

MYRRHIS. T 315. 166.

Petala inæqualia.

Semen striatum, rostrum avis exprimens.

1. Semine magno, longo, sulcato lævi.

1. Myrrhis; perennis; semine striato; alba; major; odorata. *M. U. 44. Myrrhis, magna, semine sulcato, longo. J. B. 3. 2. 77. M. H. 3. 301. Myrrhis, major, vel cicutaria odorata. C. B. P. 160. Myrrhis. Dod. p. 701.*

2. Semine minori, lævi, vel villosi.

1. Myrrhis; annua; semine striato, lævi; tuberosa; nodosa; coniophyllon. *M. U. 44. M. H. 3. 302. Cicutaria, bulbosa. C. B. P. 161. Cicutaria, Pannonica. Clus. H. cc. Cicutaria, odorata, bulbosa. J. B. 3. 2. 83. Bulbocastanum, coniophyllon. Cam. H. 31. a.*

2. Myrrhis; perennis; alba; minor; foliis hirsutis; semine striato, aureo. *M. H. 3. 301. M. U. 44. 45. 46. 66.*

3. Myrrhis; perennis; alba; minor; foliis hirsutis. *M. H. 3. 301. M. U. 44. 45. 46. 66.*

4. Myrrhis; perennis; alba; minor; foliis hirsutissimis. *M. H. 3. 301. M. U. 44. 45. 46. 66.*

5. Myrrhis; perennis; alba; folio glabriore, viridiori, splendente.

6. Myrrhis; annua; glabra; alba; minor. *Ind. 17. An Myrrhis annua, nodosa, pastinacæ sylvestris folio candicante. H. Cath? a.*

7. Myrrhis; annua; semine striato, lævi. *M. U. 44. Chærophyllum sylvestre. C. B. P. 152. Apium sylvestre Germ. 1020. a.*

8. Myrrhis; annua; semine striato, aspero, oblongo; nodosa. *M. U. 44. 67. Chærophyllum sylvestre, alterum, geniculis tumentibus. T. 314.*

9. Myrrhis; annua; semine striato, villosi, incano. *M. U. 67. Myrrhis, tenuifolia, annua, Cretica, semine lanugine albâ pubescente. M. H. 3. 302. Daucus, Creticus, semine hirsuto. J. B. 3. 2. 56. b. H.*

10. Myrrhis; Sicula; elatior; tenuioribus foliis. *M. H. 3. 302. Chærophyllum, Siculum, foliis sopheræ, villosi semine. T. 314. Daucus, secundus, Siculus, foliis sopheræ. Zan. 80. b. H.*

11. Myrrhis; Orientalis; folio angustiori peucedani; semine villosi. *Ind. 17. Daucus, Cretensis, verus. Lob. Ic. 1. 722. Daucus, fœniculi foliis tenuissimis. C. B. P. 150. H.*

12. Myrrhis; trifolia; Canadensis; angelicæ facie. *T. 315. Angelia, quorundam. Id.*

I 3

13. Myr-

70 GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE.

13. Myrrhis; folio angelicæ rugoso, hirsuto. *Chærefolium*, folio rugoso angelicæ, aromaticum. *Bocc. Mus. Tab. 19.* Myrrhis, folio podagrariæ. *Rivin. Podagraria hirsuta, angelicæ folio & odore. Vaill. Disc. 44.*

14. Myrrhis; foliis pastinacæ lætevirentibus. *T. C. 22.* *Daucus pastinacæ folio siculæ. Zan. 78.*

CHÆROPHYLLUM. *T. 314. 166.*

Omnia ut in myrrhide; sed semina non striata.

1. Chærophyllum; sativum. *C. B. P. 152. Chærophyllon. J. B. 3. 2. 75. Cerefolium, sativum. M. U. 46. M. H. 3. 303. a.*

2. Chærophyllum; sylvestre; perenne; cicutæ folio. *T. 314. Chærophyllum, sive Cerefolium, sylvestre, perenne, seminibus levibus, nigris. M. U. 46. M. H. 303. Myrrhis, sylvestris, seminibus levibus. C. B. P. 160. Cicutaria, vulgaris. J. B. 3. 2. 181. Myrrhis. Dod. p. 701. †.*

3. Chærophyllum; palustre; latifolium; flore albo. *Myrrhis palustris, latifolia, alba. T. 315. Cicutaria, palustris, latifolia, alba. C. B. P. 161. Cicutaria, alba. Lugd. 789.*

4. Chærophyllum; palustre; latifolium; flore albo. *Myrrhis, palustris, latifolia, rubra. T. 315. Cicutaria, palustris, latifolia, rubra. C. B. P. 161. Cicutaria, latifolia, hirsuta. J. B. 3. 2. 182. Cicutaria, rubra. Lugd. 789.*

11. Semine rostrato.

SCANDIX. *T. 326. 173.*

Radix annua, fibrosa.

Semina acum longam referentia.

1. Scandix; semine rostrato; vulgaris. *C. B. P. 152. M. H. 3. 304. Scandix. J. B. 3. 2. 71. M. U. 47. Scandix, pecten Veneris. Dod. p. 701. †. a.*

2. Scandix; Cretica; minor. *C. B. P. 152. Prodr. 79. M. H. 3. 304. Pecten Veneris, foliis tenuissimè dissectis, anthriscus Casabonæ. J. B. 3. 2. 73. Anisomarathrum. Col. 1. 80. a.*

3. Scandix; Orientalis; flore maximo. *T. C. a.*

Quartus ordo foliis simplicibus.

GYMNODISPERMAE UMBELLIFERAE 71

I. integris.

HYDROCOTYLE. T. 328. 173.

Radix repentissima.

Folia umbilicata, circinata.

Flos pentapetalos, rosaceus, ovario insidens.

Ovarium constat duobus seminibus planis, semi-orbiculatis.

1. Hydrocotyle; vulgaris. T. 328. *Cotyledon palustris*. Dod. p. 133. *Cotyledon aquatica*. J. B. 3. 781. *Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio*. C. B. P. 180. M. H. 2. 442. *Ranunculus aquaticus, umbilicato folio*. Col. p. 1. 315. Descr. 316. Ic. co.

2. Hydrocotyle; Zeylanica; asari folio. T. 328. *Ranunculo affinis, umbelliferis accedens, chelidonii minoris folio, Zeylanica minor*. Plukn. Phyt. cvl. 5. *Valerianella, Zeylanica, palustris, repens, bedera terrestris folio, ad radicem florida*. Par. Bat. 238. Ic. & Descr. *Asarina minor, Zeylanica*. Par. Bat. Prodr. Codagen. H. Malab. x. 91. *Ranunculi affinis planta, Indica, floribus purpureis*. Ibid. in Comment. co. t. H.

2.

BUPLEURUM. T. 309. 163.

Folia alternâ serie ad caulem.

Semina oblonga, gibba, striata.

α. Folio cauli adhærente.

1. Bupleurum; arborescens, folio falicis. T. 310. *Seseli Æthiopicum, falicis folio*. C. B. P. 161. *Seseli Æthiopicum, fruticosum, folio periclymeni*. J. B. 3. 2. 197. *Seseli Æthiopicum, frutex*. Dod. p. 312. M. H. 3. 298. H. R. D.

2. Bupleurum; angustissimo folio. C. B. P. 278. T. 310. *Bupleurum minimum*. Col. 1. 247. *Bupleurum annuum, minimum*. Col. M. H. 3. 300. *Auricula, leporis minima*. J. B. 3. 2. 201. a.

3. Bupleurum; annuum; longis & angustioribus foliis. M. H. 3. 300. *Bupleurum, annuum, angustifolium*. Bot. Monsp. T. 309. *Bupleurum angustifolium*. Dod. p. 633. a.

BUPLEURIOIDES.

Folia bina, terna, eidem loco conjugatim accreta.

Finis pedunculi gerit ovarium oblongum, cujus apex coronatur flore nudo, herbaceo, pentapetalo, petalis convolutis, cum staminibus quinque.

Ova-

72 GYMNODISPERMAE ÛMBELLIFERAE.

Ovarium instructum tubâ bifidâ, cujus apices reflexi hirsuti, maturum abit in duo semina oblonga.

Flores in speciem umbellarum digeruntur.

1. Bupleurioides; quæ simpla nobis Canariensium. Plukn. Alm. *Umbellifera Canariensis dicta Philobotanis.*

β. Folio à caule perfoliato, & umbellis coronâ foliaceâ succinctis.

PERFOLIATA. Raj. meth. 53.

1. Perfoliata; vulgarissima; sive arvensis. C. B. P. 277. *Perfoliata vulgaris.* M. H. 3. 299. *Perfoliata simpliciter dicta, annua, vulgaris.* J. B. 3. 2. 198. *Perfoliata.* Dod. p. 104. H. Eyst. Æst. o. 4. F. 3. Fig. 3. a. *Bupleurum perfoliatum, rotundifolium, annuum.* T. 310. a.

2. Perfoliata; annua; longioribus foliis. J. B. 3. 198. M. H. 3. 290. *Perfoliata minor, ramis inflexis.* C. B. P. 277. Prodr. 130. *Bupleurum perfoliatum, longifolium, annuum.* T. 310. a.

3. Perfoliata; montana; latifolia. C. B. P. 277. *Perfoliata montana.* Camer. Hort. Ic. 38. *Bupleurum montanum, latifolium.* T. 310.

2. Lobatis, in quinque segmenta profundè incisis.

ASTRANTIA. T. 314. 166.

Folia Imperatoriæ.

Finis pedunculi explicatur in calicem monophyllum, divisum in quindecim segmenta.

Ex centro calicis pedunculi multi, tenues, quorum alii in apice suo gerunt flosculum marem, pentapetalum, petalis intro flexis tegentem accuratè quinque stamina testiculata, succinctum calice monophyllo, quinquefido, herbaceo, tennerrimo: alii flosculos hermaphroditos, qui constant ovario dispermo, externè eleganter fimbriato, cujus apex coronatur caliculo quinquefido, monophyllo, intra quem flosculus pentapetalus, petalis introflexis tegentibus quinque stamina, in quorum medio duæ tubæ.

Semina involuta calyptrâ crispâ, striatâ.

1. *Astrantia*; major; coronâ floris purpurascens. T. 314. *Astrantia, major.* M. U. 7. 10. *Astrantia, nigra, major.* M. H. 3. 279. *Helleboreus niger, saniculæ folio, major.* C. B. P. 186. *Sanicula fœmina quibusdam, aliis helleboreus niger.* J. B. 3. 638. *Veratrum nigrum, Dioscoridis.* Dod. p. 387. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 12. Fig. 3.

2. *Astrai*

GYMNODISPERMÆ UMBELLIFERÆ. 73

2. *Astrantia*; major; coronâ floris candidâ. T. 314. *Helleborus niger*, *saniculæ folio*, major, flore albo, *Montis Aurci*. H. R. Par.

SANICULA. T. 326. 173.

Finis pedunculi fit calix monophyllus, quinquefidus, in quo flos pentapetalus, petalis arctè contractis, & accuratè tegentibus stamina duo, tria, quinque; atque hic est flos mas; alii flores sunt hermaphroditi, in calice quinquefido, habentes petala, quinque, quæ arctè contracta tegunt accuratè stamina duo, tria, quinque, circumposita ovario, constante binis ovis lappaceis, instructis suâ tubâ erectâ.

Semina gibba, echinata.

1. *Sanicula*; officinarum. C. B. P. 319. M. H. 2. 616. *Sanicula mas*, *Fuchsii*, sive *diapensia*. J. B. 3. 639. *Sanicula*. Dod. p. 140. H. Eyst. Vern. v. 6. F. 10. F. 3. *Sideritis III*. Col. 1. 124. &c.

GYMNOMONOSPERMÆ FLORE SIMPLICI.

Hæ classẽm constituunt; in quâ flores, simplices quidem, at formâ varii, innati apici ovarii, quod diversæ admodum est fabricæ.

Semina nuda, solitaria post flores singulos, uno calice comprehensos.

VALERIANA. T. 131. 52.

Folia conjugata.

Caulis floriger, divisus umbelliferarum more; umbellis majoribus, minoribusque, bina foliola, longa, supponuntur. Finis tandem pedunculi emittit similia duo foliola, calicis vicem præstantia. Ex centro apicis pedunculi, intra hæc foliola ovarium nascitur oblongum, cujus fimbriato apici innascitur

Flos monopetalus, infundibuliformis, quinquefidus, nudus, instructus tribus staminibus ex pariete interno floris enatis.

K

Tu-

74 GYMNOMONOSPERMAE FLORE SIMPLICI.

Tubus inferior floris, quæ hæret ovario, sæpe calcar cæcum ejicit ad latus.

Semen oblongum, depressum, in angustum porrectum, fere planum, papposum.

Ovarii apicis centrum emittit tubam longam.

1. Valeriana; major; hortensis. *M. U.* 52. *Valeriana hortensis*, *phu olusatris folio*, *Dioscoridis*. *C. B. P.* 164. *M. H.* 3. 101. *Valeriana*, major, odorata radice. *J. B.* 3. 2. 209. *Valeriana*, hortensis. *Dod.* 349. *Valeriana*, major. *H. Eyst. Æst.* o. 9. *F.* 11. *Fig.* 1.
2. Valeriana; sylvestris; major. *C. B. P.* 164. *M. H.* 3. 101. *Valeriana sylvestris*, magna, aquatica. *J. B.* 3. 2. 209. *Valeriana* major, sylvestris, foliis latioribus. *M. U.* 50. *Valeriana sylvestris*. *H. Eyst. Æst.* o. 9. *F.* 12. *Fig.* 2. *Dod.* p. 349. *phu Dioscoridis*. *Col. Ecphr.* 113 ad 120. *Æ* p. 1. 210. ad 221. *Valeriana sylvestris*, *I Clus. H. LV.* †.
3. Valeriana; major; sylvestris; montana. *C. B. P.* 164. *M. H.* 3. 101. *Valeriana sylvestris*, foliis angustioribus. *M. U.* 50. 51. *Valeriana sylvestris*, minor. *Clus. H. LV.* †.
4. Valeriana; foliis calcitrapæ. *C. B. P.* 164. *M. H.* 3. 101. *Valeriana annua*, seu æstiva. *Clus. H. LIV.* *Valeriana minor*, annua, æstiva. *M. U.* 50. 51. a.
5. Valeriana; foliis calcitrapæ, magis dissectis. *Valeriana*, annua, altera. *Clus. H. LIV.* a.
6. Valeriana; palustris; minor. *C. B. P.* 164. *M. H.* 3. 101. *Valeriana minor*, perennis, palustris. *M. U.* 50. 51. *Valeriana minor*, pratensis, vel aquatica. *J. B.* 3. 2. 211. *Valeriana minima*. *Dod.* p. 350. †.
7. Valeriana; sylvestris; vel palustris; altera; flore minore densius stipata. *Raj. Syn.* 98. *Valeriana*, palustris, minor, elatior, flosculis minoribus. *M. H.* 3. 101.
8. Valeriana; tuberosa. *J. B.* 3. 2. 207. *Imperat.* 868. *Valeriana*, tuberosa, oblonga, seu ænanthæ radice. *M. H.* 3. 101.
9. Valeriana; rubra. *C. B. P.* 165. *Dod.* p. 351. *H. Eyst. Æst.* o. 1. *F.* 3. *Fig.* 1. *Valeriana*, latifolia, rubra. *J. B.* 3. 2. 211. *Valeriana*, marina, latifolia, major, rubra. *M. U.* 50. *M. H.* 3. 102.
10. Valeriana; marina; latifolia; major; alba. *M. U.* 50. *M. H.* 3. 102.
11. Valeriana; rubra; angustifolia. *C. B. P.* 165. *Prodr.* 88. *J. B.* 2. 2. 211. *Valeriana*, marina, angustifolia, sive minor, rubra. *M. U.* 50. *M. H.* 3. 102.
12. Valeriana; maxima; Pyrenaïca; cacaliæ folio. *Fagon. T.* 131. *Plukn. Phytogr.* 232. 1.
13. Valeriana; Lusitanica; latifolia; annua; laciniata. *T.* 132. a.

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.



VALERIANELLA : cretica : fructu vesicario. T. C. 6.

A radix, annua, fibrosa. B. folium adultum, inferius, magnitudine nativæ. C. semel
apici vesiculae insidens. D. strobilus & vesiculae separatus. E. fructus maturus, in gr.

VALERIANELLA. T. 132. 52.

Radix annua, fibrosa.

Folia conjugata.

Caulis & rami dichotomi, ultimò umbelliferis similes.

Caliculus monophyllus, exiguus, quinquesfidus, conni-
uens.

Flos monopetalos, variae in variis formæ, quinquesfidus, præditus duobus, tribus, quatuor, staminibus ex pariete interno floris enatis, apici ovarii innatus.

Ovarium centro calicis innatum, tubam emittens, fit tandem

Fructus variae admodum formæ, monospermos.

1. Valerianella; arvensis; præcox; humilior; semine depresso. M. U. 53. Pseudovaleriana, annua, arvensis, præcox, humilis, semine compresso, rotundo. M. H. 3. 104. Locusta, herba. J. B. 3. 2. 325. Olus album. Dod. p. 647. Valeriana, campestris, inodora, major. C. B. P. 165. Valerianella, altera, nudo, umbilicato, & lævi, semine. Col. 1. 208. Valerianella arvensis, præcox, foliis integris. Fl. 2. 21. †. a.

2. Valerianella; arvensis; præcox; humilis; foliis serratis. T. 132. Valerianella, arvensis, serotina, foliis incis. Flor. 2. 21. Valerianella, arvensis, altior, serotina, semine turgidior. M. U. 50. Pseudovaleriana, erecta, serotina, semine umbilicato, hirsuto, pyramidal. M. H. 3. 104. Locusta, altera, foliis serratis. J. B. 324. a.

3. Valerianella; semine stellato. C. B. P. 165. Valerianella, semine scabiosæ stellato, hirsuto, & etiam umbilicato. Col. 1. 209. Valerianella, semine scabiosæ, major, Lusitanica. M. U. 53. Pseudovaleriana, annua, semine coronato, major, Lusitanica. M. H. 3. 104. a.

4. Valerianella; Cretica; fructu vesicario. T. Cor. 6. a.

5. Valerianella; cornucopoides; rubra; vel Indica. M. U. 53. Pseudovaleriana, cornucopoides, annua, purpurea, semine solido. M. H. 3. 104. Valeriana, peregrina, purpurea. C. B. P. 164. C. B. Prodr. 87. Valeriana, peregrina, seu Indica. J. B. 3. 2. 212. Clus. H. LIII. a.

6. Valerianella; Africana; foliis angustis; flore maculâ rubente notato. H. A. 2. 217. a.

Nulla plantarum familia magis monstrat difficultatem à floris & seminis fabricâ characterem definiendi.

LIMONIUM. T. 341. 177.

*Radix fibrosa.**Caules nudi, ramosi.*

Calix longus, tubulosus, superius explicatus quasi in florem pentagonum, intra quem rursus conduntur flores caryophyllæ, vel monopetalæ, infundibuliformes, multifidi, instructi quinque staminibus, plerunque duo uniti, sæpe proliferi, juxta caules juncti.

Ovarium in fundo imo, mirè absconditum latens, fit tandem

Semen oblongum, involutum calice squamoso, ceu capsulâ.

Calix, flos, ovarium, in hisce Plantis adeo intricata sunt, & miræ fabricæ, ut sedulo investiganti necdum patuerint benè.

1. Limonium; maritimum; majus. C. B. P. 192. M. H. 3. 600: *Limonium, majus, multis; aliis Beben rubrum. J. B. 3. App. 876. Valeriane rubræ similis, pro Limonio missa. Dod. p. 351.*

2. Limonium; maritimum; minus; oleæ folio. C. B. P. 192. *Limonium minus. J. B. 3. App. 877. Limonium, parvum, Narbonense. Lugd. 1025. H.*

3. Limonium; parvum; bellidis minoris folio. C. B. P. 192. *Limonium pumilum. Clus. H. LXXXI. H.*

4. Limonium; maritimum; minimum. C. B. P. 192. *Prodr. 99. J. B. 3. App. 877. Bocc. Rar. 25. H.*

5. Limonium; maximis, cæsiis, foliis glabris. T. 342. *An Limonium Orientale, flore minimo. T. C. 25? H.*

6. Limonium; Siculum; lignosum; gallas ferens & non ferens. Bocc. Rar. 33. H. R. D.

7. Limonium; peregrinum; foliis asplenii. C. B. P. 192. *Limonium Syriacum. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 8. Fig 1. Limonium quibusdam rarum. J. B. 3. App. 877. Limonium elegans. Rarwolf. Lugd. App. 35. b. H.*

8. Limonium; minus; annuum; bullatis foliis, vel echinoïdes. Bot. Monsp. 157. *Limonium, maritimum, annuum, foliis bullatis. H. R. Par. a.*

9. Limonium; Orientale; plantaginis folio; floribus umbellatis. T. Cor. 25. H.

10. Limonium; maritimum; majus; alterum; serotinum; Narbonense. H. R. Par. H.

11. Limonium; folio amplissimo. Vaill. H.

12. Limonium; Lusitanicum; auriculæ urfi folio. T. 342. H.

13. Limonium; Lusitanicum; foliis lanceolatis. T. 342. H.

14. Li-

14. Limonium; minus; bellidis folio; flagellis foeniculaceis. *Bocc. Mus. 2. 143. Tab. 103.*

Hæc quoque familia argumentum præbet ut ab habitu ipso sæpe tessera affinitatis petatur.

PLUMBAGO. T. 140. 58.

Radix fibrosa, crassa, carnosæ, fervida, perennis.

Folia alterna, integra.

Finis pedunculi brevis explicatur in calicem, tubiformem, monophyllum, quinquesidum, valde hispidum; in centro calicis ovarium, tubâ suâ instructum.

Ovarii apici innascitur flos monopetalus, tubo longo constans, superius in orbem explicato, ut jasmini florem referat, in spicas digestus.

Semen oblongum acuminatum.

1. Plumbago quorundam. *Clus. H. cxxiii. M. H. 3. 599. Lepidium dentillaria dictum. C. B. P. 97. Dentillaria Rondeletii. J. B. 941. Tripodium Dioscoridis. Col. 1. 160.*

2. Plumbago; Ceylanensis; folio splendente ocymastri; flore lacteo. *Lychnis, Indica, spicata, ocymastri foliis, fructibus oblongis, lapaceis, radice urente. H. A. 2. 169. H.*

P. 2. Tale p. 111

JALAPA. T. 129. 50.

Radix crassa, carnosæ, longa, succulenta, perennis.

Folia conjugata solani.

Rami & caules geniculati.

Calix tubæ similis, monophyllus, quinquesidus; intra quem

Flos monopetalos, infundibuliformis, leviter quinquesidus, ovario insistent.

Ovarium in centro calicis latens, instructum tubâ longâ apice orbiculari donatâ, fit

Fructus oblongus, pentagonus, umbilicatus, farinaceum nucleum continens.

1. Jalapa; flore flavo. T. 129. *Mirabilis Peruviana, flavo flore. H. L. Clus. H. xc. Solanum Mexiocanum, flore magno flavo. C. B. P. 168. Mirabilis Peruana. Pison. 208. Jasminum Indicum, flavo flore, rubris*

lic var

icum, seu flos mirabilis Peruanus. manum. M. H. 3. 598. R. s.

2. Ja-

78 GYMNOMONOSPERMAE FLORE SIMPLICI.

2. Jalapa; flore purpureo. T. 129. *Mirabilis Peruviana*, purpureo flore. H. L. *Admirabilis Peruana*, rubro flore. Chuf. H. LXXXIX. *Solanum Mexiocanum*, flore magno kermefino. C. B. P. Var. 168. *Jasminum Mexicanum*, sive flos Mexicanus multis. J. B. 2. 814. *Aizoyatl*, vel *mirabilis Mexicana*. Hernand. 176. *Viola Peruviana*. Tab. Ic. 315. R. s.
3. Jalapa; flore ex luteo, albo, & rubro, misto. T. 129. *Mirabilis Peruviana*, flore ex rubro, luteo, & albo, tam virgatim, quam punctatim misto. H. L. *Jasminum Indicum*, flore rubro, albo, variegato in eadem plantâ. H. Eyst. Aut. o. 2. F. 3. Fig. 1. R. s.
4. Jalapa; parvo flore. T. 130. *Mirabilis Peruviana*, parvo flore. H. L. *Mirabilis Peruviana*, minor. Mant. H. 213. *Solanum Mexiocanum*, flore parvo. C. B. P. 168. *Solanum Mexiocanum*, *jasminum Indicum* dictum, flore minore. C. B. Prodr. 91. Descr. R. s.
5. Jalapa; officinarum; fructu rugoso. T. 130. R. s.
6. Jalapa; flore ex albo & rubro elegantissimè variegato. R. s.

CIRCEA. T. 301. 155.

Radix fibrosa, repens, perennis.

Folia alterna, integra, solani.

Calix bifolius, caducus, innatus margini ovarii.

Flos dipetalos, caducus, binis staminibus præditus, in spicam digestus.

Finis pedunculi abit in ovarium ex rotundo ovatum, superius instructum placentulâ & tubâ longâ, sit fructus pyriformis, lappaceus, bilocularis, siccus, fœtus duobus seminibus oblongis.

1. *Circeæ*; Luteiana. Lob. Ic. 266. *Circeæ*. H. Eyst. Æst. o. 3. F. 7. Fig. 1. *Solanifolia Circeæ* dicta, major. C. B. P. 168. M. H. 2. 617. *Ocymastrum verrucarium*. J. B. 2. 977. †. co.
2. *Circeæ*; minima. Col. 2. 79. 80. *Solanifolia Circeæ*, Alpina. C. B. P. 168. M. H. 2. 617. co.

AGRIMONIA. T. 301. 155.

Radix fibrosa, perennis.

Folia alterna, pinnata, rugosa, hirsuta.

Finis pedunculi dat foliolum longum, tum ei innascitur calix monophyllus, quinquefidus, qui condit ovarium, oblongum, sulcatum, in margine superiore instructum multis, acutis pinnulis, coronæ instar positus, expansisque, & duabus ti

dein margo superior ovarii explicatur in calicem quinquefidum, stellatum; intra quem

Flos rosaceus, pentapetalos vel hexapetalos, in spicam congestus, quindecim staminibus præditus.

Ovarium fit fructus oblongus, echinatus, lappaceus, siccus, gemino nucleo fœtus.

1. Agrimonia; odorata. Camer. Hort. Eupatorium maximè odoratum. M. H. 2. 615. Eupatorium odoratum. C. B. P. 321. †.

2. Agrimonia; officinarum. T. 301. Eupatorium Veterum, sive Agrimonia inodora, vel minus odora. M. H. 2. 614. Agrimonia, seu Eupatorium. J. B. 2. 398. Eupatorium Veterum, sive Agrimonia. C. B. P. 321. Dod. p. 28. †.

3. Agrimonia; Orientalis; humilis; radice crassissimâ repente; fructu in spicam brevem & densam congesto. T. Cor.

4. Agrimonia; minor; flore albo. H. C.

AGRIMONIOIDES. T. 301. 155.

Radix, folia, flos, totusque habitus, agrimonie.

Finis pedunculi gerit foliolum trifidum, dein explicatur in calicem tubulosum, mollem, decem longis, gracilibus, segmentis constantem.

Ex centro fundi calicis ovarium nascitur oblongum, cujus margo suprema coronatur alio calice tubuloso, monopetalo, quinquefido, quinque longis foliolis donato, ipsique ovarii apici placentæ fungosa insidet.

Flos pentapetalus, rosaceus; petalis natis ex interiore, inferiore, parte calicis supremi; ex placentulâ ovarii suprema quinque stamina; ex medio placentulæ ejusdem duæ tubæ.

Ovarium maturum fit semen unum, villosum, apice coronato.

1. Agrimonioides. Col. 1. 145. Agrimonie similis. C. B. P. 321.

GYMNOMONOSPERMÆ FLORE COMPOSITO.

His flos plantæ constat ex minoribus flosculis, petalorum munere fungentibus, atque uno communi calice sustinetur; singuli verò flosculorum monopetali, suo quique proprio ovario innati, propria stamina, proprium pistillum habent; atque unicuique horum suum, idque unum, semen succedit.

Omnes hæ ordinari queunt in binas lineas: quarum prior habet omnes flosculos illos parvos, monopetalos, infra tubulum referentes, qui versus superiora porrigitur in lamellam planam, Malp. An. Pl. 45. 153. Unde Planipetalæ Rajo, Semiflosculosæ Tournefortio, Irregularibus flosculis compositæ Rivino, appellantur: hi verò flosculi aliquando exiguis foliolis interpositis distinguuntur. Altera verò linea continet flores compositos ex flosculis monopetalis, totis tubos ad superiora plerunque quinquesidos referentibus, qui in speciem stellæ expanduntur. Hæ Discifloræ vocantur Rajo.

Cunctis stamina enata ex interiore tubo floris, tubam petentia coalescunt in tubum, orâ supremâ gerentem quinque testiculos. Vaill. 3. 12. Malp. An. Pl. 51. 207.

Gymnomonospermæ Planipetalæ. 1. Lactescentes & Pappescentes.

His calix expanditur ex fastigio pedunculi monophyllus, multifidus.

Apex pedunculi, intra calicem, format discum gibbum callosum, multis foveolis pertusum, officio placentæ

GYMNOMONOSPERMAE FLORE PLANIPETALO. 81

Inferior pars ovarii, commissa foveolæ disci, eâ fulcitur, aliturque, usque in maturitatem, quâ laxatâ foveâ, extremâque suâ parte contractâ, excutitur ovarium.

Ovarium quodque, oblongum, in fastigio suo gerit pedunculum arctiorem; cujus margo suprema, orbicularis, capillamento tenui, sericeo, coronatur; intra hanc coronam (pappum vocant) apex ejusdem pedunculi fit placentula, orbicularis, fungosa, pinguis, ex centro suo emittens tubam, longam, apice bifido, segmentis extrorsum recurvatis, scabris, eminentem extra flosculi suprema.

Flosculi innati apici ovarii, intra pappum, quo ut calice inferius ambiuntur, sunt inferiori parte, internâ, tubulosâ, emittentes quinque stamina, quæ ex ambitu interno flosculi tubam ovarii petentia, uniuntur, in unum tubum concresecunt, orâ supremâ gerentem quinque testiculos parvos.

Semen, excusso flore emarcido, & tubâ, producit in longum pedunculum pappigerum, simulque eum reddit graciliorum, tumque cirrhus pappi explicans, fit ventis portatile; in aliis autem, defectu talis pedunculi, manet pappus limbo supremo seminis accretus. Malp. 51. 207. 72. 294. 295.

LACTUCA. T. 473. 267.

Radix fere semper fibrosa, annua in plerisque.

Folia alterna, lævia.

Rami velut umbellati.

Calix squamosus, oblongus, tenuis.

Semina oblonga, depressa, utrinque acuminata.

1. Lactuca; sylvestris; costâ spinosâ. C. B. P. 123. Lactuca sylvestris, sive Endivia multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso. J. B. 2. 1003. Lactuca sylvestris. Dod. p. 646. Lactuca sylvestris, laciniata. M. H. 3. 58. a. †.

2. Lactuca; sylvestris; Italica; costâ spinosâ; sanguineis maculis adpersa. Par. Bat. a.

3. Lactuca; altissima; folio sonchi laciniato; flore parvo cæruleo. Ind. 21. An Lactuca, Canadensis, altissima, sonchi folio. Par. Bat. App.? Lactuca Canadensis, altissima, latifolia, flore leucophæo. T. 474. ut monuit Vaill. a.

4. Lactuca; sylvestris; odore viroso. C. B. P. 123. Lactuca sylvestris, odore vehementi soporifero & viroso. M. H. 3. 58. Lactuca succo viroso. J. B. 2. 1002. Lactuca agrestis, scar-

82 GYMNOMONOSPERMAE FLORE PLANIPETALO.

riolæ hortensis folio, lactuæ flore, opti odore vehementi soporifero & viroso.
Lob. Adv. 89. a.

5. *Lactuca; sylvestris; folio ad latera spinoso. a.*

6. *Lactuca; sativa. C. B. P. 122. M. H. 3. 57. Lactuca sativa, vulgaris, non capitata. J. B. 2. 997. Lactuca sativa, folio scariolæ. Lob. Adv. 89. Obs. 121. a.*

7. *Lactuca; foliis endiviæ. C. B. P. 122. M. H. 3. 57. a.*

8. *Lactuca; maxima; Austriaca; capitata; variegata; caryophyllacea vulgô. H. L. a.*

9. *Lactuca; Romana; longa; dulcis. J. B. 2. 998. Lactuca, folio obscurius virente, semine nigro. C. B. P. 123. M. H. 3. 57. Lactuca, folio obscurius virente. Dod. p. 644. Lactuca, Romana, dulcior, nigriore & scariolæ hortensis folio, semine nigro. Lob. Adv. 90. a.*

10. *Lactuca; crispa; laciniata. J. B. 2. 999. Lactuca, crispa. C. B. P. 123. Lactuca, crispa, non capitata. Lob. Adv. 90. a.*

11. *Lactuca; crispa; altera. C. B. P. 123. Lactuca, crispa, & tenuiter dissecta. J. B. 2. 999. a.*

12. *Lactuca; capitata. C. B. P. 123. Lactuca, sativa, sive sessilis, capitata. Lob. Ic. 242. Lactuca, sativa, vulgaris, capitata. J. B. 2. 997. a.*

13. *Lactuca; capitata; maxima; obscurè virens. H. A. 12°. a.*

14. *Lactuca; crispa; magis laciniata; semine nigro. K. a.*

15. *Lactuca; capitata; præcox. K. a.*

16. *Lactuca; capitata; præcox; rubra. K. a.*

17. *Lactuca; capitata; præcox; viridis, vertice rubente, maculis rubris adpersa. K. a.*

18. *Lactuca; capitata; foliis magis rugosis. K. a.*

19. *Lactuca; capitata; major; arctè clausa. K. a.*

20. *Lactuca; capitata; major; arctè clausa; foliis primò punctis nigris, postea marginibus rubris notatis. K. a.*

21. *Eadem (20.); minor. K. a.*

22. *Lactuca; capitata; major; Germanica. K. a.*

23. *Lactuca; capitata; major; Germanica; viridis. K. a.*

24. *Lactuca; capitata; major; Germanica; fusca. K. a.*

25. *Lactuca; capitata; maxima; costis subluteis. K. a.*

26. *Lactuca; capitata; rubra. K. a.*

27. *Lactuca; capitata; ex rubro variegata. K. a.*

28. *Lactuca; capitata; crispa. H. A. 12°. a.*

29. *Lactuca; capitata; crispa; viridis. K. a.*

30. *Lactuca; capitata; crispa; viridis; minor. K. a.*

31. *Lactuca; capitata; crispa; variegata. K. a.*

32. *Lactuca; capitata; crispa; variegata; major. K. a.*

33. *Lactuca; capitata; crispa; maxima; alba. K. a.*

34. *Lactuca; capitata; crispa; maxima; viridis diviæ. K. a.*

GYMNOMONOSPERMAE FLORE PLANIPETALO. 8;

35. Lactuca; capitata; major; foliis rugosis & contortis. *K. a.*
36. Lactuca; capitata; omnium maxima; verrucosa. *K. a.*
37. Lactuca; Romana; longa; lutescens. *K. a.*
38. Lactuca; Romana; longa; fusca. *K. a.*
39. Lactuca; Romana; longa; fusca; altera. *K. a.*
40. Lactuca; Hungarica; virens; semine rufo. *K. a.*
41. Lactuca; omnium maxima; maculosa; capite oblongo. *K. a.*
42. Eadem (41.); semine nigro. *K. a.*
43. Eadem (41.); semine albo. *K. a.*
44. Lactuca; omnium maxima; maculosa; plana; fusca; semine nigro. *K. a.*
45. Lactuca; Suevica; oblonga. *K. a.*
46. Lactuca; Suevica; oblonga; virens. *K. a.*
47. Lactuca; Suevica; oblonga; hypocateriformis. *K. a.*
48. Lactuca; oblonga; foliis eleganter marmoreis. *K. a.*
49. Lactuca; sativa; foliis viridioribus. *K. a.*
50. Lactuca; nonnihil crispa; foliis obscuris; semine nigro. *K. a.*
51. Lactuca; capitata; præcox; infra germinans. *K. a.*
52. Lactuca; folio oblongo, acuto. *C. B. Prodr. 60. Lactuca, longo, & valde angusto, folio. J. B. 2. 999. a.*
53. Lactuca; Smyrnenfis; radice rapæ. *Sher. a.*
54. Lactuca; Cretica; flore pulchro. *T. Cor. 35. H.*
55. Lactuca; Canadensis; angustifolia; flore pallidè luteo. *T. 474. a.*

CHONDRILLA. *C. B. P. 130. vel Lactuca perennis.*

Radix perennis.

Folia tenuissimè laciniata.

1. Chondrilla; cærulea; altera; cichorei sylvestris folio. *C. B. P. 130. Chondrilla, vel Chondrilla, cærulea. J. B. 2. 1019. Chondrilla, altera. Dod. p. 637. Lactuca, perennis, humilior, flore cæruleo. T. 473. Lactuca, sylvestris, majore flore cæruleo. Flor. 2. 26.*
2. Chondrilla; altera; cichorei sylvestris folio; flore albo. *C. B. P. 130. Lactuca, perennis, humilis, flore albo. T. 474.*
3. Chondrilla; altera; cichorei sylvestris folio; flore carneo. *Lactuca, sylvestris, majore flore incarnato. Flor. 2. 26. Chondrilla, latifolia, laciniata, flore incarnato. H. L.*
4. Chondrilla; cærulea; laciniata; latifolia. *C. B. P. 130. Lactuca, perennis, humilior, dentata. Nissole.*

+

CHONDRILLA. T. 475. 268.

*Semina oblonga, angusta.**Calix veluti tubulatus ac cylindricus.*

1. Chondrilla; sonchi folio; flore luteo-pallescente. T. 475. *Sonchus*, *levis*, *laciniatus*, *muralis*, *parvis floribus*. C. B. P. 124. *Lactuca*, *sylvestris*, *murorum*, *flore luteo*. J. B. 2. 1004. Flor. 2. 26. a. †.

2. Chondrilla; sonchi folio; flore purpurascens; major. T. 475. *Lactuca*, *montana*, *purpureo-cerulea*, *major*. C. B. P. 123. *Lactuca*, *sylvatica*, *purpurea*. J. B. 2. 1005. Flor. 2. 26. *Sonchus*, *montanus*, *purpureus*, *τετραπέπλος*. Col. 1. 245. H.

3. Chondrilla; hieracii folio; annua. T. 475. *Hieracium*, *pulchrum*. J. B. 2. 1025. *Hieracium*, *montanum*, *alterum*, *λεπτομακρόκαυλον*. Col. 1. 248. a. b.

4. Chondrilla; juncea; viscosa; arvensis; quæ prima Dioscoridis. C. B. P. 130. T. 475. *Chondrilla*, *viminea*. J. B. 2. 1021. *Chondrilla*, *prima*, *Dioscoridis*. Col. Phytob. 9. 10. 11. H.

5. Chondrilla; viminea; viscosa; Monspeliaca. C. B. P. Prodr. 68. H.

+

CHONDRILLOIDES. Vaillant.

*Folia Chondrillæ C. B. P.**Caules valde ramosi.**Calix squamosus, cylindricus fere.*

1. Chondrilloides; perennis; lutea. Vaill.

+

SONCHUS. T. 474. 268.

*Caules teneri, fistulosi.**Capitula majora.**Calix delapsis floribus in conum contractus.**Semina vel parva, longa, angusta, vel majora sulcata, vel aspera quasi granulata.*

1. *Sonchus*; asper; arborescens. C. B. P. 124. Edit. 2. *Hieracium*, *arborescens*, *palustre*. C. B. P. 127. Edit. 1. *Sonchus*, *levior*, *Austriacus*, *V*, *altissimus*. Clus. H. CXLVII. *Sonchus paludosus*, *altissimus*, *hastato folio*. M. H. 3. 61. co.

2. *Sonchus*; repens; multis *hieracium* majus. J. B. 2. 1017. *Sonchus*, *asper*, *arborescens*, *hieracii facie*, *palustris*. H. L. *Hieracium*, *sonchites*, *majus*, *folio sonchi*, *vel hieracium sonchites*. C. B. P. 126. *Sonchus repens*, *major*, *caliculo hirsuto*, *inter segetes*. M. H. 3. 61. †

GYMNOMONOSPERMAE FLORE PLANIPETALO. 85

3. Sonchus; Niliacus; gigas. *Lippii. a.*
4. Sonchus; asper; non laciniatus. *C. B. P. 123. M. H. 3. 360. Sonchus, minus laciniatus, asperior sive spinosior. J. B. 2. 1014. Sonchus, ter-
tius, asperior. Dod. p. 643. a. †.*
5. Sonchus; asper; laciniatus, & non laciniatus. *C. B. P. 124. Son-
chus, minus laciniatus, mitior, sive minus spinosus, & asperior sive spi-
nosior. J. B. 2. 1014. a. †.*
6. Sonchus; lævis; laciniatus; latifolius. *C. B. P. 124. M. H. 3. 60. —
Sonchus, minus laciniatus, mitior, sive minus spinosus. J. B. 2. 1014.
Sonchus, lævis. Dod. p. 643. a. †.*
7. Sonchus; lævis; laciniatus; latifolius; flore niveo. *C. B. P. 124.
Var. a. †.*
8. Sonchus; muralis; cymis hirsutis. *H. C. Suppl. 3. a.*
9. Sonchus; angustifolius; maritimus. *C. B. Prodr. 61. M. H. 3. 61.*
10. Sonchus; asper; laciniatus; Creticus. *C. B. P. 124. Prodr. 60. Son-
chus, hieracii facie, semine recurvo. Flor. 2. 27. Hieracium, majus, folio
sonchi, semine incurvo. C. B. P. 127. Chondrilla Cretica nomine missa,
semine crispo. J. B. 2. 1022. Sonchus, laciniatus, Creticus, amarus, se-
mine curvo. M. H. 3. 61.*
11. Sonchus; Tingitanus; papaveris hortensis folio. *Flor. 2. 27.
Chondrilla Tingitana, floribus luteis, papaveris hortensis folio. H. L. 657.
Sonchus, Africanus, flore luteo amplo, fundo purpureo. M. H. 3. 60. a.*
12. Sonchus; lævis; angustifolius. *C. B. P. 124. Sonchus affinis,
Terracrepola. J. B. 2. 1018. Chondrillis quædam affinis, laciniata, an
Trinciarella. J. B. 2. 1021. Sonchus lævis, Matthioli. Lob. Ic. 236. Son-
chus Orientalis, folio lactuce, flore luteo, semine eleganter crenato. Ind. 23.
Hieracium annuum, foliis imis angustioribus, laciniatis, caulescentibus,
glaucis, & integris. M. H. 3. 67.*
13. Sonchus; chondrilloides; altissimus; folio oblongo, nitido;
flore luteo magno; radice repente. *co.*
14. Sonchus; lævis; in plurimas, & tenuissimas, lacinias divisus. *C.
B. P. 124. Prodr. 61. M. H. 3. 60. Chondrilla, lutea. J. B. 2. 1029. a.*
15. Sonchus; lævis; in plurimas, tenuissimas, angustissimasque, laci-
nias divisus. *Cimel. Reg. Vaill. a.*

HIERACIUM. T. 469. 267.

Caules ramosi, graciles, habitiores.

Folia alterna.

Calix densus, firmus, expansus.

Semina teretiuscula, angulosa, vel striata.

Totus habitus.

1. Hieracium; asperum; majori flore in limitibus agrorum. *J. B. 2.
1029. Cichorium montanum, angustifolium, hirsutie asperum. C. B. P.*

86 GYMNOMONOSPERMAE FLORE PLANIPETALO.

126. *Hieracium*, *hirsutum*, foliis caulem ambientibus. *H. L. Hieracium multis, aliis Cichoreum, luteum, hirsutum. J. B. 2. 1025. Hieracium, intybaceum, asperum. Tab. Ic. 184. b. †.*

2. *Hieracium*; *echioides*; capitulis cardui benedicti. *C. B. P. 128. Hieracium, capitulis cardui benedicti, maximum, buglossum echioides quibusdam. J. B. 2. 1028. Buglossum echioides, luteum, hieracio cognatum. Lob. Ic. 577. a.*

3. *Hieracium*; *Pyrenaicum*; *blattariae folio*; minus *hirsutum*. *Seb. Bot. & T. 472. H.*

4. *Hieracium*; *montanum*; folio *cichorei*; nostras. *Raj. Syn. 72.*

5. *IIII Hieracium Britannicum. Clus. H. cXL. a.*

5. *Hieracium*; *Oriente*; altissimum; foliis *cichorei sylvestris*; odore *castorei*; flore magno. *T. C. 35. a. Huic folia minus laciniata, quadruplo latiora, quam sequenti; flos triplo etiam minor, & longè altior est tota planta.*

6. *Hieracium*; *amygdalas amaras olens*; seu odore *Apuli suaverubentis. H. R. Par. T. 469. Hieracium, castorei odore Monspeliensium. Raj. Syn. 72. 3. Hieracium, cichorei vel potius stoebe folio, hirsutum. Raj. Cat. Cant. Hieracium, parvo flore luteo, Apuli flore suaverubenti odore æmulum. H. R. Blef. 271. Hieracium, foliis cichorei sylvestris villosis, odore castorei. Magn. 129. Ic. & Descr.*

7. *Hieracium*; *lanatum*; *sonchi vel erigerontis facie. H. L. Sonchus, villosus, luteus, major. C. B. P. 124. Sonchus, lanatus, Dalechampii. J. B. 2. 1026. Hoc flore luteo. a.*

8. *Idem (7.)*; flore *sulphureo. a.*

9. *Hieracium*; *medio-nigrum*; *Bæticum*; majus. *Par. Bat. 185. Ic. & Descr. Hieracium, barbatum, medio-nigrum. H. R. P. 87. a.*

10. *Hieracium*; *incanum*; *lanuginosum*; *ramosum*; *Lusitanicum. H. L. Hieracium, pulchrum, ramosum, Sprengerianum. J. B. 2. 1025. M. H. 3. 65.*

11. *Hieracium*; calice *barbato. Col. Ecphr. 2. 27. Hieracium, barbatum, medio-nigrum, minus. H. L. Hieracium, proliferum, falcatum. C. B. P. 128. Prodr. 64. xii. a.*

12. *Idem (11.)*; flore *albo. a.*

13. *Hieracium*; folio *chondrillæ*; caule *vimineo*, lævi. *Hieracium, folio chondrillæ glabro, radice simili succisæ, majus. C. B. P. 127. Hieracium, minus, præmorsâ radice, sive Fuchsi. J. B. 2. 1031. Hieracium minus, præmorsâ radice. Lob. Ic. 237. †.*

14. *Hieracium*; maximum; *chondrillæ folio*; asperum. *C. B. P. 127. Prodr. 64. vii.*

15. *Hieracium*; folio & facie *chondrillæ. Lob. Ic. 239. M. H. 3. 66. b.*

16. *Hieracium*; *Alpinum*; *latifolium*; flore magno. *C. B. P. 128. a.*

GYMNOMONOSPERMAE FLORE PLANIPETALO. 87

I Clusio, pilosellæ majori, sive pulmonariæ accedens, maculatum. J. B. 2. 1026. Hieracium, I latifolium. Clus. H. cxxxix.

17. Hieracium; folio dentis leonis; flore suaverubente. *C. B. P. 127. M. H. 3. 63. Hieracium, Apulum, flore suaverubente. Col. 1. 242. An & Chondrilla purpurascens fœtida. C. B. P. 130; Prodr. 65. & Chondrilla rubra fœtida. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 7. F. 1. a.*

18. Hieracium; dentis leonis obtuso folio; majus. *C. B. P. 127. Hieracium, macrocaulon, junceum, sive minus, primum Dodonæo. J. B. 2. 1031. Hieracium III. Dod. 639.*

19. Hieracium; minus; dentis leonis folio oblongo, glabro. *C. B. P. 127.*

20. Hieracium; intybaceum; latifolium; annuum; ramosius; capitulis rotundioribus hispidis. *Raj. H. 3. 138. 2. M. H. 3. 64. 6. Hieracium, medium, lactucæ folio villoso, pulmonariæ Gallicæ flore. H. C. 95. a.*

21. Hieracium; cichoroides; vesicarium. *Raj. H. 235. Hieracium pratense, vesicarium, cichorei folio. M. H. 3. 65. 21. Cichorium, sylvestre, vesicarium, pratense. Col. 1. 238. b.*

22. Hieracium; Sabaudum; altissimum; foliis latis, brevibus, crebrius nascentibus. *M. H. 3. 71.*

23. Hieracium; fruticosum; latifolium; hirsutum. *C. B. P. 129. Hieracii Sabaudi varietas prima, erinus quibusdam Matthioli dicta. J. B. 2. 1030. Hieracium, frutescens, latifolium, polyanthos. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 1. Fig. 2.*

24. Hieracium; fruticosum; latifolium; foliis dentatis; glabrum. *C. B. P. 129. Prodr. 67. 24. Hieracium, majus, latifolium, Pannonicum, II Clusii. J. B. 2. 1027. Hieracium, majus, latifolium, II Clus. H. cxl.*

25. Hieracium; fruticosum; hirsutum; foliis multo longioribus, angustioribus, parum dentatis, & molli lanugine pubescentibus. *C. B. P. 129. Var.*

26. Hieracium; fruticosum; angustifolium; majus. *C. B. P. 129. M. H. 3. 71. Hieracium, rectum, rigidum, quibusdam Sabaudum. J. B. 2. 1030. Hieracium primum. Dod. p. 638. Hieracii III genus alterum, angustifolium. Clus. H. cxl.*

27. Hieracium; fruticosum; angustissimo incano folio. *H. L. 316. Ic. & Descr. M. H. 3. 71. An Hieracium, Alpinum, angustissimo, oblongoque, folio. C. B. Prodr. 64. 8.*

28. Hieracium; folio caulem amplexo. *Triumfett.*

29. Hieracium; murorum; folio pilosissimo. *C. B. P. 129. Pilosella murorum, aliis pulmonaria, flore luteo. J. B. 2. 1033. Pulmonaria aurea. Tab. Ic. 194. Germ. 504. Pulmonaria Gallorum, h. 317. ad. 8. 253.*

30. Hieracium; laciniatum; minus pilosum. *C. B. P. 129. r. luteæ species, magis laciniata. J. B. semina. Tab. Ic. 195. Germ. 504.*

31. Hieracium;

90 GYMNONOSPERMAE FLORE PLANIPETALO.

Flosculi facile convoluti, ad solem explicati.

1. Tragopogon; alter; gramineo folio; suaverubens. *Col. 1. 232. Descr. 231. Ic. Tragopogon, foliis gramineis, hirsutis. C. B. P. 275. Tragopogon, Apulum, suaverubens. Park. M. H. 3. 80. 7. b.*
2. Tragopogon; flore obsoletè purpureo. *Flor. 2. 29. An Tragopogon, porri folio, dilutè ianthino flore. H. R. P? b.*
3. Tragopogon; pratense; luteum; minus. *M. H. R. Bles. b.*
4. Tragopogon; pratense; luteum; majus. *C. B. P. 274. Tragopogon, flore luteo. J. B. 2. 1058. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 13. Fig. 2. Tragopogon. Dod. p. 256. b.*
5. Tragopogon; luteum; foliis gramineis; caule purpurascente. *Rand. b.*
6. Tragopogon; purpuro-cæruleum; crocifolium. *C. B. P. 275. M. H. 3. 80. 8. Tragopogon, crocifolium, montanum, flore nigro purpureo. Col. 1. 230. b.*
7. Tragopogon; coronopi folio. *C. B. P. 274.*
8. Tragopogon; purpuro-cæruleum; porri folio; quod artifi vulgò. *C. B. P. 274. Barbula hirci, purpuro-cærulea. Tab. Ic. 599. Tragopogon, purpureum. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 13. Fig. 3. Gerontopogon, sive Jassifica Italarum. Lugd. 1079. b.*
9. Tragopogon; caule circa caput tumido. *Vaill. Tragopogon, flore luteo. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 13. F. 2. b.*

ZACINTHA. T. 476. 259.

Calix squamosus.

Ovarium sit capitulum striatum, in medio habens axin erectum, cui accrescunt multa ova, quæ matura deinde cum involucro decidunt, & quasi capsulæ sunt, in quibus hærent semina parva, pappis instructa.

1. Zacintha; sive Cichoreum verrucarium. *Matth. 505. Clus. H. cXLIIII. Cichorium verrucarium, sive Zacintha, hieraciis adnumerandum. J. B. 2. 1013. Chondrilla verrucaria, foliis cichorei viridibus. C. B. P. 130. Intybus, sive Endivia lutea, verrucaria. M. H. 3. 53. a.*

Gymnomonospermæ, planipetalæ. 2. Lactescentes non pappescentes.

SCOLYMUS. T. 480. 273.

Calix squamosus.

Ova à se mutuo separata per foliolum tenue, acutum.

GYMNOMONOSPERMAE FLORE PLANIPETALO. 91

Semen dein foliolo adhærens manet, ubi maturuit.
Habitus cardui.

1. Scolymus; chrysanthemus. C. B. P. 384. Spina lutea. J. B. 3. 84.
Carduus chrysanthemus. Dod. p. 725. Scolymus Theophrasti Hispanicus &
Narbonensis. Clus. H. CLIII. Cichorium, luteum, scolymoides, spinis
horridum, Narbonense. M. H. 3. 55. a.

2. Scolymus; chrysanthemus; annuus. A. R. Par. III. Bot. Monsp.
Scolymus Theophrasti, Narbonensis. Clus. H. CLIII. Cichorium luteum, sco-
lymoides, spinis horridum, Hispanicum, annuum. M. H. 3. 55. a.

CICHORIUM. T. 478. 272.

Flores è lateralibus caulis & ramorum in pediculis brevi-
bus. Malp. An. Pl. 51. 207.

Calix instar capsulae contractus.

In eo semina angulata, cuneiformia, umbilicata.

1. Annua.

1. Cichorium; latifolium; sive Endivia vulgaris. T. 479. *Intybus;*
sativa, latifolia, sive Endivia vulgaris. C. B. P. 125. M. H. 3. 53. In-
tybum sativum, latifolium. J. B. 2. 1011. Flore cæruleo. a.

2. Cichorium; latifolium; sive Endivia vulgaris; floribus candi-
dis. T. 479. a.

3. Cichorium; angustifolium; sive Endivia vulgaris. T. 479. *In-*
tybus sativa, angustifolia. C. B. P. 125. M. H. 3. 53. Intybum sativum,
angustifolium. J. B. 2. 1011. Flore cæruleo. a.

4. Cichorium; angustifolium; sive Endivia angustifolia; flore al-
bo. T. 479. a.

5. Cichorium; crispum. T. 479. *Intybus crispa. C. B. P. 125. M. H.*
3. 53. Intybum sativum, crispum. J. B. 2. 1011. Latifolium. a.

6. Cichorium; crispum; angustifolium. a.

7. Cichorium; spinosum; Creticum. C. B. Prodr. 62. *Cichorium*
spinosum. C. B. P. 126. J. B. 2. 1013. M. H. 3. 55. Chondrilla genus,
elegans, cæruleo flore. Clus. H. CXLV. b. H.

8. Cichorium; degener; ex semine Cretici. T. 479. a.

2. Perennia.

9. Cichorium; sylvestre; sive officinarum. C. B. P. 125. J. B. 2.
1007. M. H. 3. 55. *Cichorium sylvestre picris. Dod. p. 635. Flore cæru-*
leo, caule viridi. †

10. Cichorium; sylvestre; flore cæruleo; caule purpureo. †

11. Cichorium; sylvestre; flore albo. C. B. P. 126. †

12. Cichorium; sylvestre; flore roseo. C. B. P. 126. †

52 GYMNOMONOSPERMAE FLORE PLANIPETALO.

13. Cichorium; sylvestre; minus; folio magis laciniato; flore caeruleo tenuiter dissecto; Jamaicense; caule & nervo folii viridi.
 14. Cichorium; idem (13.); caule & nervo folii rubro.

CATANANCE. T. 478. 271.

Flosculi marginales mediis longiores.

Calix squamosus, colore argenteo.

Semen capitulo foliato, vel papposo, in ipso calice reconditum.

1. Catanance; quorundam. Lugd. 1190. Catanance, Dalechampii, flore cyani, folio coronopi. J. B. 3. 26. Chondrilla caerulea, cyani capitulis. C. B. P. 130. Chondrilla sesamoides dicta, flore completo. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 4. Fig. 2. Cichorium caeruleum, coronopi foliis angustis, caliculis squamatis, argenteis. M. H. 3. 55.

2. Catanance; flore luteo; latiore folio. T. 478. Stoebe plantaginis folio. Alp. Exot. 286. a.

3. Catanance; flore luteo; angustiore folio. T. 478. Stoebe plantaginis folio, angustifolia. H. Cath. a. a.

RHAGADIOLUS. T. 479. 272.

Calix constans ex foliis angustis, canaliculatis.

Foliola calicis, flore elapso, fiunt vaginae membranaceae, in stellam digestae, singulae continent unum semen.

1. Rhagadiolus; alter. Cæsalp. 511. Hieracium stellatum. J. B. 2. 1014. Raj. Meth. 31. Hieracium, siliqua falcata. C. B. P. 128. Intybus, sive Endivia lutea, humilis, stellato semine. M. H. 3. 53. a.

2. Rhagadiolus; lampfanæ foliis. T. C. 36. a.

HEDYPNOÏS. T. 478. 271.

Calix floris instar columnae striatae, sive melonis.

Foliola calicis, flore elapso, amplectuntur singula unum semen umbilicatum, in meditullio verò capituli alia semina nuda, capitulo instructa.

1. Hedypnoïs; annua. T. 478. Hieracium, capitulum inclinans, semine adunco. C. B. P. 128. Rhagadiolus. Cæsalp. Hieracium, florem inclinans. J. B. 2. 1032. Intybus, sive Endivia, lutea, capitulum inclinans, semine adunco, majus. M. H. 3. 53. a.

2. Hedypnoïs; minor; Cretica; annua. T. Cor. 36. a.

3. Re-

GYMNOMONOSPERMÆ FLORE PLANIPETALO. 93

3. Hedypnois; annua; capite maximo. *a.*
4. Hedypnois; quod cichorium; semine adunco; flore triplo majore; capitulis minoribus. *Ind. 27. a.*

HYOSERIS. *Raj. Meth. 31.*

Folia circa caulem sessilia.

Calix nutans, in conum contractus, in caule contorto.

Semina in disco plano digesta.

1. Hyoseris; angustifolia. *Tab. Ic. 180. Hieracium XI, minimum. Clus. H. CXLII. Hieracium, minus, folio dentis leonis oblongo, glabro. C. B. P. 127. T. 470. Hieracii parva species, hyoseris, angustifolia, aspera. J. B. 2. 1025. Intybus, sive Endivia lutea, minima, in arenosis nascens, caule nudo, sub capite fistuloso. M. H. 3. 53. a. †.*

LAMPSANA. *T. 479. 272.*

Calix monophyllus, profundè multifidus.

Capsula fit striata, fœta seminibus tenuibus, acutis.

1. Lampsana. *Dod. p. 675. J. B. 2. 1028. Soncho affinis, Lampsana domestica. C. B. P. 124. Intybus, sive Endivia, erecta, lutea, napifolia, Lampsana dicta. M. H. 3. 54. a. †.*
2. Lampsana; folio amplissimo, crispo. *Petiver. Hort. Ind. 2. a.*

GYMNOMONOSPERMÆ DISCIFLORÆ.

Hæ digeruntur in binas classes. Quarum prior complectitur Plantas, quarum flores discoidei quidem, ita tamen, ut ordo flosculorum exterior ex flosculis planipetalis constet, qui instar coronæ radiatæ cæteros disciflores amplectuntur. Vocantur Discoidei Radiati. Altera continet flores eosdem, sed ordine planipetalorum radiato carentes. Vocantur Discifloræ Nudæ.

GYMNOMONOSPERMAE, DISCIFLORAE, RADIATÆ.

Finis pedunculi format calicem, placentam, seriem exteriorem semiflosculorum, ovaria, & semina, ut in Planipetalis.

Intra hanc coronam planipetalam hærent alii flosculi hac lege: Ovarium oblongum foveolæ disci unitum, apice superiori gerit flosculum, monopetalum, cylindricum, fastigio quinquefido, stamina quinque, concreta in tubum, in apice gerunt testiculos fecundantes ovarii tubum, quam emittit centrum apicis ovarii bifidam, segmentis extrorsum recurvatis, quæ eminent extra tubulum floris. Malp. 53. 153. in omnibus figuris.

1. Papposæ.

Apicis ovarii margo se habet ratione pappi generandi, alendi, augendi, perficiendi, ut in Planipetalis.

ASTER. T. 481. 274.

Radix fibrosa.

Folia alterna, plerumque integra.

Caules ramosi.

Flos radiatus, speciosus, in calice squamoso, expanso.

1. Aster; omnium maximus; helenium dictus. T. 483. *Helenium vulgare.* C. B. P. 276. *Helenium, sive Enula campana.* J. B. 3. 108. *Helenium.* Dod. p. 344. H. Eyst. Aut. o. 2. F. 5. Fig. 1. M. H. 3. 127. †.

2. Aster; Americanus; latifolius; puniceis caulibus. H. L. M. H. 3. 120. *Aster, serotinus, ramosus, alter, flore purpurascens.* H. R. Par.

3. Aster; novæ Angliæ; altissimus; hirsutus; floribus maximis, purpureo-violaceis. Par. Bat. Prodr. *Aster, novæ Angliæ, hirsutus, floribus majoribus, saturatè violaceis.* S. B. Par.

4. Aster; novæ Angliæ; latifolius; paniculatus; floribus saturatè violaceis. H. L. M. H. 3. 120.

5. Aster; novæ Angliæ; umbellatus; floribus dilutè violaceis. H. L. M. H. 3. 120.

6. Aster; novæ Angliæ; umbellatus; floribus cæruleis. Var. 5. Ind. 28.

7. Aster; novæ Angliæ; purpureus; virgæ aureæ facie; foliis undulatis. Flor. 2. 31. *Aster, novæ Angliæ, tripolii floribus in spici*

gis dispositis. *Par. Bat. Prodr. Aster Virginianus, comosus, foliis latioribus, & flosculis minimis, cæruleis. M. H. 3. 120.*

8. *Aster; novæ Angliæ; linariæ folio; chamæmeli flore. Par. Bat. Prodr. Aster, Americanus, multiflorus, flore albo bellidis, disco luteo. D. de flines. S. B. Par. M. H. 3. 121. Virga aurea, Canadensis, humilior, folio linariæ. T. 485.*

9. *Aster; Americanus; latis & crenatis foliis; floribus parvis, purpurascens. H. L. Flor. 2. 31. Asteriscus, latifolius, autumnalis. Corn. 4.*

10. *Aster; Virginianus; serotinus; parvo, albente, flore. Park. Aster Virginianus, ramosissimus, serotinus, parvis floribus albis, Tradescanti. M. H. 3. 121.*

11. *Aster; cæruleus; serotinus; fruticescens; Tradescanti. Raj. H. 269.*

12. *Aster; maritimus; purpureus; tripolium dictus. Raj. H. 270. Aster cæruleus, glaber, littoreus, pinguis, tripolium dictus. M. H. 3. 121. Tripolium, majus, cæruleum. C. B. P. 267. J. B. 2. 1064. Dod. p. 379. Tripolium, vulgare. H. Eyst. Æst. o. 10. F. 5. Fig. 1. Aster, maritimus, palustris, cæruleus, salicis folio. T. 481. a. †. aq.*

13. *Aster; maritimus; palustris; albus; minor. T. 482. Aster, maritimus, tripolium dictus, flore albo. H. Amst. in 12. †. a. aq.*

14. *Aster; maritimus; flavus; crithmum chrysanthemum dictus; folio tereti, crasso, in summo tricuspidato. Flor. 1. 23. H. L. Aster, maritimus, flavus, crithmum chrysanthemum dictus, folio tricuspidato. H. L. Flor. 2. 31. Crithmum, maritimum, flore Asteris Attici. C. B. P. 288. Crithmum, maritimum, tertium Matthiolo, flore luteo buphthalmi. J. B. 3. 26. 106. Crithmum chrysanthemum. Dod. p. 706. Aster littoreus, luteus, folio angusto, spisso, ad extremitatem trifido. M. H. 3. 119. H. R. D.*

15. *Aster; maritimus; flavus; folio in summo obtuso. H. L. Flor. 1. 23. Aster, maritimus, flavus, crithmum chrysanthemum dictus, folio obtuso. H. L. Flor. 2. 31. H. R. D.*

16. *Aster; Atticus; cæruleus; vulgaris. C. B. P. 267. M. H. 3. 119. Aster, Atticus, cæruleo flore. J. B. 2. 1044. Aster Atticus. Dod. p. 266. Aster, Atticus, major, flore cæruleo. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 12. Fig. 3. Aster, VIII Italorum & Fuchsi. Clus. H. xvi.*

17. *Aster; hirsutus; Austriacus; cæruleo, magno, flore; foliis subrotundis. C. B. P. 267. M. H. 3. 118. Aster, hirsutus, Austriacus, cæruleo, magno, flore. C. B. Prodr. 124.*

18. *Aster; Pyrenæicus; præcox; flore cæruleo, majore. Dod. Mem. b.*

19. *Aster; latifolius; tripolii flore. H. R. Par. M. H. Bloes. M. H. 3. 121.*

20. *Aster; tripolii flore. C. B. P. 267. M. H. 3. 120. Aster, Atticus, Monspelienfis, purpureus, angustioribus foliis. J. B. 2. 1045. Aster,*
mi-

minor, Narbonensium, tripolii flore, linariae folio. Lob. Ic. 349.

21. Aster; tripolii flore; angustissimo, & tenuissimo, folio. *Flor. 1. 23. M. H. 3. 121.*

22. Aster; montanus; cæruleus; omnium minimus. *H. R. Par. Aster, Montis Juræ. C. B. P. 267. b.*

23. Aster; conyzoides; odoratus; luteus. *H. Eyst. Æst. o. 5. F. 8. Fig. 3. M. H. 3. 118. Conyza minor. H. Eyst. lb.*

24. Aster; luteus; salicis folio hirsuto. *C. B. P. 266. Aster, V Clus. H. xiiii. M. H. 3. 118.*

25. Aster; montanus; luteus; salicis folio glabro. *C. B. P. 266. M. H. 3. 118. Aster, IIII, Austriacus, II Clus. H. xiiii. Conyza, media, Monspeliensis, quibusdam Asteris Attici genus, folio glabro, rigido. J. B. 2. 1049. Bubonium, luteum. Tab. Ic. 337.*

26. Aster; Pannonicus; lanuginosus; luteus. *T. 482. Conyza, Pannonica, lanuginosa. C. B. P. 265. Aster, montanus, hirsutus, magno flore, sive oculo Christi similis, si non idem, sive conyza tertia, Clusii. J. B. 2. 1047. Conyza, III, Austriaca. Clus. H. xx.*

27. Aster; Africanus; frutescens; foliis angustis, & plerumque conjunctis. *H. A. 2. 53. H. R. D.*

28. Aster; folio lepidii; flore magno; caule tomentoso. *H.*

29. Aster; saxatilis; foliis glutinosis, villosis, & graveolentibus. *T. 483. Conyza, montana, foliis glutinosis, pilosis. C. B. P. 265. Conyza, montana, Myconi, folio byssopi vulgaris villosa. J. B. 2. 1054. Conyza, montana. Lugd. 1201.*

30. Aster; qui Asteri montano similis purpureo, vel globulariæ. *J. B. 2. 1047. H.*

ASTEROIDES. T. C. 51.

Omnia ut asteri, sed semina non papposa.

Asteroides; Alpina; salicis folio. *T. C. 51. Aster luteus, angustifolius. C. B. P. 266.*

VIRGA AUREA. T. 483. 275.

Radix fibrosa.

Folia alterna, integra.

Calix squamosus.

Flos longâ serie in caulium & ramorum fastigio nascens instar virgæ, minor quam Asteris, & in pedunculis brevioribus, plerumque aureus.

1. Virga aurea; folio amplissimo
nadenfis, latissimo folio, glabro. *T.*

2. Virga aurea; montana; latiore folio, glabro. *H. R. Par.* 186. *Virga aurea, foliis scrophulariæ. Ac. Reg. Par. M. H.* 3. 124. *Virga aurea, montana, foliis scrophulariæ. Plukn. Phyt.* 235.
3. Virga aurea; annua. *Zanon.* 205. *T.* 484. *Conyza Canadensis, annua, acris, alba, folio linariæ. Bocc.* 86. *Aster Canadensis, annuus, flore papposo. H. R. Par.* Hæc sola flores albos gerit inter omnes.
4. Virga aurea; Canadensis; hirsuta; paniculâ minus speciosâ. *H. R. Par. Virga aurea, flore minus amplo, foliis non serratis, latioribus. M. H.* 3. 125.
5. Virga aurea; novæ Angliæ; altissima; paniculis nonnunquam reflexis. *Flor.* 2. 34.
6. Virga aurea; angustifolia; paniculâ speciosâ; Canadensis. *H. R. Par. M. H.* 3. 125. *Virga aurea, foliis angustis, lævibus, nihil aut minus crenatis. Flor.* 2. 35. *Virga aurea, foliis angustis, lævibus, non serratis. Junq. Hort.*
7. Virga aurea; novæ Angliæ; foliis longissimis, glabris. *Flor.* 2. 35.
8. Virga aurea; foliis angustis, lævibus, non serratis; paniculâ speciosâ; floribus magnis.
9. Virga aurea; Noveboracensis; glabra; caulibus rubentibus; foliis angustis, glabris. *Flor.* 1. 26.
10. Virga aurea; angustifolia; minus ferrata. *C. B. P.* 268. *Virga aurea, vulgaris, latifolia. J. B.* 2. 1062. *Virga aurea. Dod. p.* 142. *M. H.* 3. 124. *Virga aurea, & virga aurea foliis minus serratis. H. Eyst. Æst.* 6. 10. *F. 6. Fig. 2. Virga aurea, vulgaris, & officinarum, foliis primum erumpentibus prunellæ. Flor.* 2. 35.
11. Virga aurea; Mexicana. *C. B. P. App.* 517. *Virga aurea, limonii folio, paniculâ uno versu dispositâ. H. R. Par.*
12. Virga aurea; folio hirsuto falicis rarô & levissimè serrato; caulibus atropurpureis.
13. Virga aurea; major; foliis glutinosis & graveolentibus. *T.* 484. *Conyza, mas, Theophrasti, major Dioscoridis. C. B. P.* 265. *Conyza, major, Monspeliensis, odorata. J. B.* 2. 1053. *Conyza major. Dod. p.* 51.
14. Virga aurea; omnium minima. *H. R. Par. Virga aurea, humilis, foliis non serratis, acutioribus. M. H.* 3. 125. *Virga aurea, omnium minima, floribus maximis. Par. Bat.* Huic uni flores non digesti in virgas, sed ferè umbellæ specie.

DORIA. *Raj. Meth.* 33.

Radix fibrosa, perennis.
Folia ferè integra, oblonga.
Culmi teretibus, ubi formâ.

N

Flo-

Flores in summitate plantæ in umbellæ paniculatæ speciem laxius dispositi.

1. Doria; Narbonensium. *H. Eyst. Vern. o. 9. F. 8. F. 2. Virga aurea, major, vel Doria. C. B. P. 286. Alisma Monspeliensium, sive Doria. J. B. 2. 1064. Virga aurea, major, carnosus & succulentis foliis ad caulem latis M. H. 3. 123. Jacobæa pratensis, altissima, folio limonii. T. 485.*

2. Doria; quæ Jacobæa; foliis integris & mucronatis. *M. H. 3. 110. Jacobæa palustris, altissima, foliis serratis. T. 485. Virgæ aureæ sive solidagini angustifoliæ affinis, lingua avis Dalechampi. J. B. 2. 1064. Lingua major. Lugd. 1037. Conyza palustris, serratifolia. C. B. P. 266.*

3. Doria; quæ Jacobæa; Alpina; foliis longioribus serratis. *T. 485. Virga aurea, angustifolia, serrata, sive solidago Saracenica. J. B. 2. 1063. M. H. 3. 124. Virga aurea, angustifolia, serrata. C. B. P. 268. Consolida Saracenica. H. Eyst. Æst. o. 10. F. 6. F. 1.*

4. Doria; quæ Jacobæa; Orientalis; limonii folio. *T. C. 36. H. R. D.*

5. Doria; Americana; lato, rigido folio. *Virga aurea, novæ Angliæ, lato, rigidoque folio. Par. Bat. M. H. 3. 125. Virga aurea, ex novâ York, foliis symphyti majoris, hirsutis. Sc. Bot. Par. 1. H.*

6. Doria; quæ Jacobæa; Africana; frutescens; folio rigido & hirsuto; major. *H. A. 2. 149. H. R. D.*

7. Doria; Africana; arborecens; crassis & succulentis foliis, atriplicem referentibus. *H. R. D.*

8. Doria; quæ Jacobæa; Africana; frutescens; crassis & succulentis foliis. *H. A. 2. 147. H. R. D.*

9. Doria; quæ Jacobæa; Africana; hederæ terrestri folio; repens. *H. A. 2. 145. H. R. D.*

10. Doria; quæ Jacobæa; Africana; frutescens; coronopi folio. *H. A. 2. 139. H. R. D.*

11. Doria; quæ Jacobæa; Alpina; foliis rotundis, serratis. *C. B. Pr. 66. M. H. 3. 110. Jacobæa Alpina, foliis subrotundis, serratis. C. B. P. 141. T. 485. Conyza Alpina. J. B. 2. 1055.*

12. Doria; Alpina; foliis subrotundis; pedunculo folioso.

13. Doria; quæ Jacobæa; Hispanica; folio rosmarini. *T. 486. Jacobæa, folio crithmi littorei M. H. Blæs. M. H. 3. 111. Jacobæa, lini folio, Hispanica, & Italica. Bocc. Mus. p. 2. T. 49. a.*

14. Doria; quæ Jacobæa; latifolia; palustris; sive aquatica. *Raj. Syn. 82. Raj. H. 285.*

15. Doria; quæ Jacobæa; lacus Agnani; facie senecionis; odore fœnieuli. *a.*





JACOBAEA : arvensis : folio betryes .

A. radix capillata . B. folia . C. flos nativâ magnitudine . D. florum dissepiti umbellam affectus .

JACOBÆA. *Raj. Meth.* 33.*Folia laciniata satis profundè.**Calix ut Doriæ.*

1. Jacobæa; Africana; frutescens; foliis incisis & subtus cineraceis. *Comm. Rar.* 42. a.
2. Jacobæa; Afra; facie Jacobææ Pannonicæ *I Clusii.* a.
3. Jacobæa; Afra; folio botryos. *H.*
4. Jacobæa; Africana; frutescens; flore amplo, purpureo, elegantissimo; senecionis folio. *Volk. Fl. Nor. Aster Africanus, frutescens, foliis senecionis crassioribus. H. A. 2. 61. a.*
5. Jacobæa; Africana; frutescens; foliis absinthii umbelliferi incanis. *H. A. 2. 137. H.*
6. Jacobæa; Ægyptia; folio glauco coronopi. *Lippii.* a.
7. Jacobæa; maritima. *C. B. P.* 131. *Jacobæa marina, sive cineraria. J. B. 2. 1058. Cineraria. Dod. p. 642. Achaovan. Abiat. Alp. Ægypt. 37. Jacobæa fruticosior, foliis utrinque candicantibus. M. H. 3. 109. & ut videtur, cineraria marina. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 9. F. 2. H. R. D.*
8. Jacobæa; maritima; latifolia. *C. B. Pr.* 66. *C. B. P.* 131. *M. H. 3. 108. H. R. D.*
9. Jacobæa; ex semine maritimæ degener. *H. R. Par. Jacobæa maritima, folio integro, serrato, viridi. Ind. 31. H. R. D.*
10. Jacobæa; vulgaris; laciniata. *C. B. P.* 131. *M. H. 3. 108. Jacobæa vulgaris. J. B. 2. 1057. Jacobæa. Dod. p. 642. a. b. †.*
11. Jacobæa; Sicula; facie chrysanthemi. *Bocc. Rar.* 66. *M. H. 3. 109. Folio glauco. a.*
12. Jacobæa; Sicula; facie chrysanthemi. *Bocc. Rar.* 66. *Folio viridi. a.*
13. Jacobæa; Pannonica; *I Clus. H. xx1, Senecio incanus, pinguis. C. B. P.* 131. *Senecio hirsutus, viscidus, major, odoratus. J. B. 2. 1042. Erigeron tomentosum, alterum. Lob. Ic. 226. a. †.*
14. Jacobæa; Græca; maritima; foliis supernè virentibus, infrà incanis. *T. C. 36. H.*
15. Jacobæa; senecionis folio incano; perennis. *Raj. H.* 285.
16. Jacobæa; Hispanica; minus laciniata; petalis brevissimis. *T. 486. Senecio, folio non laciniato. J. B. 2. 1043. C. B. P.* 131. *Senecionis genus Myconi. Lugd. 577. a.*
17. Jacobæa; Hispanica; folio senecionis; flore amplo. *Jussieu. a.*
18. Jacobæa; qui senecio in montibus. *Cæsalp. 537. a.*

100 GYMNONOSPERMAE DISCH

ANEMONOSPERMOS. Hermannii. in Catalogo post Paradisum Batavum.

Radix fibrosa.
Flos Asteris vel Jacobæ major; semiflosculi sæpe tantum
fæminini. Flosculi hermaphroditi, multis sæpe staminibus se-
cundantibus instructi.
Calix hemisphæricus, squamosus.
Semina lanugine copiosâ penitus involuta, ut in Anemone.

1. Anemonospermos; Africana; folio Jacobæ; flore luteo, ex-
- tus puniceo. Ind. 31. H. R. D.
2. Anemonospermos; Africana; folio cardui benedicti; florum ra-
- diis intus albicantibus. H. A. 2. 43. H. R. D.
3. Anemonospermos; Afra; folio plantaginis; florum radiis intus
- aureis, extus fulcis. H. R. D.
4. Anemonospermos; Afra; folio Jacobæ tenuiter laciniato; flo-
- re aurantio pulcherrimo. H. R. D.
5. Anemonospermos; Afra; folio & facie taraxaci incanis. Par.
- Bat. App. 3. Flor. Norib. 224. Ic. Jacobæ, Æthiopica, facie stæbes, flo-
- re calendule Africane, foliis latioribus. Par. Bat. Flor. 1. 25. Jacobæ
- affinis, Æthiopica, humilis, flore intus aureo, extus puniceis striis
- scripto. M. H. 3. 111. a.
6. Anemonospermos; Afra; folio oblongo, serrato, rigido; flo-
- rius sulphureo, extus puniceo. H. R. D.

DORONICUM. T. 487. 277.

Radix valde intricata.
Folia alterna.
Caulis minus ramosi.
Flos Asteris, major; semiflosculi apice trifido; flosculi
apice quinquesido.
Calix expansus, multifidus usque in basin, pelvisiformis,
non squamosus.

1. Doronicum; maximum; foliis caulem amplexantibus. C. B. P.
185. M. H. 3. 127. Doronicum, maximum, foliis hyoscyami Peruani inst.
- caulem amplectentibus. J. B. 3. 18. Doronicum VII, Austriacum I
- Clus. H. XIX. Doronicum. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 5. Fig. 1.
2. Doronicum; plantaginis folio; alterum. C. B. P. 184. M. H.
127. Doronicum, folio fere plantaginis oblongo. J. B. 3. 18. Doroni-
- VI, Pannonicum. Clus. H. XVII. Alisma. H. Eyst. Æst. o. 14.
- Fig. 2.



OSTERMOS ; afra ; folio Jacobaeae tenuiter laciniato , flore
aurantio , pulcherrimo .
A. radix fibrosa . B. folia . C. calix . D. flos . E. petala corollae aetivâ magnitudinis .

3. *Doronicum*; integro & crasso hieracii folio. *Bot. Monsp.* 295. *M. H.* 3. 128. *Jacobaea integro & crasso hieracii folio.* T. 486.
 4. *Doronicum*; longifolium; hirsutie asperum. *C. B. P.* 184. *M. H.* 3. 127. *Doronicum II, Austriacum I, Clus. H.* xvii. *Doronici species ex Horto Ferrariensi, folio longo, hirsuto.* J. B. 3. 19.
 5. *Doronicum*; plantaginis folio; Lusitanicum. T. 488.

TUSSILAGO. T. 487. 276.

Radix repentissima.

Flos numerosissimis barbulis constans, in caule quoque singularis, calice in basin multifido exceptus.

1. *Tussilago*; vulgaris. *C. B. P.* 197. *Tussilago.* J. B. 3. 563. *H. Eyst. Hyem. o. 1. F. 6. Fig. 1. M. H.* 3. 130. *Bechium, sive farfara. Dod. p. 596. †. co.*
 2. *Tussilago*; Alpina; rotundifolia; glabra. *C. B. P.* 197. *M. H.* 3. 130. *Tussilago, Alpina, II Clus. H.* cxiii. *Flore purpureo. H.*

CARLINA. T. 500. 285.

Radix fibrosa.

Facies cardui.

Calix spinosus, amplus.

Flos radiis sterilibus, planis, disco fistuloso.

Semen papposum, vel penicillo coronatum, inherens fistula, foliolo imbricato distinctum.

1. *Carlina*; acaulos; magno flore, albo. *C. B. P.* 380. *Carlina acaulos.* J. B. 3. 64. *Carlina altera. Dod. p. 727. Carduus xeranthemos, flore albo, ampliore, acaulis. M. H.* 3. 162. *Chamaeleon, albus, Dioscoridis, & Theophrasti. Clus. H.* clv. *H.*
 2. *Carlina*; caulescens; flore magno, albicante. *C. B. P.* 380. *Carlina caulifera.* J. B. 3. 64. *Carlina, sive Leucacantha. Dod. p. 727. Carlina vulgaris, caulem emittens. Col. Carduus xeranthemos, flore albo, caulescens. M. H.* 3. 162. *Chamaeleon niger, vulgaris. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 8. Fig. 1. H.*
 3. *Carlina*; sylvestris; vulgaris. *Clus. H.* clvi. *Cnicus sylvestris, spinosior. C. B. P.* 378. *Carlina sylvestris quibusdam, aliis atracylis. J. B.* 3. 81. *Carlina sylvestris. Dod. p. 728. Hieracantha Tabernemontani. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 8. Fig. 3. a. †.*
 4. *Carlina*; sylvestris; flore aureo; perennis. *H. L. Carduus xeranthemos, vulgaris, annuus. M. H.* 3. 162. *Cnicus sylvestris, spinosior, flore aureo, perennis. H. R. Par. 54. H.*
 5. *Carlina*; sylvestris; minor; Hispanica. *Clus. H.* clvii. *Acarina,*

flore luteo, patulo. C. B. P. 379. *Carduus*, *Carlina minor sylvestris* Clusii, flore luteo. J. B. 3. 84. *Carduus xeranthemos*, flore luteo, patulo, Hispanicus, perennis. M. H. 3. 162. H.

6. *Carlina*; flore purpuro-rubente, patulo. T. 500. *Carlina*, annua, purpurea, *Monspeliensium*. Bot. Monsp. *Acarna*, flore purpuro-rubente, patulo. C. B. P. 379. *Carduus xeranthemos*, flore purpureo-rubente, patulo. M. H. 3. 162. *Acanthoides*, parva, *Apula*. Col. 1. 29. a. b. H.

7. *Carlina*; patula; *atractylidis* folio & facie. T. 500. *Acarna*. Col. 1. 23. *Acarna*, *Theophrasti*, *acorna*, *Plinio*. Col. 1b. *Descript.* 26. b. H.

CORONA SOLIS. T. 489. 279.

Flos Asteris major.

Calix squamosus.

Embryones seminum foliolis imbricatis distinguuntur in disco. Apex ovarii binis foliolis coronatur, inter quae flos apici ovarii innascitur; unde excussis emarcidis flosculis fiunt.

Semina instructa duobus foliolis in apice.

1. *Corona solis*. Tab. Ic. 763. T. 489. *Flos solis*, major. H. Eyst. Æst. 8. 5. F. 1. Fig. 1. *Chrysanthemum*, *Indicum*, maximum, annuum, non ramosum. M. H. 3. 19. *Helenium*, *Indicum*, maximum. C. B. P. 276. *Herba maxima*. J. B. 3. 107. *Chrysanthemum Indicum*, flore & semine maximis, annuum. H. L. *Chimalath Peruana*, flos solis. Hernand. 228. Flore aureo; semine nigro. a.

2. *Corona solis*; maxima; semine albo, cinereo, & striato T. 489. Flore aureo. a.

3. *Corona solis*; maxima; flore pallidè sulphureo, fere albo; semine nigro. An *chrysanthemum*, majus, alterum, sulphureo magno flore. H. R. Par? a.

4. *Corona solis*; maxima; flore pleno, aureo; semine nigro. a.

5. *Corona solis*; maxima; flore pleno, aureo; semine albo. a.

6. *Corona solis*; maxima; flore pleno, sulphureo; semine nigro. a.

7. *Corona solis*; maxima; flore pleno, sulphureo; semine albo. a.

8. *Corona solis*; ramosa; perennis. *Corona solis*, minor, femina. Tab. Ic. 764. Germ. 1147. *Helenium*, *Indicum*, ramosum. C. B. P. 277. *Chrysanthemum*, *Indicum*, perenne, flos solis, minor. Flor. 2. 45. *Flos solis*, prolifer. H. Eyst. Æst. 8. 5. F. 2. Fig. 1.

9. *Corona solis*; parvo flore; tuberosâ radice. T. 489. *Helianthemum*, *Indicum*, tuberosum. C. B. P. 277. *Flos solis*, *Farnesianus*, *aster Peruanus*, tuberosus. Col. p. 2. 13. Hort. Farnes. 191. *Chrysanthemum* perenne, majus, foliis integris, *Americanum*, tuberosum. M. Artichoki sub terrâ vulgò.

10. Corona solis; latifolia; altissima. T. 489. *Chrysanthemum Canadense*, latifolium, altissimum. M. H. Blef. 251. M. H. 3. 23. *Chrysanthemum Canadense*, latifolium, elatius. Bocc. Ic. & Descr. 52.
11. Corona solis; latifolia; humilior; Canadensis. *Chrysanthemum Canadense*, latifolium, humilius. M. H. Blef. 251. M. H. 3. 23. *Chrysanthemum Canadense*, humilius. Bocc. Ic. & Descr. 52.
12. Corona solis; rapunculi radice. T. 490. *Chrysanthemum Canadense*, rapunculi radice, strumosum vulgò. H. L. 143. Descr. M. H. 3.
23. *Helenium Canadense*, altissimum, Vosacan dictum. H. R. P. 85.
13. Corona solis; altissima; virgæ aureæ foliis. T. 490.
14. Corona solis; arborea; folio latissimo platani. *Chrysanthemum angulosis platani foliis*, *Virginianum*. Plukn. Almag. Phytogr. 83. 3. *Doronicum*, maximum, *Americanum*, latissimo anguloso folio, radice transparente. H. L. 222. *Chrysanthemum*, perenne, *Virginianum*, majus, platani orientalis folio. M. H. 3. 22. Descr. Ic. Sect. 6. Tab. 7. 55. t. H.
15. Corona solis; foliis amplioribus laciniatis. T. 490. *Doronicum*, *Americanum*, laciniato folio. C. B. P. App. 516. *Chrysanthemum Americanum*, laciniato folio, majus. M. H. Blef. *Chrysanthemum Americanum*, perenne, foliis divisis, dilutius virentibus, majus. M. H. 3. 22. Descr. Ic. Sect. 6. Tab. 6. 53.
16. Corona solis; foliis angustioribus, laciniatis. T. 490. *Chrysanthemum Americanum*, perenne, foliis magis dissectis, saturatius viridibus, & minus. M. H. 3. 22. Descr. Ic. Sect. 6. Tab. 6. 54. *Aconitum*, *helianthemum*, *Canadense*. Corn. 179.
17. Corona solis; altissima; caule alato. T. 490. *Chrysanthemum Canadense*, bidens, alato caule. M. H. Blef. 253. *Helenium Canadense*, elatius, alato caule. H. R. P. 85. *Chrysanthemum Virginianum*, caule alato, ramosius, flore minore. Plukn. Alm. Phyt. 159. 3. *Chrysanthemum*, caule alato, *Virginianum*, ramosum, flore minore aureo. M. H. 3. 25. Descr. Ic. Sect. 6. Tab. 7. 76.
18. Corona solis; salicis folio; alato caule. T. 490. *Chrysanthemum Canadense*, minus, caule alato. M. H. Blef. 252. *Aster luteus*, alatus. Corn. 63. *Chrysanthemum Americanum*, perenne, caule alato, folio angusto, glabro. M. H. 3. 24.

CHRYSANTHEMOIDES OSTEOSPERMON. Commel. H. A. 2. 85.

CHRYSANTHEMOIDES. T. Mem. Ac. Reg. 1705. Tab. IV. Fig. 3.

Folia sparsa.

Flos ut Coronæ solis, minor.

Calix simplex, ad basin scissus in unâ, squamosus in alterâ.

Ovarium fit semen osseum, nucleum continens, à quolibet flore, ut in congeneribus, unum.

oides; osteospermon; Africanum; odoratum; spinosum;

104. GYMNONOMOSPERMAE DISCIFLORAE.

fum; & viscosum. *H. A.* 2. 85. *Chrysanthemi flore planta Afra, baccifera, ramis in aculeum abeuntibus. Par. Bat. App. Chrysanthemum Africanum, frutescens, spinosum. Volk.* 105. *Huic calix simplex. H. R. D.*

2. *Chrysanthemoides; osteospermon; Africanum; arboreum; foliis populi albæ. Chrysanthemum arboreum, Ethiopicum, foliis populi albæ. Breyn. Cent.* 156. *M. H.* 3. 23. *Chrysanthemoides Africanum, populi albæ foliis. T. Mem. Ac. Reg.* 1705. *Chrysanthemum bacciferum, populi folio, Africanum. Ind.* 278. *Huic calix squamosus triplici serie. H. R. D.*

3. An *Chrysanthemoides*? quod *Chrysanthemum* ex Insulis Caribæis leucoji incanis & sericeis foliis, argenteis, crassis. *Plukn. Phyt.* 115. 4. *H. R. D.*

Huic calix squamosus, rigidus; flos Chrysanthemi; semina necdum visa.

ASTERISCUS. *T.* 497. 283.

Radix fibrosa.

Calix stellatus, radiis foliosis, florem superantibus, succingit florem.

Flos Asteris.

Semina plana, marginata plerumque, non papposa, nec cristata.

1. *Asteriscus; annuus; foliis ad florem rigidis. T.* 497. *Aster, luteus, foliolis ad florem rigidis. C. B. P.* 266. *Chrysanthemum, asteris facie, foliis ad florem rigidis. H. L. Chrysanthemum conyzoides, foliis circa florem rigidis. M. H.* 3. 18. *b. t. H.*

2. *Asteriscus; annuus; foliis ad florem rigidis; flore sulphurei coloris. T.* 497. *Chrysanthemum, asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore sulphureo. H. L. b. t. H.*

3. *Asteriscus; annuus; foliis ad florem rigidis; flore minore; elatior. T.* 497. *Chrysanthemum, asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore minore, elatius. H. L. App. b. t. H.*

4. *Asteriscus; annuus; foliis ad florem rigidis; flore minimo; humilior. T.* 498. *Chrysanthemum, asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore minimo, humilior. H. L. App. 6. t. H.*

5. *Asteriscus; aquaticus; annuus; patulus. T.* 498. *Aster Atticus, annuus, Attico luteo similis, foliis ad florem mollibus. Bot. Monsp.* 32. *Aster Atticus, foliis circa florem mollibus. C. B. P.* 266. *Aster cernuus. Col. p.* 1. 252. *Chrysanthemum conyzoides, Monspeliensium, & aster conyzoides, Monspeliensium. M. H. B.* 235. 236. *Chrysanthemum conyzoides, cernuum, foliis circa florem mollibus. M. H.* 3. 18. *Aster, I Clus. H. XIII. b. t. H.*

6. *Asteriscus; annuus; maritimus; patulus. T.* 408. *Aster, luteus, supinus. C. B. P.* 267. *Aster, Atticus, luteus, supinus, spinosus. J. B.*

2. 1045. *Aster*, *Atticus*, *supinus*. *Dod.* p. 266. *Aster*, *II*, *supinus*. *Clus. H.* xiii. *Chrysanthemum*, *asteris facie*, *supinum*, *majus*. *H. L.* *Chrysanthemum*, *conyzoides*, *supinum*, *Monspeliense*. *M. H.* 3. 18. b. t. *H. R. D.* *Asteriscus*, *idem*, *minor*. t. *H.*

7. *Asteriscus*; *maritimus*; *perennis*; *patulus*. *T.* 498. *Aster*, *supinus*, *lignosus*, *Siculus*, *conyzæ odore*. *Bocc. Mus.* p. 2. 161. *Aster*, *supinus*, *lignosus*, *ejusdem*. *Tab.* 129. *H.*

8. *Asteriscus*; *annuus*; *Lusitanicus*; *odoratus*. *An asteriscus*, *Creticus*, *odoratus*, *minimus*. *T. Cor.* 38. ? *Chrysanthemum*, *conyzoides*, *Lusitanicum*. *Breyn Cent.* 1. 157. *Aster*, *supinus*, *conyzoides*, *Africanus*. *Park. Theatr.* 131. *Chrysanthemum*, *asteris facie*, *supinum*, *minus*. *H. L.* *Chrysanthemum* *conyzoides*, *odoratum*, *Creticum*. *M. H.* 3. 18. a. b.

9. *Asteriscus*; *perennis*; *folio odorato*; *flore rigido*. *Micheli.*

Omnia ut in *Asterisco*, sed sine coronâ foliaceâ.

10. *Asteriscus*; *calice brevi*; *angustifolius*. *Chrysanthemum*, *asteris facie*, *foliis succisæ*. *H. L.* *Aster*, *luteus*, *major*, *foliis succisæ*. *C. B. P.* 266. *Aster*, *III*, *Austriacus I*, *Clus. H.* xii. Possêt & ad *Chrysanthema* referri, sed calix non est squamosus; & si pappum haberet in femine, calicemque squamosum, ad *Alteres*. Fortê non incommodê *Asteriscoides* dicenda.

CHRYSANthemum. *T.* 491. 280.

Radix annua.

Calix hemisphericus, *squamosus*.

Radii floris aurei plerumque.

1. *Chrysanthemum*; *foliis matricariæ*. *C. B. P.* 134. *Chrysanthemum*, *Creticum*, *luteum*. *H. Eyst. Æst.* o. 5. F. 6. F. 2. *Chrysanthemum*, *majus*, *folio valde laciniato*, *flore croceo*. *J. B.* 3. 104. *Chrysanthemum* *segetum*, *vulgare*, *glaucum*. *M. H.* 3. 25. a.

2. *Chrysanthemum*; *folio matricariæ*; *flore luteo*, *pleno*. *Chrysanthemum*, *Creticum*, *flore polypetalo*, *sive pleno*. *H. C. Suppl.* 2. 18. a.

3. *Chrysanthemum*; *flore partim candido*, *partim luteo*. *C. B. P.* 134. *Chrysanthemum*, *Creticum*, *mixtum*. *H. Eyst. Æst.* o. 5. F. 6. Fig. 3. a.

4. *Chrysanthemum*; *folio matricariæ*; *flore albo*, *pleno*. *H. C. a.*

5. *Chrysanthemum*; *folio matricariæ*; *floris radiis sulphureis*, *disco aureo*. a.

6. *Chrysanthemum*; *folio matricariæ*; *flore magno*, *bullato*, *ferê nudo*. *Chrysanthemum*, *Creticum*, *apetalon*. *Bobart. An Chrysanthemum*, *Creticum*, *pétalis florum fistulosis*. *T.* 491? a.

7. *Chrysanthemum*; *folio latiori matricariæ*; *flore magno*, *sulphureis radiis*, *disco aureo*. a.

O

8. Chry-

8. Chrysanthemum; folio latiori matricariae; flore aureo. *a.*

9. Chrysanthemum; segetum; facie bellidis sylvestris; foliis glaucis, papaveris hortensis instar profundè incisis; majus. *H. L. 145. Bellis, lutea, foliis profundè incisis, major. C. B. P. 262. Chrysanthemum. Dod. p. 263. Chrysanthemum, folio minus secto, glauco. J. B. 3. 105. a. †.*

10. Chrysanthemum; segetum; facie bellidis sylvestris; foliis glaucis, papaveris hortensis instar profundè incisis; minus. *H. L. 145. Bellis lutea, foliis profundè incisis, minus. C. B. P. 262. a. †.*

11. Chrysanthemum; folio glauco, minus secto; flore ex albo & luteo variegato. *a. †*

12. Chrysanthemum; bellidis majoris folio viridi. *Flor. 1. 34. Bellis, lutea, foliis subrotundis. C. B. P. 262. Chrysanthemum Myconi. Lugd.*

873. Chrysanthemum, latifolium. *J. B. 3. 105. a.*

13. Chrysanthemum; bellidis majoris folio viridi; minus. *a.*

14. Chrysanthemum; pallidum; minimis imisque foliis incisis, superioribus integris & capillaribus. *Barr. 1. 421. Obs. 1093. a.*

BUPHTHALMUM. *T. 495. 282.*

Facies totius plantæ, Tanaceto similis.

Flosculi disci foliolo imbricato interstincti; flores plerumque singulares. Malp. An. Pl. 41. 122.

Cætera Chrysanthemi.

1. Bupthalmum; tanaceti minoris foliis. *C. B. P. 134. Chamæmelum, chrysanthemum quorundam. J. B. 3. 122. Bupthalmum, vulgare, chrysanthemo congener. Clus. H. 332.*

2. Bupthalmum; Orientale; tanaceti minoris folio; flore albo, amplissimo. *T. Cor. 37. a.*

3. Bupthalmum; Orientale; tanaceti minoris folio; flore luteo, amplissimo. *T. Cor. 37. a.*

COTULA. *T. 495. 282.*

Folia tenuia Chamæmeli.

Flos coronatus vel & nudus.

Semina plana, cordiformia, alata.

Calix plerumque squamosus.

1. Cotula; flore luteo, radiato. *T. 495. Chrysanthemum tenuifolium. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 13. F. 4. Chrysanthemum, folio Cotule. Flor. 2. 46. Bupthalmum, Cotulæ folio. C. B. P. 134. Bupthalmum, tenuifolium, folio millefolii ferè. J. B. 3. 124. M. H. 3. 16. a.*

2. Cotula; flore pallido, radiato. *Chrysanthemum,*

flore albo. *Triumfett. Chrysanthemum, fruticosus, subcandidum. C. B. P. 135. a.*

2. *Cotula*; floris radiis sulphureis, disco luteo. *a.*

4. *Cotula*; flore albo, pleno. *a.*

5. *Cotula*; flore luteo, nudo. *T. 495. Chrysanthemum, Valentinum. Clus. H. 332. Buptharmo tenuifolio simile, chrysanthemum Valentinum Clusii. J. B. 3. 125. Buptharmum, lanuginosum, foliis millefolii, an Dioscoridis. C. B. P. 135. ? a.*

6. *Cotula*; *Cretica*; minima; folio chamæmeli; capitulo inflexo. *T. Cor. 37. a.*

LEUCANTHEMUM. *T. 492.*

Omnia eadem Chrysanthemo, sed Bractææ candidæ florum.

1. *Leucanthemum*; radice repente; foliis latioribus, serratis. *T. 492. Bellis, radice repente, foliis latioribus, serratis M. H. B. M. H. 3. 29. Bellis, major, elatior, fruticescens, foliis acutis, radice repente. M. H. 3. Sect. 6. T. 9. Fig. 11. co.*

2. *Leucanthemum*; vulgare. *T. 492. Bellis sylvestris, caule folioso, major. C. B. P. 261. Bellis polyclonos, sylvestris, major, caule folioso. M. H. 3. 28. Bellis, major. Dod. p. 261. J. B. 3. 114. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 6. Fig. 1. b. †.*

3. *Leucanthemum*; vulgare; caule villis canescente. *T. 492. Bellis sylvestris, caule folioso, hirsuto, major. C. B. P. Var. 261. Bellis sylvestris, major, caule rubente, hirsuto. Sutherl. H. L. App. M. H. 3. 28. b.*

4. *Leucanthemum*; quæ bellis sylvestris; barbulis fistulosis. *Ind. 35. b.*

5. *Leucanthemum*; Canariense; sapore pyrethri. *H. C. Leucanthemum, Canariense, foliis chrysanthemi, sapore pyrethri. T. 666. Chamæmelum, Canariense, ceratophyllum, fruticosus, glauco folio crassiore, sapore fervido, magola ab incolis dictum. M. H. 3. 35. 7. H. R. D.*

6. *Leucanthemum*; folio absinthii brevior; Alpinum. *Juss. a.*

7. *Leucanthemum*; folio absinthii; Alpinum. *Ciaffi. H.*

8. *Leucanthemum*; Lusitanicum; chamæmeli folio crassiore. *Chamæmelum, Lusitanicum, latifolium, sive coronopi folio. Bryn. Cent. 1. 149. a.*

9. *Leucanthemum*; montanum; foliis chrysanthemi. *T. 492. Bellis montana, major, foliis chrysanthemi Cretici angustioribus. Bot. Monsp. App. M. H. 3. 30. b.*

10. *Leucanthemum*; tanaceti folio; flore majore. *Tanacetum, inodorum, flore majore. C. B. P. 132. Tanacetum, inodorum, flore bellidis majoris. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 4. Fig. 1. Tanacetum, inodorum, I Clus. H. 3. 30. ti folio, flore majore, semine umbilicato. T. 493. majore. M. H. 3. 30.*

11. *Leucanthemum*; bellidis facie; umbelliferum; semine papposo. *Bellis*, ramosa, sive umbellifera. Cornut. 124. *Bellis*, major, ramosa, umbellifera, Americana. Park. Th. 528. *Aster*, annuus, ramosus, albus, latifolius, Canadensis. M. H. 3. 122. *Aster*, ramosus, annuus, Canadensis. Mor. T. 482. *Ptarmica*, Americana, bellidis flore, dentatis foliis. Flor. 2. 51. a.

BELLIS. T. 490. 280.

Radix perennis, fibrosa.

Caulis raro ramosus, ferè semper simplex.

Apex pedunculi A explicatur in calicem expansum, squamosum, divisum BBB. Malp. An. Pl. 41. 119. Dein assurgit idem apex, intra calicem, in placentam conicam, obtusam A, constantem folliculis L, cui in superficie accrescunt ovaria C, G, oblonga, quorum apici innascuntur flosculi B, F, quorum inferior series planipetala B, calici contigua, coronâ radiante totum florem ornat, ambitque, alii F discum constituentes monopetali, quinquefidi H continent tubam ovarii I intra stamina quinque K. Malp. An. Pl. 45. 153.

Stamina hæc ex imâ floris tubi internâ parte orta cœunt in tubum staminibus concretis factum C. Malp. An. Pl. 51. 207.

Hinc structura floris flosculosi radiati patet.

Capitulum, flore delapso, in conum obtusum desinens.

1. *Bellis*; sylvestris; minor. C. B. P. 261. H. Eyf. Æst. o. 13. F. 1. Fig. 2. & 3. *Bellis*, minor, sylvestris, spontanea. J. B. 3. 111. *Bellis*, minor, sylvestris. Tab. Ic. 328. *Bellis*, minor, pratensis, seu vulgaris. M. H. 3. 31. †.

2. *Bellis*; sylvestris; minor; flore misto. C. B. P. 261. H. Eyf. Æst. o. 13. F. 1. Fig. 3. *Petalis ex candido & rubro mistis*. †.

3. *Bellis*; sylvestris; minor; petalis ex candido rubris. †.

4. *Bellis*; sylvestris; minor; petalis intus rubris, in ambitu albis. †.

5. *Bellis*; hortensis; flore pleno, magno, vel parvo. C. B. P. 261. *Bellis*, minor, sylvestris, flore pleno, rubro. H. Eyf. Æst. o. 13. F. 1. Fig. 2. *Bellis*, hortensis, sive flore multiplicato. J. B. 3. 113.

6. *Bellis*; hortensis; flore pleno, magno, vel parvo, incarnato. C. B. P. Var. 261.

7. *Bellis*; hortensis; flore pleno, magno, vel parvo, albo. C. B. P. Var. 261.

8. *Bellis*; hortensis; flore pleno, magno, vel parvo, vario ex candido & rubro. C. B. P. Var. 261.

9. *Bellis*; hortensis; prolifera. C. B. P. 262. *Bellis*, prolifera, variegata. H. Eyf. Vern. o. 7. F. 4. Fig. 1.

10. *Bel-*

10. Bellis; hortensis; flore pleno, rubro, in formam cristæ galli figurato.

11. Bellis; hortensis; flore pleno, albo, globoso, maximo; prolifera. Huic mirâ fecunditate prodit novus pedunculus floriger ex quoque foliolo calicis squamosi primi floris. Nec minus letâ fœturâ foliola flosculi sic nati novos denuo pedunculos florigeros habent; jucundo sanè spectandi oblectamento.

CHAMÆMELUM. T. 494. 281.

Radix fibrosa.

Calix squamosus, expansus, serie foliorum multiplici.
Malp. An. Pl. 41. 122.

Flos plerumque radiatus, rarò nudus; petalis radiatis plerumque albis; disco luteo.

Folia tenuiter secta.

Cætera Bellidis.

Flore petalis radiatis ornato.

1. Chamæmelum; vulgare; leucanthemum Dioscoridis. C. B. P. 135. M. H. 3. 35. Chamæmelum, vulgare, amarum. J. B. 3. 116. Chamæmelum, vulgare. Dod. p. 257. a. †.

2. Chamæmelum; nobile; sive leucanthemum; odoratius. C. B. P. 135. Chamæmelum, odoratissimum, repens, flore simplici. J. B. 3. 118. M. H. 3. 35. Chamæmelum, odoratum. Dod. p. 260. Chamæmelum, Romanum, flore simplici. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 3. Fig. 2. co.

3. Chamæmelum; nobile; flore multiplici. C. B. P. 135. Chamæmelum, Romanum, flore multiplici. Tab. Ic. 19. H. Eyst. o. Æst. 11. F. 3. Fig. 3. Chamæmelum, repens, odoratissimum, perenne, flore multiplici. J. B. 3. 119. M. H. 3. 35. co.

4. Chamæmelum; leucanthemum; Hispanicum; magno flore. C. B. P. 135. M. H. 3. 35. C. B. I in Prodr. 70. a.

5. Chamæmelum; Chium; vernum; folio crassiori; flore magno. T. C. 37. Chamæmelum, Orientale, præcox. Bob. a.

6. Chamæmelum; inodorum. C. B. P. 135. Chamæmelum, serotinum, annuum, foliis obscure virentibus, flore majore. M. H. 3. 35. Chamæmelum, inodorum, sive cotula non fœtida. J. B. 3. 120. Cotula alba. Dod. p. 258. a. †.

7. Chamæmelum; fœtidum. C. B. P. 135. Chamæmelum præcox, annuum, fœtidum, semine aureo. M. H. 3. 36. Chamæmelum, fœtidum, sive cotula fœtida. J. B. 3. 120. Cotyla, alba. Dod. p. 258. Cotula fœtida. H. Eyst. Æst. Arb. F. 10. F. 2. a. †.

8. Chamæmelum; marinum. J. B. 3. 122. Matricaria maritima. C. B. P. 134. Chamæmelum, maritimum, Dalechampi. Lugd. 1394. a.

110 GYMNOMONOSPERMAE DISCIFLORAE.

9. Chamæmelum; maritimum; incanum; folio absinthii crasso.
An Chamæmelum, maritimum, absinthii folio. T. 494? a.

10. Chamæmelum; Orientale; incanum; folio millefolii. *T. Cor. 37. H.*

11. Chamæmelum; montanum; folio absinthii; odore parthenii.
H. C. H.

12. Chamæmelum; Orientale; folio absinthii. *T. C. 37. Chamæmelum, Creticum, foliis argenteis, eleganter incis.*

Flore radiis carente.

13. Chamæmelum; luteum; capitulo aphylo. *C. B. P. 135. M. H. 3. 35. Chamæmelum, aureum, peregrinum, capitulo sine foliis. J. B. 3. 119. Anthemis, chrysanthemum, Herbariorum. Lob. Ic. 771. Chamæmelum, capitulis nudis. ex H. A. Ind. 36. a.*

14. Chamæmelum; maximum; Asiaticum; nudum; humifusum; folio crasso. *Ind. 36. Cotyla, Cretica, minima, Chamæmeli folio, capitulo inflexo. T. C. 37. a. parum, si quid, differunt.*

15. Chamæmelum; Orientale; foliis pinnatis. *T. Cor. 37. b. H.*

Flore radiis minimis ornato.

16. Chamæmelum; Æthiopicum; lanuginosum. *Breyn. Cent. 1. 73. M. H. 3. 36. Cotyla, Africana, calice eleganti, cæsis. T. 495. Flore albo. a.*

17. Chamæmelum; Æthiopicum; lanuginosum; flore luteo. *a.*

Flore omninò nullo.

18. Chamæmelum; nobile; sive leucanthemum odoratius; nunquam florens. *Chamæmelum, non florens. K. Ind. 36. Chamæmelum humile, non florens. Sutherl. Hort. Edinb. Flor. 2. 50. co.*

MATRICARIA. *T. 493. 281.*

Radix annua, fibrosa.

Folia multifariam & per conjugationes secta.

Calix hemisphæricus, squamosus.

Flos in fasciculis vel umbellis, radiis albis plerumque donatus.

1. Matricaria; vulgaris; vel sativa. *C. B. P. 133. M. H. 3. 32. Matricaria, vulgò minus parthenium. J. B. 3. 129. Matricaria, flore simplici. H. Eyf. Æst. o. 5. F. 7. Fig. 1. Matricaria vulgaris, seu sativa. C. B. P. Caulibus viridantibus, flore simplici. Flor. 2. 51.*

2. Matricaria; vulgaris; vel sativa; barbulis exiguis. *a.*

3. Matricaria; vulgaris; vel sativa; caulibus rubentibus.



4. *Matricaria*; vulgaris; vel sativa; floribus nudis, bullatis. *H. L. Matricaria, nuda. M. H. Bles. 131. Matricaria, flore aphylo. H. R. Par. 118. Matricaria, bullatis floribus, aureis. Park. Theatr. 83. a.*
5. *Matricaria*; vulgaris; vel sativa; florum petalis fistulosis. *H. L.*
6. *Matricaria*; vulgaris; vel sativa; florum petalis fistulosis & brevioribus. *H. L.*
7. *Matricaria*; flore pleno. *C. B. P. 134. J. B. 3. 130. H. Eyst. Æst. 0. 5. F. 7. Fig. 2. Petalis planis. H. L.*
8. *Matricaria*; flore pleno, petalis fistulosis. *H. L. Matricaria, foliis florum fistulosis. H. R. Par. 118.*
9. *Matricaria*; flore pleno; petalis marginalibus planis, discoïdibus, fistulosis. *H. L.*
10. *Matricaria*; foliis elegantissimè crispis; & petalis florum fistulosis. *T. 493.*
11. *Matricaria*; Americana; ambrosiæ folio; parvo flore albo. *T. App. 666. a.*

PTARMICA. *T. 496. 283.**Folia serrata, crenata, dissecta, inodora.**Calix squamosus.**Flos omnino albus, ferè in umbellas digestus.**Semina tenuissima.*

1. *Ptarmica*; vulgaris; folio longo, serrato; flore albo. *J. B. 3. 147. Ptarmica, vulgaris. H. Eyst. Æst. 0. 12. F. 5. Fig. 3. Clus. H. XII. Dracunculus, pratensis, serrato folio. C. B. P. 98. Draco, sylvestris, sive Ptarmice. Dod. P. 710. Ptarmica pratensis, viridis, sive Ptarmica vulgaris, folio serrato. M. H. 3. 40. †*
2. *Ptarmica*; vulgaris; pleno flore. *Clus. H. XII. Ptarmica, pratensis, serrato folio, flore pleno. H. L. Dracunculus, pratensis, flore pleno. C. B. P. 98. M. H. 3. 40.*
3. *Ptarmica*; foliis profundè ferratis, lætè viridibus; elatior. *H. L. 694. Flor. 2. 51. Dracunculus Alpinus, latiore folio, serratus. Sch. B. P. M. H. 3. 40.*
4. *Ptarmica*; foliis profundè ferratis; minor; & humilior. *Flor. 2. 51.*
5. *Ptarmica*; vulgaris; folio longo, serrato; humilior. *Flor. 2. 51.*
6. *Ptarmica*; Alpina; incanis, ferratis, foliis. *H. L. 694. Ptarmica Alpina, agerati incanis, ferratis, foliis. Flor. 2. 51. H.*
7. *Ptarmica*; incana; humilis; foliis laciniatis, absinthii æmulis. *H. L. 510. M. H. 3. 40. Ptarmica, humilis, incana, foliis absinthii. Flor. 2. 52. Absinthium Alpinum, umbelliferum, latifolium. C. B. P. 11. Absinthium, albis floribus, capitulis squarrosis. J. B. 3. 183. Absinthium, umbelliferum. Clus. H. 340. H.*

8. *Ptar-*

112 GYMNOMONOSPERMAE DISCIFLORAE.

8. *Ptarmica*; Alpina; tanaceti foliis; flore purpureo. *T.* 497. *Millefolium montanum*, purpureum, tanaceti foliis. *A. R. Par. M. H.* 3. 39. *H.*
9. *Ptarmica*; Orientalis; foliis santolinæ incanis; flore pallido. *Vaill.*

MILLEFOLIUM. *T.* 495. 283.

Folia tenuissimè secta.

Calix squamosus, ferè cylindricus.

Flos in umbellas densissimè congestus.

1. *Millefolium*; purpureum; majus. *C. B. P.* 140. *Prodr.* 72. *Millefolium*, flore rubro. *Clus. H.* 331. *H. Eyst. Æst. o. ult. F. 2. Fig. 2. †.*
2. *Millefolium*; purpureum; minus. *C. B. P.* 140. *Millefolium*, purpurei floris. *Dod. p.* 100. †.
3. *Millefolium*; vulgare; album. *C. B.* 140. *M. H.* 3. 38. *Millefolium*, stratiotes, pennatum, terrestre. *J. B.* 3. 136. *Millefolium*, flore albo. *H. Eyst. Æst. o. ult. F. 2. Fig. 3.* *Millefolium*, sive *Achillea*. *Dod. p.* 100. †.
4. *Millefolium*; maximum; umbellâ albâ. *C. B. P.* 140. *Prodr.* 72. *M. H.* 3. 38.
5. *Millefolium*; nobile; Tragi. 476. *M. H.* 3. 38. *Tanacetum*, minus, album, odore camphoræ, sive *Achillea Dioscoridis*. *C. B. P.* 132. *Achillea*, millefolia, odorata. *J. B.* 3. 140. *Tanacetum*, minus, sive album. *Dod. p.* 37.
6. *Millefolium*; Orientale; altissimum; luteum; abrotani folio. *T. Cor.* 37. *H.*
7. *Millefolium*; Orientale; erectum; luteum. *T. Cor.* 37. *H.*
8. *Millefolium*; Orientale; erectum; flore flavescente. *T. Cor.* 37. *H.*
9. *Millefolium*; tomentosum; luteum. *C. B. P.* 140. *J. B.* 3. 138. *Stratiotes*, millefolia, flavo flore. *Clus. H.* 330.
10. *Millefolium*; luteum; magis tomentosum; & altius. *Millefolium tomentosissimum*. *Ind.* 38.
11. *Millefolium*; luteum; majus; folio lato.
12. *Millefolium*; Orientale; foliis tanaceti incanis; radiis pallidè luteis. *Ptarmica*, Orientalis, foliis tanaceti incanis, semisflosculis florum pallidè luteis. *T. Cor.* 37. *H.*
13. *Millefolium*; odoratum; Monspeliense. *Pillet.* 271. *Millefolium*, odoratum, minus, Monspeliensium. *M. H. R. Bloes. & H. R. Par. M. H.* 3. 38.
14. *Millefolium*; tanaceti foliis; flore albo. *M. H. R. Bloes. M. H.* 3. 38. *Tanacetum montanum*, album, tenuifolium, flore candido. *Bocc. Mus. Plant. T.* 26.
15. *Millefolium*; vulgare; majus; album; foliis elgatis.

CALTHA. T. 498. 284.

*Radix fibrosa, annua.**Folia oblonga, integra, succulenta.**Florum petala in plerisque in apice crenata, exceptis Africanis.**Embryones fiunt capsulae curvae, marginatae, foetae semine oblongo.*

1. Caltha; vulgaris; flore citrino. C. B. P. 275. Caltha, flore simplici. J. B. 3. 101. M. H. 3. 13. Calendula vulgaris, flore citrino, simplici. H. L. Calendula, flore simplici. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 4. Fig. 3. Calendula. Dod. p. 254. a.

2. Caltha; vulgaris; flore pallido. C. B. P. 275. a.

3. Caltha; vulgaris; flore rufo. C. B. P. 275. Calendula, lutea, medio rufa. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 3. Fig. 3. a.

4. Caltha; polyanthos; maxima. C. B. P. 275. Calendula, multiflora, maxima. Tab. M. H. 3. 13. a.

5. Caltha; polyanthos; major. C. B. P. 275. Caltha, flore pleno. J. B. 3. 101. M. H. 3. 13. Calendula, lutea, flore pleno. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 3. Fig. 2. a.

6. Caltha; arvensis. C. B. P. 276. M. H. 3. 14. Caltha, minima. J. B. 3. 103. a.

7. Caltha; flore pleno, variegato ex pallido & flavo; major. a.

8. Caltha; media; folio longo, cinereo; flore pallido. Bob. a.

9. Caltha; media; folio longo; prolifera; majoribus & minoribus floribus. C. B. P. 276. M. H. 3. 14. a.

10. Caltha; Africana; flore intus albo, extus violaceo. T. 499. Caltha, seu Calendula, Africana, flore intus albo, extra ferrugineo. M. H. 3. 14. Calendula, humilis, Africana, flore intus albo, foris violaceo, simplici. H. L. 104. Ic. & Deser. a.

11. Caltha; Africana, flore intus albo, extus leviter violaceo; femine plano, cordato. Bellis, Africana, florum pediculis penè aphyllis, foliis incis. H. A. 2. 66. a.

12. Caltha; Africana; foliis croci, angustis; florum petalis externè purpurascens, internè albis. Bellis, Africana, florum pediculis foliosis, foliis angustis, & integris. H. A. 2. 67. H. Posteriores tres à Calthis quodammodo recedentes, in novum genus redigi possunt.

Semine capitulo foliaco instructo.

TAGETES. T. 488. 278.

Radix fibrosa, annua.

Folia Tanacetii, foetida, ad nervum usque incisa.

Calix monophyllus, tubulatus.

Florum barbulae planae, vel fistulosae.

Semen angulatum, capitulo foliato instructum.

1. Tagetes; maximus; rectus; flore simplici, ex luteo pallido. J. B. 3. 120. *Tanacetum, Africanum, majus, simplici flore, pallente.* C. B. P. 133. *Caryophylli Hispanici dicti, vel Caryophylli Mexicani, quarta varietas.* Col. 2. 47. *Cempoalxochitl, caryophylli Mexicani planta.* Hernand. 154. *Chrysanthemum Africanum, erectum, tanacetii folio, flore simplici, majore.* M. H. 3. 16. a.

2. Tagetes; maximus; rectus; flore maximo, multiplicato. J. B. 3. 120. *Tanacetum, sive flos Africanus, major, flore pleno, aureo.* C. B. P. 132. *Chrysanthemum, Africanum, erectum, tanacetii folio, flore pleno majore.* M. H. 3. 16. *Caryophyllus, major, Indicus, flore multiplici, aureo.* H. Eyst. Æst. o. 14. F. 2. Fig. 1. *Caryophyllus, Mexicanus, primus.* Col. 2. 47. *Cempoal xochitl, vel Giubna xochitl. Tzneycepahuat. Caryophyllus Mexicanus, I. Hernand. 154. a.*

3. Tagetes; Indicus; medius; flore simplici, luteo-pallido. J. B. 3. 99. *Oquichitli, Cocazochitl, caryophyllus Mexicanus, II. Hernand. 155. Caryophyllus, Indicus, flore luteo, simplici, minor.* H. Eyst. Æst. o. 14. F. 1. Fig. 2. a.

4. Tagetes; Indicus; medius; flore luteo, multiplicato. H. L. 587. *Tlapalte, Cacayatl, caryophyllus Mexicanus, III. Hernand. 155. Caryophyllus Indicus, flore multiplici, luteo, pleno, major.* H. Eyst. Æst. o. 14. F. 1. Fig. 1. a.

5. Tagetes; Indicus; minor; simplici flore; sive caryophyllus Indicus; sive flos Africanus. J. B. 3. 98. *Tanacetum Africanum, sex flos Africanus minor.* C. B. P. 133. *Caryophyllus Indicus, flore & luteo rubescente simplici, minor.* H. Eyst. Æst. o. 14. F. 3. Fig. 1. a.

6. Tagetes; Indicus; minor; multiplicato flore. J. B. 3. 99. *Maquil xochitl, seu Maon, caryophyllus Mexicanus, IV. Hernand. 155. Caryophyllus Indicus, plenus, flore luteo rubescente, minor.* H. Eyst. Æst. o. 14. F. 3. Fig. 1. a.

7. Tagetes; Indicus; flore simplici, fistuloso. H. L. 588. *Chrysanthemum Africanum, erectum, tanacetii folio, petalis florum fistulosis, flore simplici.* M. H. 3. 16. *Caryophyllus Mexicanus, flore fistuloso, simplex.* Col. 2. 46. *Tanacetum, sive flos Mexicanus, flore fistuloso, simplici.* C. B. P. 133. a.

8. Tagetes; Indicus; flore fistuloso, duplicato. H. L. 588. *Caryophyllus*

GYMNOMONOSPERMAE DISCIFLORAE. 115

phyllus Mexicanus, flore fistuloso, alter, polyanthos. Col. 2. 46. *Tanacetum*, sive flos Mexicanus, flore fistuloso pleno. C. B. P. 133. *Chrysanthemum Africanum*, erectum, folio tantaceti, petalis florum fistulosis, flore pleno. M. H. 3. 16.

9. *Tagetes*; *Indicus*; flore aureo, simplici; minor. *Caryophyllus Indicus*, flore aureo, simplici, minor. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 1. Fig. 3. a.

10. *Tagetes*; *Indicus*; minimus; flore sericeâ hirsutie obfito. H. L. 587. *Tanacetum Africanum*, minimum, sericeâ hirsutie obfitum. C. B. P. 133. *Tapalcoçathli*, *Coaxochitl*, *caryophyllus Mexicanus*, V. *Hernand.* 156. *Caryophylli Hispani*, diffi. varietas septima & octava. Col. 2. 47. Descr. a.

XERANTHEMUM. T. 499. 284.

Radix fibrosa, annua.

Folia subincana, oleæ similia, alterna.

Calix squamosus, levis, argenteus, quadruplici constans, vel quintuplici serie squamarum, sibi invicem incumbentium.

Flores aridi, bracteis planis, sterilibus, ovario & stamine destitutis, rigidis, cuspidatis, disco flosculofo simili ut in aliis.

Semina capitulo foliaceo instructa.

1. *Xeranthemum*; flore simplici, purpureo; majore. H. L. *Xeranthemum*, aliud, sive *ptarmica* quorundam. J. B. 3. 25. *Xeranthemum*, oleæ folio, capitulis simplicibus, incanis, non fœtens, flore majore violaceo. M. H. 3. 43. *Jacea*, oleæ folio, capitulis simplicibus. C. B. P. 272. *Ptarmica Austriaca*. Dod. p. 710. Clus. H. xi. a.

2. *Xeranthemum*; flore pleno, purpureo, majore. H. L. a.

3. *Xeranthemum*; flore simplici, albo. H. L. a.

4. *Xeranthemum*; flore pleno, albo. H. L. a.

5. *Xeranthemum*; flore simplici, purpureo, minore. T. 499. *Jacea*, oleæ folio, minore flore. C. B. P. 272. a.

6. *Xeranthemum*; capitulo variegato. *Jacea*, folio oleæ, capite variegato. Sber. a.

7. *Xeranthemum*; flore purpureo, simplici, minimo; semine maximo. H. L. Flor. 2. 37. a.

GYMNOMONOSPERMAE, FLORE COMPOSITO, DISCIFLORÆ,
NUDÆ PLANIPETALA CORONA.1. Semine papposo: *excepto Gnaphalio.*

CONYZA. T. 454. 259.

Calix squamosus, plerumque cylindraceus.

1. Conyza; latifolia; viscosa; suaveolens; flore aureo; ex Gallo-provincia. T. 455. M. H. 3. 113. *Conyza Pyrenaica*, foliis primulae veris. Par. Bat. 127. Ic. & Descr. *Conyza major*, alato caule, foliis primulae veris longè amplioribus, graviter odoratis. Lel. Triumf. apud fratrem. 65. *Eupatoria*, conyzoides, maxima, Canadensis, foliis caulibus amplexantibus. Pluknet. Phyt. 87. 4. b. H. Flore nunc radiato, nunc nudo, ambigit inter Asteres & Conyzas.

2. Conyza; major; vulgaris. C. B. P. 265. *Conyza*, major Matthioli, baccharis quibusdam. J. B. 2. 1051. *Conyza*, major, altera. Dod. p. 51. *Eupatorium montanum*, verbasci folio, vulgatius, baccharis dictum. M. H. 3. 99. *Baccharis Monspeliensis*. Gesn. †

3. Conyza; cærulea; acris. C. B. P. 265. M. H. 3. 115. *Senecio*, seu *erigeron*, cæruleus, aliis *Conyza cærulea*. J. B. 2. 1043. *Erigeron quartum*. Dod. p. 641. *Aster palustris*, parvo flore globoso. T. 483. *Amellus*, *montanus*, *Æquicolorum*. Col. 2. 25. Descr. 26. Ic. a.

4. Conyza; mas; Theophrasti; major Dioscoridis. C. B. P. 265. *Conyza*, major. Dod. p. 51. Clus. H. xx. *Conyza*, major, *Monspeliensis*, odorata. J. B. 2. 1053. *Conyza major vera*. Lob. Ic. M. H. 3. 114. a.

5. Conyza; aquatica; laciniata. C. B. P. 266. *Aster*, palustris, laciniatus, luteus. T. 483. *Jacobæa aquatica*, elatior, foliis magis dissectis. M. H. 3. 110. a. †. aq.

6. Conyza; Cretica; fruticosa; folio molli, candidissimo, & tomentoso. T. Cor. 33. H.

7. Conyza; Africana; tenuifolia; subfrutescens; flore aureo. H.

8. Conyza; Sicula; annua; lutea; foliis atroviridibus; caule rubente. Bocc. M. H. 3. 115. *Conyza*, caulibus rubentibus, tenuioribus, flore luteo, nudo. Bot. Monsp. a.

9. Conyza; minor; flore globoso. C. B. P. 266. *Conyzae mediae species*, flore vix radiato. J. B. 2. 1050. *Conyza minima*. Dod. p. 52. *Conyza minor Matthioli*. Raj. Syn. 79. *Aster palustris*, parvo flore globoso. T. 483. a.

10. Conyza; Americana; lamii folio. T. 455. *Eupatorium*, *senecionis facie*, folio lamii. Par. Bat. a.

In Conyzis flores aliquando nudi, sæpe verò radiati: unde proscuè Asteres vel Conyzae vocantur.

SENECIO. T. 456. 260.

Calix monophyllus, cylindraceus, multifidus, inferius levissimè squamosus, elapso flore conicus, atque per maturitatem plerumque deorsum vergens.

1. Senecio; minor; vulgaris. C. B. P. 131. M. H. 3. 106. Senecio, vulgaris, sive erigeron. J. B. 2. 1041. Erigeron minus. Dod. p. 641. a. †.

2. Senecio; Ægyptius; folio matricariæ. Ind. 40. Jacobæa Ægyptia, folio senecionis, multiflora. Lipp. Vaill. a.

3. Senecio; Jacobææ folio. M. H. B. 309. Jacobæa vulgaris, laciniata. C. B. P. M. H. 3. 108. Erigeron majus. Dod. p. 641. a. b. †.

4. Senecio; Africanus; altissimus; blattariæ vel hieracii folio. Schol. Bot. Par. Bat. 226. Ic. & Descr. Senecio, Africanus, maximus, folio dipsaci laciniato. Par. Bat. Pr. Senecio Americanus, altissimus, maximo folio. T. 456. a.

5. Senecio; Africanus; folio retuso. H. C. Conyza Africana, Senecionis flore, retusis foliis. H. L. App. 661. Fortè & Conyza, Melitensis, retusis foliis. Bocc. Rar. Sic. 26. Pseudohelichrysum frutescens, Africanum, retusis foliis viridibus, flore luteo, nudo. M. H. 3. 90. H. R. D.

6. Senecio; Africanus; arborescens; folio serrato. Conyza Africana, humilis, foliis angustioribus, nervosis, floribus umbellatis. T. 455. Eupatorium Indicum, flore albo. Barth. Ac. Hafn. T. 11. 57. H. R. D.

7. Senecio; Virginianus; arborescens; atriplicis folio. Par. Bat. 225. Ic. & Descr. Elichryso affinis, Virginiana, frutescens, foliis chenopodii glaucis. Plukn. 27. Phyt. 2. Conyza Virginiana, halimi folio. T. 455. Pseudohelichrysum Virginianum, frutescens, halimi latioris foliis glaucis. M. H. 3. 90. H. R. D.

8. Senecio; Africanus; arborescens; folio ficoidis. Commel. Rar. 40. H. R. D.

9. Senecio; Asiaticus; Jacobææ folio; radice lignosâ; China officinarum dicta nobis. Commel. H. Med. Cat. 81. Senecio Sinensis, folio dentis leonis, flore aureo, radice crassâ, nodosâ, quæ China officinarum. Swartz. de Chinâ. officin. 17. H. *Dele p. 418.*

10. Senecio; montanus; altissimus; limonii folio. Vaill. Conyza montana, foliis longioribus serratis, flore è sulphureo albicante. Comment. Ac. Reg. Sc. H.

EUPATORIUM. T. 455. 259.

Radix fibrosa, vivax.

Folia bina, terna, quaterna, ad eundem exortum per intervalla.

Calix longus, teres, squamosus.

Flos in umbellam congestus, multis capillamentis longis, bifidis, ornatus.

1. Eupatorium; cannabinum. C. B. P. 320. Eupatorium adulterinum. J. B. 2. 1065. Eupatorium cannabinum, vulgare, foliis trifidis, profundè dentatis. M. H. 3. 97. Vulgare Hepatorium. Dod. p. 28. †. aq.

2. Eupatorium; urticae foliis; Canadense; flore albo. H. L. App. 667. Eupatorium, scrophulariae foliis glabris, flore albo. M. H. 3. 98. Valeriana, urticae folio, flore albo. M. H. 3. 97. Corn. 20. t.

3. Eupatorium; novae Angliae; urticae foliis; floribus purpurascens; maculato caule. H. L. App. 667. Eupatorium, urticae foliis. Par. Bat. 159. Ic. & Descr. R. D. t.

4. Eupatorium; folio oblongo, rugoso; caule purpurascens. T. 456. Eupatorium, foliis emulae. Corn. 191. R. D. Eupatorium Canadense, elatius, longioribus foliis, rugosis, integris, & caulibus ferrugineis. M. H. 3. 97. t. R. D.

CACALIA. T. 451. 258.

Radix vivax.

Folia petasitidis, subrotunda, integra, serrata.

Calix cylindraceus, integer, ad margines denticulatus duntaxat.

Flosculi quadrifidi.

1. Cacalia; tomentosa. C. B. P. 198. Prodr. 210. M. H. 3. 94.

PETASITES. T. 451. 258.

Radix magna, vivax.

Folia incana, magna, orbicularia.

Calix cylindricus, multifidus, squamosus, communis flosculis multis in unum collectis.

Flos in thyrsus congestus ante folia enascens; instructa sunt ovaria tuba apice clavato, bifido.

1. Petasites; major; & vulgaris. C. B. P. 197. Petasites, vulgaris, rubens, rotundiori folio. J. B. 3. 566. M. H. 3. 95. Petasites. Dod. p. 597. H. Eyst. Hyem. o. 1. F. 5. Fig. 1. †. co.

2. Petasites; minor. C. B. P. 197. Petasites, albus, anguloso folio. J. B. 3. 567. M. H. 3. 95. Petasites, flore albo. Cam. Epit. 593. H. Eyst. Hyem. o. 1. F. 5. Fig. 3. co.

3. Petasites; minor; alter; tussilaginis folio. H. R. Par. Petasites minor, folio tussilaginis. M. H. Bloef. 3. 95. co.

4. Peta-

GYMNOMONOSPERMAE DISCIFLORAE. 119

4. Petasites; Africanus; calthæ palustris folio. H. L. 488. Pseudo-petasites Africanus, calthæ palustris folio, semine bliti. M. H. 3. 95. Blitum Africanum, calthæ palustris folio, caule nudo cubitali spicam pedalem & amplius sustinens Pluk. Phytogr. 182. Almag. 68. H.

Hic ponitur ob similitudinem folii; quum rarissimè floreat.

GNAPHALIUM. T. 461. 261.

Folia tomentosa, & habitus filaginis.

Calix hemisphaericus, squamosus.

Flosculi tubulosi, quinquefidi, foliolis interstincti.

Semina solida calyptrâ munita.

1. Gnaphalium; maritimum. C. B. P. 263. Gnaphalium maritimum multis. J. B. 3. 157. Gnaphalium legitimum. Clus. H. 329. Chrysanthemum perenne, gnaphaloïdes, maritimum. M. H. 3. 21. Polium gnaphaloïdes. Alp. Ex. 146. T. Voy. 1. 27.

Licet pappo careat, à filagine divelli dissuadet forma.

FILAGO. T. 454. 259.

Calix squamosus, nec splendens, nec speciosus.

Flosculi instar stellæ divisi.

Partes ruptæ in filamenta ductilia desinentes.

1. Filago; seu Impia. Dod. p. 66. Gnaphalium, vulgare, majus. C. B. P. 263. Gnaphalium, annuum, vulgare, capitulis rotundis sessilibus, ad angulos floridum. M. H. 3. 92. Gnaphalium Germanicum. J. B. 3. 158. a. †.

2. Filago; altera. Dod. p. 67. Gnaphalium, majus, angusto, oblongo, folio. C. B. P. 263. M. H. 3. 91. a. †.

3. Filago; minor. Dod. p. 66. Lob. Ic. 481. Gnaphalium, medium. C. B. P. 263. Gnaphalium annuum, serotinum, capitulis nigricantibus, ac humidis gaudens. M. H. 3. 92. a.

4. Filago; vulgaris; tenuissimo folio; erecta. T. 454. Gnaphalium, vulgare, tenuifolium. J. B. 3. 159. a. †.

5. Filago; maritima; capite folioso. T. 454. M. H. 3. 97. & Filago, maritima, capite folioso, in hortis culta. T. 454. Gnaphalium, roseum, sylvestre. C. B. P. 263. Prodr. 122. Gnaphalium, umbellatum, minimum. J. B. 3. 162. Gnaphalium, roseum, hortense. C. B. P. 263. Prodr. 122. a. †.

6. Filago; erecta; latifolia; capitulis tomentosis. Gnaphalium, minus, latioribus foliis. C. B. P. 263. M. H. 3. 92. Gnaphalium, III, Plateau. Clus. H. 329. a.

7. Filago; quod Gnaphalium; longifolium; humile; ramosum; capi-

120 GYMNOMONOSPERMAE DISCIFLORAE.

capitulis nigris. Raj. Syn. 85. *Elichrysum aquaticum*, ramosum, minus, capitulis foliatis. T. 552. *Gnaphalio vulgari* similis. J. B. 3. 159. a.

ELICHRYSUM. T. 452. 259.

Calix squamosus, splendidus, aureo, argenteo, alio-ve, insigni colore pulcher.

Cætera instar Filaginis.

1. *Elichrysum*; sylvestre; latifolium; flore parvo singulari. T. 452. *Helichrysum*, sive *Chrysocome*, capitulis singularibus, brevioribus. M. H. 3. 87. *Elichryso* sylvestri flore oblongo similis. C. B. P. 265. Prodr. 123. Ic. & Deser. *Stæchadi citrinæ* alteri *Lobelii* affinis, capitulis brevioribus. J. B. 3. 157. H. R. D.

2. *Elichrysum*; Orientale. C. B. P. 264. Prodr. 123. Ic. & Deser. *Helichrysum*, sive *Chrysocome frutescens*, latifolia, flore corymbifero, toto aureo. M. H. 3. 86. *Stæchas*, citrina, floris & magnitudine & colore speciosa. J. B. 3. 154. *Helichrysum*, Creticum. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 12. Fig. 1. H. R. D.

3. *Elichrysum*; flore suaverubente. H. C. Forté & *Chrysocome*, Germanica, flore ignescente, sive ex aureo rutilante. Bryn. Cent. 145. H. R. D.

4. *Elichrysum*; seu *Stæchas citrina*; angustifolia. C. B. P. 264. *Stæchas*, citrina, tenuifolia, Narbonensis. J. B. 2. 154. *Stæchas*, citrina. Dod. p. 268. *Chrysocome*, I, vulgaris. Clus. H. 326. *Helichrysum*, seu *Chrysocome angustifolia vulgaris*. Clus. H. M. H. 3. 67. H. R. D.

5. *Elichrysum*; Americanum; latifolium. T. 453. *Helichrysum*, seu *Chrysocome repens*, foliis deciduis, flore externo albo, intus flavescente. M. H. 3. 88. *Gnaphalium*, latifolium, Americanum. C. B. P. 263. *Gnaphalium*, Americanum. Clus. H. 327. J. B. 3. 162. *Gnaphalium latifolium*, peregrinum. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 9. Fig. 1. H. R. D.

6. *Elichrysum*; montanum; flore rotundiori, candido. T. 453. *Gnaphalium*, montanum, flore rotundiore, candido. C. B. P. 263. *Gnaphalium*, montanum, album. Lob. Ic. 482. †.

7. *Elichrysum*; montanum; flore rotundiori, variegato. T. 453. *Gnaphalium*, montanum, suaverubens, & variegatum. H. Eyst. Vern. o. 3. F. 16. Fig. 2 & 3. †.

8. *Elichrysum*; Africanum; foetidissimum; amplissimo folio. T. 454. Calice aureo. *Elichrysum*, Africanum, latifolium, foetidum, capitulo aureo. H. A. 2. 109. a.

9. *Elichrysum*; Africanum; foetidissimum; amplissimo folio. T. 454. Calice argenteo. *Elichrysum*, Africanum, latifolium, foetidum, capitulo argenteo. H. A. 2. 109. a.

10. *Elichrysum*; sylvestre; latifolium; capitulis conglobatis. C. B. P. 264. *Gnaphalium*, ad *Stæchadem citrinam* accedens. J. B. 3. 160. *Chrysocome*, III, peregrina II. Clus. H. 326. *Helichrysum*, sive *Chrysoco-*

me annua, sylvestris, capitulis minoribus conglobatis. M. H. 3. 88. Pseudobelichrysum &c. *M. H. 3. 90. 5. a.*

11. *Elichrysum*; arboreum; Africanum; *salviae folio odorato. Elichryso affinis arbor Africana, flore purpuro-violaceo, folio salviae, odore rosmarini. H. L. 228. Ic. & Descr. Conyza Africana, frutescens, foliis salviae, odore camphorae. T. 455. H. R. D.*

12. *Elichrysum*; Africanum; folio oblongo, subtus cano, supra viridi; flore luteo. *Ind. 42. H. R. D.*

13. *Elichrysum*; Africanum; folio oblongo, angusto; flore rubello, postea aureo. *Ind. 42. H. R. D.*

14. *Elichrysum*; Africanum; folio oblongo, tomentoso, caulem amplectente; flore luteo. *Ind. 43. H. R. D.*

15. *Elichrysum*; Africanum; argenteum; repens; flore pulchro, magno, albo, disco aureo. *H. R. D.*

16. *Elichrysum*; Africanum; arboreescens; foliis incanis, latioribus. *H. R. D.*

17. *Elichrysum*; Africanum; frutescens; foliis crithmi marini. *H. A. 2. 113. H. R. D.*

18. *Elichrysum*; Africanum; frutescens; foliis stæchados citrinæ; flore aureo. *H. R. D.*

19. *Elichrysum*; angustissimo folio. *T. 452. Stæchas citrina, tenuifolia altera, sive Italica. J. B. 3. 155. M. H. 3. 87. H. R. D.*

COMA AUREA. *Herman. Flor. 2. 36. & Commelin. H. A. 2. 89.* †

Radix fibrosa, vivax.

Folia numerosa, alterna, cauli & ramis circumnata.

Calix non speciosus.

Flos aureus, solitarius, vel in umbellam digestus.

Habitus fruticosus.

1. *Coma aurea*; Germanica. *Park. 688. Linaria, folioso capitulo luteo, major. C. B. P. 213. Linaria aurea. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 14. Fig. 1. Linaria, aurea, Tragi, sive Linaria tertia. J. B. 3. 151. Linosyris Nuperorum. Lob. Ic. 409. Virga aurea, linariæ foliis. Raj. Meth. 189. Conyza, linariæ folio. T. 455. Virga aurea, linariæ foliis, floribus congestis, & umbellatim dispositis. M. H. 3. 25.*

2. *Coma aurea*; Africana; fruticans; foliis linariæ angustis; major. *H. A. 2. 89. Conyza Æthiopica, flore bullato, aureo, pinastri brevioribus foliis, lætè viridibus. Plukn. 327. H. R. D.*

3. *Coma aurea*; Africana; fruticans; foliis crithmi marini. *H. A. 2. 99. H. R. D.*

4. *Coma aurea*; Africana; fruticans; foliis glaucis & in extremitate trifidis. *H. A. 2. 97. H. R. D.*

5. Coma aurea; Africana; fruticans; foliis viridibus & in extremitate trifidis; floribus majoribus. *H. R. D.*

6. Coma aurea; Africana; fruticans; foliis glaucis, longis, tenuibus, multifidis, apice pinnularum trifido. *H. R. D.*

7. Coma aurea; Africana; fruticans; foliis tenuissimis, longis, trifidis. *H. R. D.*

8. Coma aurea; Africana; fruticans; foliis glaucis succulentis, digitatis, odoratis. *H. R. D.*

9. Comae aureae similis frutex; ambarum spirans. *Frutex Africanus, ambarum spirans. Volk. 175. Plukn. 183. H. R. D. b. ob foliorum positum, licet flore ad alas vix conspicuo differat, huc refertur.*

SEMINE ACULEIS DONATO.

BIDENS. T. 462. 262.

Radix fibrosa, annua, vel biennis.

Folia conjugata.

Flores parum radiati quandoque, plerumque penitus nudi.

Semina oblonga in aculeos desinentia.

1. Bidens; foliis tripartito divis. *Cæsalp. 488. Chrysanthemum cannabinum, bidens, folio quinquepartito, sive vulgare. M. H. 3. 17. Cannabina, aquatica, folio tripartitum diviso. C. B. P. 321. Verbesina, sive cannabina aquatica, flore minus pulchro, elatior, ac magis frequens. J. B. 2. 1073. Hepatorium aquatile. Dod. p. 595. Chrysanthemum, aquaticum, cannabinum, folio tripartito diviso. H. L. Flor. 2. 47. a. †. aq.*

2. Bidens; folio non dissecto. *Cæsalp. 488. Chrysanthemum cannabinum, bidens, foliis integris oblongis. M. H. 3. 17. Cannabina, aquatica, folio non diviso. C. B. P. 321. Verbesina, pulchriore flore luteo. J. B. 2. 1074. Conyza palustris. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 8. Fig. 2. Chrysanthemum, aquaticum, cannabinum, folio non diviso. H. L. Flor. 2. 47. a. †. aq.*

3. Bidens; Canadensis; latifolia; flore luteo. *T. 362. Chrysanthemum bidens, Americanum, caule erecto, firmo, rubente. M. H. 3. 17. Chrysanthemum, cannabinum, Americanum. M. H. B. 254. Flor. 2. 47. Eupatorium Canadense, flore luteo. H. R. Par. a.*

4. Bidens; Americana; folio apii. *T. 462. Chrysanthemum cannabinum, bidens, Virginianum, cicutarie foliis, stoculis comitibus. M. H. 3. 17. Chrysanthemum, Virginianum, foliis multifidis. Flor. 2. 47. Chrysanthemum, aquaticum, foliis multifidis, cicutæ nonnihil similibus, Virginianum. H. L. Descr. Chrysanthemum, Virginianum, foliis cicutæ nonnihil similibus. Par. Bat. 123. Ic. & Descr. a. b. H.*

5. Bidens; quod Chrysanthemum Curassavicum; foliis multifidis, latioribus; seminibus longissimis. *P. B. pr. M. H. 3. 17. Chrysanthemum,*

GYMNOMONOSPERMAE CORYMBIFERAE. 123

num, Chinenſe, foliis plurifariam diviſis, haliacabi peregrini æmulis. Plukn. Phyt. XXI. 4. a. b. H.

Foliis alternis.

6. *Bidens, Indica, hieracii folio, caule alato. T. 462. Chryſanthemum, Curaffavicum, alato caule, floribus aurantiis. Par. Bat. Ic. & Deſcr. Flor. 2. 37. Chryſanthemum, Americanum, Bidens, alatum, flore parvo aurantiaco. Plukn. Phyt. 84. 3. Chryſanthemum, cannabinum, Americanum, alatum, flore aphylo, globoſo, aurantii, foliis baccharidis. Breyn. Prodr. 2. Chryſanthemum, Americanum, caule alato, flore aphylo, globoſo, aurantio, foliis baccharidis. H. A. 1. 5. a. b. H.*

SEMINE NEC PAPPOSO, NEC ACULEATO, SED SIMPLICI, SOLIDO, CORYMBIFERÆ NUDÆ DICTÆ.

Singulari flore.

SANTOLINA. T. 460. 260.

Radix fibroſa.

Folia alterna, denticulata, crenata, granulata.

Calix ſquamofus, quaſi hemiſphæricus.

Floſculi multifidi, foliolis imbricatis diſtincti à ſe mutuò.

Flores in ramis ſingulis ſinguli, terminantes extrema, majores quam in abſinthio & abrotano.

1. *Santolina; foliis teretibus. T. 460. Abrotanum, fœmina, foliis teretibus. C. B. P. 136. M. H. 3. 11. Chamæcypariſſus. J. B. 3. 133. Poſium Theophraſti, & Dioſcoridis, & Arabum, vermiculato folio. Col. 1. 49. 51. Deſcr. 54. Ic. Abrotanum, fœmina, ſive chamæcypariſſus. H. Eſſet. 6. 14. F. 7. Fig. 3. Santolina I Dod. p. 269. Abrotanum, fœmina, vulgare. Cluſ. Hiſt. 341. H. R. D.*

2. *Santolina; flore majore; foliis villoſis, & incanis. T. 460. Abrotanum, fœmina, flore majore, foliis villoſis & incanis. C. B. P. 137. Abrotanum, fœmina, III Cluſ. H. 341. Santolina altera. Dod. p. 269. H. R. D.*

3. *Santolina; foliis obſcurè virentibus; flore aureo. T. 461. H. R. D.*

4. *Santolina; foliis minus incanis. T. 461. Abrotanum, fœmina, foliis minus incanis. C. B. P. 137. M. H. 3. 12. Abrotanum, fœmina, II Cluſ. H. 341. Polii altera ſpecies, non ita incana. Col. 1. 52. H. R. D.*

5. *Santolina; incana; chamæmeli odore ſuaviore. Abrotanum, fœmina, folio collecto, incano. H. Mauroc. Abrotanum, fœmina, folio collecto excaſcenti, obſcurè virenti, jucundius chamæmelum olens. Cupan. Cor. ad Suppl. Santolina, Orientalis, odore chamæmeli, folio vermiculato. Ind. 44. H. R. D.*

124 GYMNOMONOSPERMAE CORYMBIFERAE.

6. Santolina; Hispanica; foliis chamæmeli. T. 461. H. R. D.
7. Santolina; Africana; ericæ foliolis congestis; flosculis singulis albis. *Camphorata, Africana, umbellata, frutescens Hermannii. H. A. 2. 79. Camphoratæ hirsutæ similis fruticulus, Æthiopicus, foliolis ex uno puncto confertissimis, flore parvo, tubuloso, pentapetaloidæ, nigro. Plukn. Almag. 79. H. R. D.* ob similitudinem habitus huc relata, floris formâ dispar.
8. Santolina; spinosa; foliis agerati. *Bellis spinosa. Alpin. Exot. 372.* *Bellis spinosa, foliis agerati. C. B. P. 262. Bellis major, spinosa, petalis carens, sive nuda. Park. M. H. 3. 29. H. R. D.*
9. Santolina; Africana; coronopi folio; cauliculis procumbentibus. *Bellis, Africana, capitulo aphylo, luteo, coronopi folio, cauliculis procumbentibus. H. L. Flor. 54. Chrysanthemum, Capitis Bonæ Spei, repens, flore aphylo. Dn. Syen. Breyn. Cent. 1. 156. a.*
10. Santolina; foliis rorismarini; major. T. 461. *Abrotanum fœmina, foliis rorismarini, majus. C. B. P. 137. M. H. 3. 12. Abrotanum fœmina, IV Clus. H. 342. H. R. D.*
11. Santolina; Hispanica; foliis vermiculatis. H.
12. Santolina; foliis ericæ, vel sabinae. T. 460. *Abrotanum fœmina, foliis ericæ, vel sabinae. C. B. P. 137. Santolina tertia. Dod. p. 269. Abrotanum fœmina, odore unctuosus. M. H. 3. 12.*

Flore in summitate umbellato.

TANACETUM. T. 461. 261.

Radix fibrosa.

Folia alterna, divisa in segmenta pinnata & crenata.

Flores majores compacti, in umbellam densam congesti.

Calix squamosus, hemisphæricus.

1. Tanacetum; vulgare; luteum; maximum.
2. Tanacetum; vulgare; luteum. C. B. P. 132. M. H. 3. 2. *Tanacetum, vulgare, flore luteo. J. B. 3. 131. Tanacetum. Dod. p. 36. Tanacetum vulgare. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 5. Fig. 2. †.*
3. Tanacetum; foliis crispis. C. B. P. 132. M. H. 3. 2. *Tanacetum, crispum, flore luteo. J. B. 3. 132. Tanacetum crispum. Dod. p. 36. Tanacetum, cristatum, Anglicum. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 5. Fig. 1.*
4. Tanacetum; Africanum; arborecens; foliis lavendulæ multifido folio. H. A. 2. 201. H. R. D.
5. Tanacetum; Africanum; frutescens; foliis lavendulæ multifidæ longè minoribus; graveolens. a.
6. Tanacetum; Africanum; fruticans; multiflorum; foliis Tanacetum vulgaris decuplo minoribus. H. A. 2. 199. H. R. D.

BAL-

BALSAMITA. M. H. 3. 2.

Foliis amplis, integris, serratis.
Cetera Tanaceti.

1. Balsamita; major. Dod. p. 295. *Tanacetum, hortense, foliis & odore menthae.* H. L. App. 697. *Mentha, hortensis, corymbifera.* C. B. P. 226. *Mentha, corymbifera, sive costus hortensis.* J. B. 3. 144. *Mentha Sarracenica.* H. Eyst. Æst. o. 7. F. 6. Fig. 3.

AGERATUM. C. B. P. 221.

Flores in umbellas laxiores digesti.
Habitus quidam proprius.

1. Ageratum; Africanum; frutescens; folio crasso, rigido, serrato; flore aureo. *Coma aurea, Africana, frutescens, foliis inferioribus incisis, superioribus dentatis.* Commel. Rar. 41. H. R. D. b.

2. Ageratum; foliis serratis. C. B. P. 221. *Ageratum plerisque, herba Julia quorundam.* J. B. 3. 142. *Balsamita minor.* Dod. p. 295. M. H. 3. 3. *Ageratum.* H. Eyst. Æst. o. 5. F. 8. Fig. 1. *Eupatorium mesue, officinarum. Ptarmica, lutea, suaveolens.* T. 497. H.

3. Ageratum; laciniatis foliis; inodorum; Africanum. Flor. 2. 55. H. L. 227. *Ice. Elichrysum, inodorum, glabrum, coronopi folio, annuum.* Magn. Chrysanthemum, corymbiferum. Triumphett. Ic. 85. *Santolina, Africana, corymbifera, coronopi folio angustiore.* T. 461. *Bellis polyclonos, annua, Africana, coronopi folio, floribus nudis compactis.* M. H. 3. 30. a.

4. Ageratum; quæ ptarmica; incana; pinnulis cristatis. T. Voy. 1. 228. *Abinthium Santonicum, Ægyptiacum.* C. B. P. 139. *Abinthium Ægyptiacum.* Dod. p. 25. H. R. D.

5. Ageratum; quæ ptarmica; Orientalis; santolinæ folio; flore majore. T. Cor. 37. H. R. D.

6. Ageratum; quæ ptarmica; Orientalis; foliis tanaceti incanis; flore aureo. T. Cor. 37. H.

7. Ageratum; Peruvianum; arboreum; folio lato, serrato. *Agerato affinis Peruana, frutescens.* Par. Bat. Prodr. 305. *Elichryso affinis Peruana, frutescens.* H. L. App. 666. *Arbor amara, Recchi vulgò, Quinquina, sive arbor, amara, & febrifuga quibusdam fastuosè nuncupata.* Plukn. 27. 1. *Pseudohelichrysum frutescens, Peruvianum, foliis longis serratis.* M. H. 3. 90. H. R. D.

8. Ageratum; quæ agerato mesue cognata, procerior, Corymbis e luteo albicantibus. a.

Floribus natis in pedunculis ex alis foliorum assurgentibus.

ABSINTHIUM. T. 457. 260.

1. Absinthium; arborescens. *Lob. Ic.* 753. *J. B.* 3. 173. *M. H.* 3.
7. *Abrotanum*, latifolium, arborescens. *C. B. P.* 136. *Abrotanum*, frumina, arborescens. *Dod. p.* 21. *H. R. D.*
2. Absinthium; Orientale; fruticosum; incanum; amplo folio tenuissimè diviso. *T. Cor.* 33. *H. R. D.*
3. Absinthium; Ponticum; seu Romanum officinarum; seu Dioscoridis. *C. B. P.* 138. *Absinthium*, vulgare, majus. *J. B.* 3. 168. *M. H.* 3. 7. *Absinthium latifolium*. *Dod. p.* 23. *Absinthium vulgare*. *H. Eyst. Æst. o.* 12. *F.* 4. *Fig.* 1. †.
4. Absinthium; insipidum; Absinthio vulgari simile. *C. B. P.* 139. *M. H.* 3. 7. *Absinthium insipidum*. *J. B.* 3. 138. *Absinthium inodorum* & insipidum. *Dod. p.* 26. †. a.
5. Absinthium; maritimum; lavendulæ folio. *C. B. P.* 193. *M. H.* 3.
7. *Absinthium*, maritimum, latifolium, sive Matthioli. *J. B.* 3. 174. *Absinthium angustifolium*. *Dod. p.* 26. *Absinthium latifolium*, marinum. *H. Eyst. Æst. o.* 12. *F.* 4. *Fig.* 2. †. *H. R. D.*
6. Absinthium; maritimum; lavendulæ foliis superioribus in aliquot lacinias divisis. *C. B. P.* 139. *Var. Absinthii angustifolii ramulus foliis fissis*. *Dod. p.* 26. †. *H. R. D.*
7. Absinthium; Ponticum; tenuifolium; incanum. *C. B. P.* 138. *Absinthium*, Ponticum, vulgare, folio inferius albo. *J. B.* 3. 175. *M. H.* 3. 1. *Absinthium tenuifolium*. *Dod. p.* 24. *Absinthium*, Ponticum, vulgare. *Clus. H.* 339. *Absinthium*, Ponticum, album. *H. Eyst. Æst. o.* 12. *F.* 4. *Fig.* 3. *H.*
8. Absinthium; folio tenui, multifido; camphoram spirans. *Abrotanum*, mas, incanum. *Col.* 1. 54. *H.*
9. Absinthium; seriphium; montanum; candidum. *C. B. P.* 139. *Absinthium Vallesianum*, tenuifolium, candidum. *J. B.* 3. 179. *M. H.* 3. 9. *H.*
10. Absinthium; Alpinum; incanum. *C. B. P.* 139. *Prodr.* 71. *Absinthium*, pumilum, Camerarii. *Clus. H.* 339.
11. Absinthium; marinum; album. *Ger.* 1099. *Absinthium seriphium Belgicum*. *C. B. P.* 139. *J. B.* 3. 178. *M. H.* 3. 9. *Absinthium seriphium vulgò dictum*. *Camer. Epit.* 458. †.
12. Absinthium; Hispanicum; seriphium; incanum; flore rotundiore. *Salvadore. H.*

ARTEMISIA. T. 460. 260.

Habitu proprio ab Absinthio differt.

1. Artemisia; vulgaris; major; caule & flore purpurascens. C. B. P. 137. M. H. 3. 5. *Artemisia vulgaris*. J. B. 3. 184. *Artemisia latifolia*. Dod. p. 33. †.
2. Artemisia; vulgaris; major; caule ex viridi albicante. C. B. P. 137. Var. †.
3. Artemisia; foliis ex luteo variegatis. H. R. Par. *Artemisia*, foliis variegatis. M. H. Bloef.

ABROTANUM. T. 459.

*Habitu proprio cognoscitur.**Foliis capillaceis ferè viridibus.*

1. Abrotanum; mas; angustifolium; majus. C. B. P. 136. *Abrotanum vulgare*. J. B. 3. 192. *Abrotanum mas*. Dod. p. 21. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 16. Fig. 3. *Abrotanum mas*, vulgare, Fuchsi. M. H. 3. 11.
2. Abrotanum; mas; angustifolium; minus. C. B. P. 136. *Abrotanum*, cum pulchris corymbis. J. B. 3. 194. *Abrotanum*, odoratum, humile. Dod. p. 22.
3. Abrotanum; campestre; cauliculis rubentibus. C. B. P. 136. *Artemisia tenuifolia*, sive leptophyllos, aliis *Abrotanum sylvestre*. J. B. 3. 194. *Artemisia tenuifolia*. Dod. p. 33. M. H. 3. 6. †.
4. Abrotanum; campestre; cauliculis albicantibus. C. B. P. 136. †.
5. Abrotanum; humile; corymbis majoribus aureis. H. R. Par. T. 459. H.
6. Abrotanum; Hispanicum; maritimum; folio crasso, splendente, rigido. T. 459. H.

DRACO. Dod. p. 709.

Foliis alternis, hyssopi æmulis, imis divisis, cæteris integris.

1. Draco herba. Dod. p. 709. M. H. 3. 33. *Dracunculus hortensis*. C. B. P. 98. *Dracunculus hortensis*. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 16. Fig. 2. *Dracunculus hortensis*, sive Tarchon. J. B. 3. 148. *Abrotanum*, lin. folio acriori & odoratq. T. 459.

GYMNOMONOSPERMÆ FLOSCULIS
IN CAPUT FLOSCULOSUM CONGE-
STIS, HINC CAPITATÆ DICTÆ.

His flosculi hermaphroditi, parvi monopetali, mul-
tifidi, singuli proprio caliculo sustentati, arctè
congeruntur in unum majus caput, quod rursus uno cali-
ce est cinctum communi plerumque; singulis flosculis sin-
gula semina subnascuntur ita, ut flos ovario innatus fe-
rè sit. Malp. An. Pl. 51. 209. 209.

Dividuntur in non squamosas, & in squamosas.

CAPITATÆ NON SQUAMOSÆ.

His calix communis in unum tumens capitulum affurgit.

SCABIOSA. T. 463. 263. 264.

*Calix stellatim expansus, profundè dissectus, serie dupli-
ci vel triplici squamarum invicem incumbentium.*

*Flosculorum series exterior reliquis majores, & fert bi-
labiatos, flosculos continet; medii verò intra illos contenti
quadrifidi vel quinquifidi sunt.*

*Ovarii fastigium coronatur specie calicis, pilosi, foliacei,
vel aculeati, quo innatus apici ovarii flos continetur, infe-
rior ejus pars placentæ globosæ innascitur.*

1. Scabiosa; Africana; frutescens. Par. Bat. Ic. 219. Scabiosa, fru-
tescens, Africana, maxima. Par. Bat. 219. Descr. Scabiosa, Africana,
frutescens, rugosis & crenatis foliis, capite rotundo. Par. Bat. Prodr. 375.
M. H. 3. 49. H. R. D.

2. Scabiosa; Africana; frutescens; maxima; foliis rugosis, & cre-
natis; minor. Par. Bat. Descr. 220. Par. Bat. Prodr. 375. M. H. 3.
49. H. R. D.

3. Scabiosa; Africana; frutescens; maxima; foliis tenuissimè inci-
sis. H. R. D.

4. Scabiosa; Alpina; folio centaurei majoris. C. B. P. 270. M. H.
3. 46. Scabiosa, centauroides. Alpin. Exot. 205. Scabiosa, Alpina, cen-
tauroides. H. Eysl. Abb. o. 9. F. 8. Fig. 1.

5. Sca-

5. Scabiosa; pratensis; hirsuta; quæ officinarum. C. B. P. 269. —
Scabiosa, major, communior, hirsuta, folio laciniato. J. B. 3. 2. M. H. 3. 45. Scabiosa, vulgaris, major. Dod. p. 122. Scabiosa vulgaris, & Scabiosa officinarum, floribus è cæruleo purpurascens. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 8. Fig. 3. †.
6. Scabiosa; Alpina; vulgari similis; folio viridiori, magis laciniato; flore purpureo. *Scabiosa, pratensi similis, Alpina. Flor. 2. 55.*
7. Scabiosa; major; communior; hirsuta; folio non laciniato; latifolia. *J. B. 3. 2. M. H. 3. 45. †.*
8. Scabiosa; integrifolia; glabra; radice præmorsâ. H. L. *Succisa, — glabra. C. B. P. 269. Succisa, sive morsus Diaboli. J. B. 3. 11. Scabiosa, folio integro, glabro, flore cæruleo. T. 466. Pucnocnomon. Col. Phytob. 35. 36. Scabiosa, pratensis, nostras, præmorsâ radice. M. H. 3. 45. †.*
9. Scabiosa; folio integro; flore albo. T. 466. *Succisa, glabra, floribus albis. C. B. P. 269. †.*
10. Scabiosa; folio integro; flore incarnato. T. 466. *Succisa, glabra, floribus incarnatis. C. B. P. 269. †.*
11. Scabiosa; Africana; frutescens; folio rigido, splendente, serrato; flore albicante. H. A. 2. 185. H. R. D.
12. Scabiosa; Syriaca; annua; flore cæruleo; syvan ex Syria dicta. H. Maurocen. 157. *Scabiosa integrifolia, syvan dicta. Ind. 47. a.*
13. Scabiosa; altissima; annua; foliis agrimonie nonnihil similibus. H. L. 539. M. H. 3. 46. *Scabiosa, annua, Transylvanica, foliis agrimonie. Breyn. Prodr. 2. a.*
14. Scabiosa; Orientalis; argentea; foliis inferioribus incis. T. Cor. 34. *Scabiosa, argentea, major. Wheleri Itiner. b. H. R. D.*
15. Scabiosa; stellata; folio laciniato; major. C. B. P. 271. *Scabiosa, major, cum pulchro semine. J. B. 3. 9. Scabiosa, major, Hispanica, sive prima. Clus. H. 1. M. H. 3. 50. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 9. Fig. 1. a.*
16. Scabiosa; stellata; folio non dissecto. C. B. P. 271. *Scabiosa, fruticosa, folio non dissecto, peregrina. J. B. 3. 11. Scabiosa peregrina. Lob. Observ. 292. Scabiosa arborea. Alpin. Exot. 34. Scabiosa, arborea, Cretica. Ponce. M. H. 3. 49. Scabiosa, stellata, frutescens, leucoii folio integro, major. Flor. 2. 56. H. R. D.*
17. Scabiosa; stellata; frutescens; leucoii folio minor, unâ alterâve crenâ inciso. Flor. 2. 56. H. R. D.
18. Scabiosa; Indica; prolifera. Hort. Edinb. a.
19. Scabiosa; peregrina; rubra; capitulo oblongo. C. B. P. 270. M. H. 3. 48. *Scabiosa, rubra, peregrina, quibusdam Indica. J. B. 3. 6. Scabiosa, sexta, Indica. Clus. H. 111. Scabiosa, Indica, flore dilutè rubro. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 10. Fig. 2. a.*
20. Scabiosa; peregrina; capitulo oblongo; flore carneo. H. R. Par. *Scabiosa Indica, flore dilutè rubro. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 10. F. 2. a.*
21. Sca-

21. Scabiosa; peregrina; capitulo oblongo; flore atropurpureo. *H. R. Par. Scabiosa, peregrina, capitulo oblongo, nigricante, odore zibethi. C. B. P. 270. Scabiosa, Indica, flore saturatè rubro. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 10. Fig. 1. a.*
22. Scabiosa; peregrina; capitulo oblongo, variegato. *H. R. Par. a.*
23. Scabiosa; capitulo globofo; minor. *C. B. P. 270. M. H. 3. 48. Scabiosa, angustifolia, flore subcæruleo. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 9. Fig. 2.*
24. Scabiosa; capitulo globofo; major. *C. B. P. 270. M. H. 3. 47. Scabiosa media. Dod. p. 122. Scabiosa, minor, vulgaris. J. B. 3. 3.*
25. Scabiosa; folio molli, incano; flore incarnato. *Amati.*
26. Scabiosa; tenuifolia; flore cæruleo; biennis. *Scabiosa V Clus. H. 11. b.*
27. Scabiosa; Catalanixestensis; minor; folio palmato seu cardiacæ; incarnato flore. *H. C. H. Mauroc. 257. Scabiosa, Sicula, folio cardiacæ. T. 465. a.*
28. Scabiosa; capitulo globofo; foliis in tenuissimas lacinias divisis. *C. B. P. 271. M. H. 3. 48. Scabiosa tenuifolia, flore cæruleo. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 10. F. 3. b.*
29. Scabiosa; Alpina; altissima; foliis tenuissimè dissectis; flore cæruleo. *H. Mauroc. 156. Coronâ feminis purpureâ.*
30. Scabiosa; Alpina; altissima; foliis tenuissimè dissectis; flore cæruleo. *H. Mauroc. 156. Coronâ feminis albâ.*
31. Scabiosa; *ωχρολόνω* flore; sive VII, *Clus. H. 111. Scabiosa, Pannonica, flore albo. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 9. Fig. 3. Scabiosa, multifido folio, flore flavescente. C. B. P. 270. M. H. 3. 48.*
32. Scabiosa; *ωχρολόνω* flore; sive VII, *Clus. H. 11. Flore albo.*
33. Scabiosa; Cretica; capitulo pappos mentiente. *T. Cor. 34. a.*
34. Scabiosa; virgæ pastoris folio. *C. B. P. 270. M. H. 3. 45. Scabiosa, latifolia, peregrina. Tab. Ic. 160.*
35. Scabiosa; Orientalis; hirsuta; tenuissimè laciniata; flore parvo, purpureo. *T. G. 34. a.*
36. Scabiosa; fruticans; angustifolia. *C. B. 270. Scabiosa, major, Pannonica, albo flore, vel VIII Clus. H. 111. Scabiosa, montana, calidarum regionum, sive major Lobelii. J. B. 3. 8. M. H.*
37. Scabiosa; foliis argenteis. *Wbeler. H.*
38. Scabiosa; Indica. *Bontii. H.*
39. Scabiosa; argentea; angustifolia. *C. B. P. 270. Prodr. 127. M. H. 3. 49. Scabiosa graminea, argentea. J. B. 3. 12.*
40. Scabiosa; fruticans; angustifolia; alba. *C. B. P. 270. Scabiosa montana, calidarum regionum, major, Lobelii. J. B. 3. 8. Montana scabiosa, calidarum regionum. Lob. Ic. 538.*
41. Scabiosa; flore globofo, niveo. *C. B. P. 270. Scabiosa alba, Belgicorum Hortorum. Clus. H. 1111. Scabiosa Belgica, flore albo. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 8. F. 2.*
42. Sca-

42. Scabiosa; maritima; parva. *J. B.* 3. 7. *M. H.* 3. 48.
 43. Scabiosa; fruticans; latifolia; alba. *C. B. P.* 296. *M. H.* 3. 46.
Scabiosa IX, five æstivalis. Clus. H. 1111.
 44. Scabiosa; altissima; flore cæruleo.
 45. Scabiosa; altissima; flore carneo.
 46. Scabiosa; frutescens; foliis infra integris; flore cæruleo.
 47. Scabiosa; perennis; Sicula; flore sulphureo.
 48. Scabiosa; annua; parva; ramosa; flore parvo, pallidè cæruleo. *a.*

LYCHNI-SCABIOSA.

Calix oblongus, tubulosus, cylindricus, multifidus, profundè sectus, simplex.

Flores quinque exteriores monopetali, infra tubulosi, supra quadrifidi, segmento superiori maximo, binis lateralibus minoribus, infimo brevi & minimo. Flosculi medii tubulosi, quadrifidi; quatuor stamina florum ex pariete interno flosculi cujusque.

Discus calicis, non globosus, ova habet oblonga, quorum apex coronâ Scabiosæ ornatus, intra hanc tenet flosculum, tubamque intra hanc longam emittit.

1. *Lychni-Scabiosa; flore rubro; annua. Scabiosa Orientalis, flore caryophylli quorundam. An Scabiosa Orientalis, villosa, flore suaverubente, fructu pulchro, oblongo. T. C.* 35? *a.*

GLOBULARIA. *T.* 466. 265.

Flosculi unilabiati, multifidi, caliculo proprio innexi, plurimi congeruntur in unum caput floriferum, globosum, calice uno communi succinctum.

Flosculi caliculus fit capsula semen continens, & placentæ communi affixa.

1. *Globularia; vulgaris. T.* 467. *Scabiosa, bellidis folio, humilis, Globularia dicta, caule folioso. M. H.* 3. 51. *Bellis, cærulea, caule folioso. C. B. P.* 262. *Aphyllanthes Anguillare, five Globularia bellidi similis. J. B.* 3. 13. *Bellis, cærulea, Globularia Monspeliensium. Adv.* 199. *Bellis, minor, flore cæruleo, & bellis, pumila, effigie scabiosæ. H. Eyst. Æst.* o. 4. *F.* 2. *Fig.* 3.

CUMINOIDES. T. 300. 155.

*Radix fibrosa, annua.**Folia lobata pimpinellæ sanguisorbæ.**Finis pedunculi explicatur in calicem, qui fit foliolis parvis pinnatis stellatim succingentibus capitulum, in quo**Flosculi polypetali, petalis fimbriatis, caliculo proprio quasi trifoliato, pennato, innexi, plurimi congeruntur arctè in unum caput floriferum, globosum.**Ex centro caliculi succrescens, flosculo caduco, fit semen oblongum, coronâ papposâ instructum.*

1. Cuminoïdes; vulgare. T. 301. Cuminum, sylvestre, capitulis globosis. C. B. P. 146. Cuminum, sylvestre, primum, valde odoratum, globulosum. J. B. 3. 2. 23. Cuminum sylvestre. Dod. p. 300. Umbelliferis affinis, capitulis globosis, & villosis. M. H. 3. 265. a.

STATICE. T. 341. 177.

*Radix fibrosa, perennans.**Folia graminea.**Caulis nudus.**Calix squamosus, membranaceus, multiplici squamarum serie constans, communis est.**Flosculi polypetali, caryophyllæi, caliculo proprio innixi infundibuliformi, monophyllo, profundè secto in quinque segmenta, congeruntur plurimi in unum caput floriferum globosum, calice illo uno communi squamato succinctum.**Ex centro caliculi ovarium, constans quinque ovis accretis in orbem ad basin placentæ, instructis tubâ longâ.*

1. Statice. Lugdun. 1190. Scabiosa, montana, globoso flore, gramineis foliis, latioribus. H. L. Caryophyllus, montanus, major, flore globoso. C. B. P. 211. Caryophyllæus flos, aphyllocaulis, vel juncus, major. J. B. 3. 336. Gramen, polyanthemum, majus. Dod. p. 564. Armerius, montanus, tenuifolius, major. Clus. H. 287. Limonium majus, flore globoso. M. H. 3. 600.

2. Statice; foliis angustioribus; flore rubro. Scabiosa, montana, globoso flore, gramineis foliis angustioribus, flore rubro. H. L.

3. Statice; foliis angustioribus; flore albo. Scabiosa, montana, globoso flore, gramineis foliis angustioribus, flore albo. H. L.

4. Statice; montana; minima. T. 341. Scabiosa, montana, globoso flore,

flore, graminis foliis angustissimis, minima. H. L. Caryophyllus, montanus, minimus, flore globofo. H. R. Par. Caryophyllus, marinus, minimus, flore globofo. M. H. Blaf. Armerius, montanus, tenuifolius, minor. Clus. H. 287. Limonium minimum, vulgatus, flore globofo. M. H. 3. 601.

DIPSACUS. T. 466. 265.

Radix biennis.

Folia conjugata, inferiori costæ parte spinosa.

Finis pedunculi explicatur in multa folia longa, angusta, in aculeum desinentia, quæ instar calicis succingunt caput conicum, longum, obtusum. Malp. An. Pl. 51. 209. H. L.

Id constat axi longo, obtuso, conoideo, cui accrescunt undique foliola rigida, brevia, excavata, aculeato, serrato apice instructa, fungentia vice caliculi flosculorum. Id. 16. H. I. K. B. C. D.

Ex infimâ cavâ partē hujus folioli enascitur ovarium tetragonum longum, cujus apex coronâ quadrangulâ foliaceâ instructum, fungosâ, orbiculâri, placentulâ terminatur, ex cujus centro emittit tubam longam, apice largo instructam. Id. 16. E.

Ex apice ovarii, intrâ coronam ejus, flosculus oritur tubulosus, quadrangulus, quadrifidus, instructus quatuor staminibus natis ex pariete interno floris, longè eminentibus extrâ flosculi supremæ. Id. 16. F. G.

Cuncta hæc ætissimè eidem axi, & densissimè, affixa faciunt caput plantæ.

1. Dipsacus; sylvestris; aut virga pastoris; major. C. B. P. 385. Dod. p. 735. M. H. 3. 168. Dipsacus, sylvestris, sive labrum Veneris. J. B. 3. 74. b.

2. Dipsacus; sativus. C. B. P. 385. Dod. p. 735. J. B. 3. 73. M. H. 3. 168. Carduus Fullonum, sive Dipsacus sativus. Lob. Obs. 487. b.

3. Dipsacus; folio laciniato. C. B. P. 385. J. B. 3. 75. M. H. 3. 168. b.

4. Dipsacus; sylvestris; capitulo minori; vel virga pastoris; minor. C. B. P. 385. M. H. 3. 168. Dipsacus III. Dod. p. 735. b.

ERYNGIUM. T. 327. 173.

Folia in caule alterna.

Caules glabri.

Flosculi pentapetali, in centrum reflexis petalis, parvi, proprio caliculo tubiformi, quinquefido, infra barbato infixi, intra squamulas, in capitulum congesti echinatum, squamosum, ad basin coronâ radiatâ aculeatâ succinctum; quæ capitula in umbellas digeruntur.

Ovarium constat duobus seminibus, foliatis aliquando, vel planis.

1. *Eryngium; maritimum. C. B. P. 386. Dod. p. 730. J. B. 3. 86. Clus. H. CLIX. M. H. 3. 165. Eryngium marinum. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 9. Fig. 1. †.*

2. *Eryngium; vulgare. C. B. P. 386. J. B. 3. 85. M. H. 3. 165. Eryngium campestre. Dod. p. 730. Eryngium, campestre, vulgare. Clus. H. CLVII. †.*

3. *Eryngium; latifolium; planum. C. B. P. 386. M. H. 3. 165. Eryngium, planum, latifolium, capitulo rotundo, parvo. J. B. 3. 88. Eryngium, spurium, primum. Dod. p. 732. Eryngium, Pannonicum, latifolium. Clus. H. CLVIII. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 10. Fig. 1. Flore cæruleo, majus, & minus.*

4. *Eryngium; latifolium; caule ex viridi pallescente; flore albo. C. B. P. 386. Var. Eryngium, Pannonicum, latifolium, caule ex viridi pallescente, flore albo. Clus. H. CLVIII. majus, & minus.*

5. *Eryngium; latifolium; caule & flore amethystino pulcherrimo. An Eryngium, Creticum, erectum, folio multifido, caule & ramis amethystinis. T. Cor. 23. Eryngium montanum amethystinum. C. B. P. 386. M. H. 3. 165. Eryngium totum cæruleum. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 8. F. 4.*

6. *Eryngium; Orientale; foliis trifidis. T. Cor. 23. H.*

7. *Eryngium; planum; minus. C. B. P. 386. M. H. 3. 166. Eryngium, pusillum, planum, Montani. Clus. H. CLVIII. H.*

8. *Eryngium; Orientale; tenuissimè incisum; capite stellato. T. Cor. 23. H.*

9. *Eryngium; planum; latifolium; Creticum; flore cæruleo ex albo misto variegato. Sher. H. Maurocen.*

10. *Eryngium; maritimum, Lusitanicum; folio ampliori. T. 327. H. R. Par. M. H. 3. 165. H.*

11. *Eryngium; Hispanicum; annuum; folio cæcio, splendente; flosculis vix conspicuis. a.*

ECHINOPUS. T. 463. 262.

Habitus Cardui.

Folia alterna.

Flosculi monopetali, quinquefidi, segmentis extrorsum convolutis, fistulosis, parvi, singuli ovarii apici innati intra cor-

ronam ejusdem papposam inherentes, congesti in unum capitulum echinatum, sphericum, sine calice communi, & sine coronâ succingente.

Ovarium oritur ex caliculo ex multis squamosis foliolis, est cylindricum coronâ papposâ ornatum.

Cuncta hæc arētē & densè compacta hærent ad axin, ut faciant caput sphericum.

1. Echinopus; major. J. B. 3. 69. Carduus, sphaerocephalus, latifolius, vulgaris. C. B. P. 381. M. H. 3. 163. Carduus sphaerocephalus. } Dale p. 102 *Cruc.*
Dod. p. 722. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 7. Fig. 1.
2. Echinopus; major; humilior; floribus albidis. Flor. 2. 57. Carduus, sphaerocephalus, latifolius, vulgaris, flore albo. C. B. P. 381. Var.
3. Echinopus; major; flore candido, staminibus in medio cæruleis. T. 463. Carduus, sphaerocephalus, latifolius, vulgaris, flore staminibus in medio cæruleis. C. B. P. 381. Var.
4. Echinopus; folio acanthi aculeati tenuiter laciniato; flore albo. Carduus, sphaerocephalus, capitulo longis spinis armato. C. B. P. 382. Carduus, sphaerocephalus, acutus. Dod. p. 722.
5. Echinopus; minor; annuus; capite magno. T. 463. Carduus, sphaerocephalus, annuus, minor. M. H. R. B. Scabiosa, cardui folio, annua. Par. Bat. Carduus, sphaerocephalus, annuus, Lusitanicus, tenuiter laciniatus. M. H. 3. 164. a.

GYMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMPOSITO, CA- PITATÆ, SQUAMOSÆ.

Florum capita componuntur ex flosculis monopetalis, fistulosis, in lacinias plerumque longas divisas.

Calix communis capitis à flore delapso extumescit in ventrem squamosum, turgidum, capitis æmulum.

Singulis flosculis unum subnascitur semen, quod papposum, aculeatum, coronatum, uno modò casu solidum.

CARDUUS. Raj. Meth. 40.

Folia semper spinosa, alterna.

Capitula plerumque squamis aculeatis constantia.

Spinæ omni parte rigidiores, frequentiores.

Partes plantarum ferè lactescunt, saltem in plurimis.

1. Carduus; pycnopolycephalus; sylvestris; Triumphett. 100. 103. Ic. M. H. 3. 153. a. b.
2. Carduus; spinosissimus; angustifolius; vulgaris. C. B. P. 385. Carduus, sylvestris, tertius. Dod. p. 740. Carduus, caule crispo. J. B. 3. 59. b. Flore purpureo. †.
3. Carduus; spinosissimus; angustifolius; flore albo. b. †.
4. Carduus; caule crispo; capitulis minoribus. b.
5. Carduus; lanceatus; latifolius. C. B. P. 385. M. H. 3. 153. Carduus, lanceolatus, sive sylvestris, Dodonæi. J. B. 3. 58. b. †. Flore purpureo.
6. Carduus; lanceatus; latifolius; flore albo. b. †.
7. Carduus; lanceolatus; ferocior. J. B. 3. 58. b.
8. Carduus; vinearum; repens; folio fonchi; & Carduus, in avenâ proveniens. C. B. P. 377. Ceanothus. Col. Ecphr. 1. 45. Carduus, serpens, levicaulis. J. B. 3. 59. Cirsium, arvense, fonchi folio, radice repente, flore purpurascens. T. 448. Carduus vulgatissimus viarum. Ger. M. H. 3. 156. b. †. Flore purpureo.
9. Carduus; vinearum; repens; folio fonchi; flore albo. C. B. P. 377. Var. b. †.
10. Carduus; albis maculis notatus; vulgaris. C. B. P. 381. M. H. 3. 155. Carduus, Marianus, sive lacteis maculis notatus. J. B. 3. 52. Carduus leucographus. Dod. p. 722. a.
11. Carduus; Mariæ; non maculatus. M. H. Blæs. a.
12. Carduus; maculis albis notatus; exoticus. C. B. P. 381. M. H. 3. 155. Carduus, lacteus, Syriacus. Camer. 35. Ic. X. Carduus, lacteus, peregrinus. Camerarii. J. B. 3. 53. Flore purpureo. Cnicus, albis maculis notatus, flore purpureo. T. 450. a.
13. Carduus; maculis albis notatus; exoticus; flore albo. H. R. P. Cnicus, albis maculis notatus, flore albo. T. 451. Carduus, leucographus, capitulis acutissimis, ferocissimis, spinis eminentibus circumdatus. H. C. b.
14. Carduus; galactites. J. B. 3. 54. M. H. 3. 154. b.
15. Carduus; humilis; alatus; sive Carduus Mariæ; annuus; folio lituris obscuris notato. H. C. b.
16. Carduus; nutans. J. B. 3. 56. Carduus, alatus, major, flore rubro moschato, capite nutante. M. H. 3. 153. b.
17. Carduus; tomentosus; acanthi folio; vulgaris. T. 441. Spina alba,

alba, tomentosa, latifolia, sylvestris. C. B. P. 382. Spina alba, sylvestris, Fuchso. J. B. 3. 54. Acanthium. Dod. p. 721. Carduus alatus, tomentosus, latifolius, vulgaris. M. H. 3. 152. b. †.

18. *Carduus; tomentosus; acanthi folio, angustiore. T. 441. Spina, tomentosa, altera, spinosior. C. B. P. 382. Carduus, quibusdam dictus acanthium Illyricum, aliis vero onopordon. J. B. 3. 55. Onopordon. Dod. p. 738. Acanthium sylvestre, flore albo. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 7. Fig. 2. Carduus, tomentosus, Illyricus, procerior. M. H. 3. 152. †. b.*

19. *Carduus; tomentosus; acanthi folio; altissimus; Lusitanicus. T. 441. Acanthium, altissimum, Lusitanicum. H. R. Par. M. H. 3. 153. Acanthium Lusitanicum. M. H. Blæs. b.*

20. *Carduus; tomentosus; acanthi folio; Alepicus; magno flore. T. 441. Acanthium, ex Alepo, caule alato, flore magno, cæruleo, cineræ instar. H. Edinb. b.*

21. *Carduus; Græcus; parvus; acanthi folio tomentoso; flore minore. T. Cor. 31. b.*

22. *Carduus; Creticus; acanthi folio viridi, & glutinoso; flore purpurascente. T. Cor. 31. b.*

23. *Carduus; eriocephalos. Dod. p. 723. Carduus, capite tomentoso. J. B. 3. 27. Carduus, capite rotundo, tomentoso. C. B. P. 382. M. H. 3. 155. Carduus, tomentosus, & corona fratrum. Lob. Obs. 482. & Park. b.*

24. *Carduus; folio & facie atractylidis; acarna. Col. 1. Ic. 23. Acarna Theophrasti, acorna Plinio. Col. 1. Descr. 26. Carlina, patula, atractylidos folio & facie. T. 500. Carduus, cæruleus, procerior, spinis ternis, per intervalla foliorum marginibus donatus. M. H. 3. 159. H.*

25. *Carduus; canescens; aculeis flavescentibus munitus. Acarne similis, flore purpureo, chamæleon Salmanticensis Clusii. J. B. 3. 91. Cnicus, polycephalus, canescens, aculeis flavescentibus munitus. T. 451. Chamæleon, Salmanticensis. Clus. H. clv. Acarna, major, caule folioso. C. B. P. 379. H.*

26. *Carduus; flore hyacinthino, umbellato. Chamæleon, niger, umbellatus, flore cæruleo hyacinthino. C. B. P. 381. Chamæleon, niger, Cortusi. Dod. p. 729. Carthamus, aculeatus, folio carlinæ, flore multiplici velut umbellato. T. C. 33. Carduus chamæleon dictus, capitulis pluribus, minoribus, cæruleis, corymbatim dispositis. M. H. 3. 159. H.*

27. *Carduus; humilis; aculeatus; ptarmicæ Austriacæ foliis. Triumph. 96. Carduus, stellatus, foliis integris, flore purpureo. H. R. Par. Carduus, stellatus, leucoii lutei foliis. A. R. Par. 69. Carduus, leucoii folio. M. H. Blæs. a. Semina huic pappo carentia.*

28. *Carduus; mollior. Clus. H. cl. b.*

29. *Carduus; Creticus; tomentosus; folio acanthi; flore magno, purpurascente. T. C. 31. b.*

30. *Carduus; Hispanicus; altissimus. Salvad.*

31. Carduus; Orientalis; folio acanthi candidissimo; flore parvo, suaverubente. *T. C.* 31. *b.*

32. Carduus; leucographus; purpureus; capitulis acutissimis, ferocissimis, spinis eminentibus subtus circumdatus. *H. C.* *Est flore albo. a.*

33. Carduus; palustris. *C. B. P.* 377. *Prodr.* 156. *Park.* Carduus, polyacanthos, *III. Ger.* Carduus spinosissimus, erectus, angustifolius, palustris. *M. H.* 3. 153. *b.*

CIRSIIUM. *T.* 447. 255.

Folia spinis molliusculis & brevioribus cineta.

1. Cirsium; maximum; asphodeli radice. *C. B. P.* 377. Cirsium, maximum, foliis carnosiss, bulbosa radice, forte Lutetianum. *J. B.* 3. 44. *M. H.* 3. 150. Cirsium, maximum, montanum, incano folio, bulbosa radice. *Clus. H.* cxlix.

2. Cirsium; Pannonicum; primum; pratense. *Clus. H.* cxlviii. Cirsium, angustifolium, non laciniatum. *C. B. P.* 377. *M. H.* 3. 150. Cirsium, Pannonicum, I Clusio, folio non laciniato. *J. B.* 3. 46. Cirsium, maximum, capite parvo. *Ind.* 51.

3. Cirsium; latissimum. *C. B. P.* 377. Cirsium Dodonæi. *Lugd.* 583.

4. Cirsium; majus; singulari capitulo magno; vel incanum varie dissectum. *C. B. P.* 377. *M. H.* 3. 149. Cirsium Anglicum. *Lob. Obs.* 314. *lc.* & 315. *Descr.* Cirsium Anglicum, II. *Clus. H.* cxlvi. Cirsium Anglicum, radice hellebori nigri modo fibrosa, folio longo. *J. B.* 3. 45. Cirsium Anglicum. *Lugd.* 584. Cirsium, majus, folio subtus incano. *Ind.* 51.

5. Cirsium; singulari capitulo squamato; vel incanum alterum. *C. B. P.* 377. Cirsium, radice asphodeli, folio lato & lucido. *Ind.* 51. Cirsium Britannicum, repens, foliis majoribus, subtus incanis. *M. H.* 3. 149.

6. Cirsium; singularibus capitulis parvis. *C. B. P.* 277. Cirsium, III, & montanum, I. *Clus. H.* cxlix. Cirsium, aliud, Dodonæi. *Lugd.* 583.

7. Cirsium; acanthoides; montanum; flore flavescente. *T.* 448. *Erisithales.* *Lugd.* 1094. Carduus, pratensis, foliis tenuibus, laciniatis. *C. B. P.* 376.

8. Cirsium; latifolium; flore flavescente in capitulo folioso. Carduus, pratensis, latifolius. *C. B. P.* 376. Acanthus sylvestris. *Lugd.* 1443. Carduus pratensis, Tragi. *J. B.* 3. 43. Cnicus, pratensis, acanthi folio, flore flavescente. *T.* 450.

9. Cirsium; maculis argenteis notatum. *T.* 448. Carduus, leucographus, seu Mariæ, hirsutus, capitulo minore. *M. H. R. Blæf. a.*

CINARA. T. 442. 253.

Finis pedunculi explicatur primò in corpus squamosissimum, densissimè compactum. Malp. An. Pl. 41. 123. A. cujus dein squamæ ingentes B. E. latè explicantur, parte inferiori carnosæ, edules; intra has

Discus carnosus, crassus, edulis. Malp. An. Pl. 45. 155. E. E. E. cui innascuntur caliculi. 45. 153. 45. 155. F. D. intra hos ovaria C. Ibid. quorum apici aculeato innascuntur flores monopetali, tubulosi. 45. 155. exteriores, magni, steriles. Ib. D. interiores monopetali, tubulosi, staminibus & tubâ instructi. Id. Ib. 48. 182.

1. Cinara; hortensis; foliis non aculeatis. C. B. P. 383. Carduus domesticus, capite majore, cum squamis dispanfis, viridibus. M. H. 3. 157. Carduus, sive scolymus sativus, non spinosus. J. B. 3. 48. Cinara. Dod. p. 724. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 6. Fig. 1. Artischochi fructus. H. Eyst. Aut. o. 4. F. 4. F. 1. Foliis quandoque aculeatis horridis, aliâs mitioribus, quin & aliquando spinâ omni destitutis.

2. Cinara; spinosa; cujus pediculi esitantur. C. B. P. 383.

3. Cinara; hortensis; non aculeata; capite subrubente. H. R. Par.

4. Cinara hortensis; aculeata. C. B. P. 383. Carduus, sive scolymus sativus, 1, spinosus. J. B. 3. 48.

5. Cinara Bætica.

6. Cinara; sylvestris; Bætica. Clus. Cur. Post. in fol. 35. Carduus Tingitanus, flore magno ceruleo, folio atrachylidis divisurâ subincano, spinis durioribus horridis. Plukn. Phyt. 81. 2. M. H. 3. 158.

CARTHAMUS. T. 457. 258.

Semen omni pappo carens.

1. Carthamus; officinarum; flore croceo. T. 457. Carthamus, sive Cnicus. J. B. 3. 79. Cnicus sativus, sive Carthamum officinarum. C. B. P. 378. M. H. 3. 145. Cnicus vulgaris. Clus. H. cl. 11. Cnicus sativus. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 3. Fig. 1. a.

2. Carthamus; Africanus; frutescens; folio ilicis; flore aureo. H. R. D.

3. Carthamus; aculeatus; carlinæ folio; flore multiplici, velut umbellato. T. C. 33. Vid. Card.

CNICUS. T. 450. 257.

Capitula succincta coronâ ex foliis plurimis complicatis constructâ.

1. Cnicus; perennis; cæruleus; Tingitanus. H. L. Carduus cæruleus, erectus, Tingitanus, Cnici facie, foliis magis integris. M. H. 3. 159. H.

2. Cnicus; atractylis lutea dictus. H. L. Atractylis lutea. C. B. P. 379. Atractylis vera, flore luteo. J. B. 3. 83. Atractylis. Dod. p. 736. Atractylis, Theophrasti & Dioscoridis, succo sanguineo. Col. 1. 19. & 23. Ic. Carduus luteus, erectus, reticulatus, ramis fusum referentibus. M. H. 3. 160. a.

3. Cnicus; atractylis purpurea dictus. Atractylis purpurea. C. B. P. 379. Atractylis, flore purpureo. Lugd. 1468. Cnicus, aculeatus, purpureus, humilior. T. 451. a.

4. Cnicus; exiguus; capite cancellato; semine tomentoso. T. 451. Carduus parvus. J. B. 3. 93. Carduus, minimus. Alpini. Exot. 254. a.

5. Cnicus; sylvestris; hirsutior; sive Carduus benedictus. C. B. P. 378. Carduus benedictus. J. B. 3. 75. Dod. p. 737. H. Eyst. Æst. 6. 11. F. 8. Fig. 2. Carduus luteus, procumbens, sudorificus, & amarus. M. H. 3. 160. a.

6. Cnicus; sive Carduus benedictus; ex Chio. Volk. a. Foliis hæc latioribus, magisque carnosiss, cætera præcedenti simillima herba.

7. Cnicus; Hispanicus; arborefcens; foetidissimus. T. 451. H.

8. Cnicus; cæruleus; humilis; & mitior. T. 451. Eryngium minimum, mitius, capitulo magno. H. R. Par. H.

9. Cnicus; cæruleus; asperior. C. B. P. 378. T. 456. Carthamus, sive Cnicus, flore cæruleo. J. B. 3. 80. Cnicus flore cæruleo, Cnicus alter Clusii. Lob. Ic. 19. Cnicus peregrinus, flore cæruleo. H. Eyst. Æst. 6. 11. F. 5. F. 3. Carduus erectus, cæruleus, Cnici facie, foliis dissectioribus. M. H. 3. 159.

JACEA HERMANNI. Flor. 2. 40. Raj. Meth.

Folia, caulesque, spinis carentia.

Folia marginibus æqualibus, non serratis.

1. Capitulis spinosis. Carduis adscribit. T. 440. 441. 442.

1. Jacea; stellata; folio papaveris erratici. H. L. Flor. 2. 40. Carduus, stellatus, folio papaveris erratici. C. B. P. 387. Carduus stellatus, sive cal-citrapa. J. B. 3. 89. T. 440. Carduus stellatus. Dod. p. 733. Hippopha-stum, vel Hippophaës, Dioscoridis. Col. Phyt. 107. Jacea ramosissima, ca-pite longis aculeis stellatim nascentibus armata. M. H. 3. 144. b.

2. Ja-

2. *Jacea*; stellata; spina solstitialis dicta; foliis cyani. *Flor.* 2. 40. —
Jacea, lutea, capite spinoso, minori. *H. L. Carduus*, stellatus, luteus,
 foliis cyani. *C. B. P.* 387. *T.* 440. *Spina solstitialis*. *Dod.* p. 734. *J. B.*
 3. 90. *Spina solstitialis*, mitior, *Apula*, sive *carduus stellatus*, minor.
Col. 1. 30. 31. *Jacea lutea*, annua, stellata, & alata, foliis cyani. *M.*
H. 3. 145. a.
3. *Jacea*; Melitensis; capitulis conglobatis. *Bocc. Rar. Sic.* 65. *M.*
H. 3. 145. *Carduus*, Melitensis, capitulis conglobatis. *T.* 442. a.
4. *Jacea*; Sicula; cichorii folio; flore luteo; capite spinoso. *Bocc.*
Rar. Sic. 14. *M. H.* 3. 144. *Jacea*, Sicula, erucæ folio, echinata, *A. R.*
Par. 87. *Carduus*, Melitensis, erucæ folio, flore luteo. *T.* 442. a.
5. *Jacea*; lutea; spinosa; centauroioides. *C. B. P.* 272. *M. H.* 3.
 144. *Jacea*, major, flore luteo. *H. Eyst. Æst.* o. 11. *F.* 4. *Fig.* 1. *Jacea*
lutea. *Clus. H.* viii. *Carduus*, luteus, centauroioides, segetum. *T.* 441.
Spina, solstitialis, altera. *Dod.* p. 134. *Centaureum collinum*, sive *Jacea*
spinosa, flore luteo. *J. B.* 3. 34.
6. *Jacea*; spinosa; alato caule; capite lanuginoso. *Carduus*, *Lusi-*
tanicus, canescens, alato caule, capite lanuginoso. *T.* 441. a.
7. *Jacea*; laciniata; sonchi folio. Sive *Jacea*, latifolia, purpurea,
 capitulo spinoso. *C. B. P.* 272. *Prodr.* 128. *Descr. H. L.* 675. *M. H.* 3.
 142. *Carduus*, maritimus, canescens, alato caule. *T.* 441.
8. *Jacea*; spinosa; Cretica; an species hyosiridis Plinii? *Zan.* 105.
Cyanus, Creticus, spinosus, rapi folio. *H. R. Par. Carduus*, Creticus,
 rapi folio. *T.* 442. a.
9. *Jacea*; sphaerocephala; spinosa; Tingitana. *H. Edinb. H. L.*
 335. *M. H.* 3. 143. *Carduus*, sphaerocephalus, Tingitanus. *T.* 441. *H.*
10. *Jacea*; cyanoïdes; caule alato. *Par. Bat.* 189. *Id. & Descr. Jacea*,
cyanoïdes, altera, alato caule. *Vall. H. R. Par. M. H.* 3. 143.
11. *Jacea*; cyanoïdes; echinato capite. *C. B. P.* 272. *M. H.* 3. 143.
Stæbe, Salmantica, II. *Clus. H.* ix. *Cyanoïdes flos*. *Dod.* p. 251. *Flore*
purpureo. a.
12. *Jacea*; cyanoïdes; echinato capite. *C. B. P.* 272. *Var. Flore al-*
bo. a.
13. *Jacea*; foliis seridis candicantibus; purpurea. *C. B. P.* 372. *Car-*
duus, Hispanicus, purpureus, foliis cichorei. *T.* 442. *Jacea*, purpurea,
Hispanica, muricata. *J. B.* 3. 33. a.
14. *Jacea*; stellata; folio papaveris erratici. *H. L. Flore albo.* a.
15. *Jacea*; Orientalis; spinosa; folio erysimi; flore luteo. *Car-*
duus Orientalis, folio erysimi, flore luteo. *Nissole.* a.
16. *Jacea*; cum spinosis capitulis; purpurea; tenuifolia. *J. B.* 3.
 33. *Stæbe*, squamis asperis. *C. B. P.* 273. *Carduus*, *Jacea* folio, capitulis
 minoribus cum squamis tricuspidibus. *T.* 442. a.
17. *Jacea*; minor; folio hieracii; capite spinoso. *Barr. Ic.* 160.
Videtur eadem 15. a.

18. *Jacea*; qui *carduus pumilus*; *supinus*; folio *Jaceæ incanæ*, & tenui. *Barr. Obs.* 919. a.

19. *Jacea*; qui *carduus*; *stellatus*; *luteus*; capitulo minus spinoso. *H. R. Par. T.* 440. *Spina solstitialis*, *mitior*, *Apula. Col.* 1. 31. a.

2. *Spinis* vel *nullis omnino*, vel *mollibus parvis admodum*.

Jacea. T. 443.

20. *Jacea*; *arborea*; *argentea*; *Ragulina*; item species *hyosiridis*. *Zan* 107. *Jacea*, *Epidaurica*, *candidissima*, & *tomentosa. T.* 445. *Jacea Cretica*, *lutea*, *foliis cinerariæ. Dod. M. H.* 3. 141. *H.*

21. *Jacea*; *Lusitanica*; *sempervirens. H. R. Par. M. H.* 3. 139. *Jacea*, *Lusitanica*, *maxima*, *sempervirens. A. R. Par.* 85. *Jacea*, *maxima*, *Lusitana. Virid. Lusitan. H.*

22. *Jacea*; *nigra*; *pratensis*; *latifolia. C. B. P.* 271. *M. H.* 3. 139. *Jacea*, *nigra*, *vulgaris*, *capitata*, & *squamata. J. B.* 3. 27. *Jacea*, *nigra*, *flore purpureo. H. Eyst. Æst.* 0. 11. *F.* 5. *Fig.* 2. †.

23. *Jacea*; *latifolia*; capite *hirsuto. C. B. P.* 271. *Jacea*, *III*, *Austriaca*, *villosa capite. Clus. H.* 411.

24. *Jacea*; *nigra*; *laciniata. C. B. P.* 271. *Jacea*, *Austriaca*, *VI. Clus. H.* 411. *M. H.* 3. 139. *Jacea nigra. Dod. p.* 124. †.

25. *Jacea*; *major. Ger. Jacea*, *rubra*, *latifolia*, *laciniata. C. B. P.* 269.

26. *Jacea*; *humilis*; *purpurea*; folio *laciniato parum*, *cinereo. Videtur Jacea*, *integrifolia*, *humilis. C. B. Prodr.* 127. *Descr. C. B. P.* 271. *M. H.* 3. 139.

27. *Jacea*; *montana*; *Narbonensis. Lob. Obs.* 293. *Lugd.* 1193.

28. *Jacea*; *montana*; *incana*; capite *pini. C. B. P.* 272. *M. H.* 3. 141. *Jacea*, *montana*, capite *magno strobili. J. B.* 3. 30. *Jacea*, *montana*, *acanophora. Lugd.* 1192. *Centaureum majus*, *incanum*, *humile*, capite *pini. T.* 449. *H.*

29. *Jacea*; *cinerea*; *laciniata*; flore *purpureo. Triumph.* 72. *M. H.* 3. 141. *H.*

30. *Jacea*; *montana*; *candidissima*; stæbes *foliis. C. B. P.* 272. *Prodr.* 128. *lc. & Descr. Jacea*, *montana*, *candidissima. M. H.* 3. 141. *H.*

31. *Jacea*; *foliis cichoraceis*, *villosis*; *altissima*; flore *purpureo. T.* 444. *Stæbe major*, *foliis cichoraceis*, *mollibus*, *lanuginosis. C. B. P.* 273. *Stæbe*, *Salmanticensis*, *prior Clusii*, *sive Jacea intybacea. J. B.* 3. 36. *Stæbe Salmantica*, *I. Clus. Hist.* 1x. *Jacea*, *major*, *foliis cichoraceis*, *mollibus*, flore *stamineo. M. H.* 3. 140. a.

32. *Jacea*; *foliis cichoraceis*, *villosis*; *altissima*; flore *albo. T.* 444. *Stæbe*, *major*, *foliis cichoraceis*, *mollibus*, *lanuginosis*, flore *albo. H. R. Par. a.*

33. *Jacea*; *foliis cichoraceis*; *altissima*; *aspera*; *Mauritanica. Stæbe*, *foliis cichoraceis*, *asperiusculis*, *Mauritanica*, flore *purpureo. Par. Bat. Prodr.* 378. a.

34. Jacea; caliculis argenteis; major. T. 444. Stæbe, caliculis argenteis. C. B. P. 273. Stæbe, squamata, argentea. J. B. 3. 30. Stæbe, Salmantica, III. Clus. H. x. Jacea, non spinosa, foliis magis divisis, elatior, capitulis splendidibus. M. H. 3. 140. H.

35. Jacea; foliis candicantibus, laciniatis; caliculis non splendidibus. T. 444. Stæbe, major, caliculis non splendidibus. C. B. P. 273. Centaurii majoris species, tenuifolia. J. B. 3. 31. Jacea alba. Lugd. 1192. Jacea, non spinosa, foliis magis dissectis, elatior, capitulis minoribus, non splendidibus. M. H. 3. 140. H.

36. Jacea; Orientalis; cyani folio; flore parvo; calice argenteo. T. C. 32. a.

37. Jacea; foliis erucæ, lanuginosis. T. 444. Stæbe, major, foliis erucæ mollibus, lanuginosis. C. B. P. 273. Stæbe, Salmantica, II. Clus. H. 1x. Jaceæ genus, stæbe Salmantica, foliis mollibus, lanuginosis, caule infirmo. J. B. 3. 30. H.

38. Jacea; cyanoïdes; caule alato. Lippii. a.

39. Jacea; montana; saxatilis; argentea; pennato, auriculato, acuto, folio; capitulis nigris, dilutè purpureis. H. C. 101. a.

40. Jacea; folio eleganter laciniato, albo. a.

41. Jacea; Orientalis; folio cyani; flore parvo; calice argenteo. T. C. 32. a.

CENTAURIUM MAJUS. T. 444. 256.

Radix perennis.

Folia non spinosa, serrato margine.

Calix non spinosus, squamosus.

Flos magnitudine speciosâ.

1. Centaurium; majus; Orientale; erectum; glasti folio; flore luteo. T. Cor. 32. Commel. Rar. 39. Ic. & Deser.

2. Centaurium; majus; folio helenii incano. T. 449. Centaurium majus, Rha capitatum, folio enulæ subtus hirsuto, & incano. J. B. 3. 41. M. H. 3. 132. Rhaponticum, folio helenii incano. C. B. P. 117. Rha, capitatum, helenii folio. Lugd. 1700. Rha, sive Rhei, ut æstimatur. Icon. Dod. p. 389.

3. Centaurium; majus; folio helenii, angustiore. T. 449. Rhaponticum, angustifolium, incanum. C. B. P. 117. Centaurium, majus, alterum, capitatum, angustiore, incano, & integro folio. M. H. 3. 132. Rha, Ponticum, alterum, angustiore folio. Lobel. Lugd. 1701.

4. Centaurium; majus; Alpinum; luteum. C. B. P. 117. Prodr. 56. M. H. 3. 132. Centaurioides, folio glabro, flore flavescente. J. B. 3. 40. Centaurium majus, luteum. Corn. 70.

5. Centaurium; folio cinaræ. Corn. 72. Centaurium, majus, foliis cinaræ. M. H. 3. 131.

6. Cen-

6. Centaurium; majus; folio in lacinias plures diviso. *C. B. P.* 117. *Centaurium magnum. Dod. p. 334. Centaurium, majus, I, vulgare. Clus. H. x. Centaurium majus, juglandis folio. J. B. 3. 38. M. H. 3. 131. Rha, Ponticum, officinarum. J. B. 3. 38.*

7. Centaurium; majus; flore exalbido. *Ind. 54. An Centaurium majus, folio nucis juglandis, flore obsolete incarnato. Par. Bat. App. 5?*

8. Centaurium; majus; alterum; laciniatum; purpurascente flore. *H. R. Par.*

9. Centaurium; majus; folio molli, acuto, laciniato; flore aureo, magno; calice spinoso. *Jacea, levis, maxima, centaurioides, Apula. Col. 1. 33. H.*

SERRATULA. *Raj. Meth. 40.*

Foliorum margines magis serrati & minutius.

Capitulis minoribus Centaurii majoris.

1. Serratula. *C. B. P.* 235. *J. B. 3. 23. Dod. p. 42. Serratula Tinctoris. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 4. Fig. 2. Jacea nemorensis, quæ Serratula vulgò. T. 444. Serratula, vulgaris, foliis laciniatis. M. H. 3. 133.*

2. Serratula; flore candido. *C. B. P.* 235. *Jacea nemorensis, quæ Serratula vulgò, flore albo. T. 444.*

3. Serratula; Virginiana; foliis rigidis. *Par. Bat. 227. Ic. & Descrip. M. H. 3. 133.*

4. Serratula; Noveboracensis; altissima; foliis doriæ mollibus, subincanis. *Par. Bat. Prodr. M. H. 3. 133.*

Semine coronâ pilosâ elegantissimè coronato.

5. Serratula; annua; semine ciliari elegantissimo. *Jacea, annua, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore. T. 444. Cyanus, pulchro semine centaurii majoris. J. B. 3. 24. Centaurium, capitatum, ciliare, annuum, foliis laciniatis, serratis. M. H. Blæs. 362. Chondrilla, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore. C. B. P. 130. Senecio-Carduus, Apulus. Col. 1. 34. Centaurium, ciliare, annuum, foliis laciniatis, & serratis. M. H. 3. 131. a.*

CYANUS. T. 445. 254.

Finis pedunculi exit in calicem squamosum valde, lateribus squamarum pilosis. Malp. An. Pl. 41. 121. Intra hunc Discus fere planus, fungosus. Malp. An. Pl. 45. 154. B. Huic innascuntur

Ovaria oblonga, ferè cylindrica, superius annulo cinctâ, unde pili lanuginosi erecti. Id. Ib. F. G. Intra hos pilos ovario innascitur

Flos in exteriori margine magnus, tubulosus, in cornu copiae exiens. Id. Ib. C. D. Hi steriles, tubâ & staminibus carentes ferè semper. Flores interiores minores, tubulosi, supra exeuntes in ventrem orâ quinquefidâ. Id. Ib. G. H. Ex pariete interno floris inferiore stamina in tubam cœuntia, atque arctè amplectentia longam tubam, bifido apice instructam, ex centro apicis ovarii enatam. Id. Ib. I. & 48. 181.

Flosculi ambitum constituentes floris majoris sunt majores, monopetali, veluti bilabiati.

Flosculi meditullium occupantes minores, atque æqualiter divisi.

1. Cyanus; montanus; latifolius; vel verbasculum cyanoïdes. C. B. P. 273. Cyanus, Alpinus, radice perpetuâ. J. B. 3. 23. M. H. 2. 134. Cyanus major. Dod. p. 251. H. Eyst. Vern. o. 7. F. 6. Fig. 2.

2. Cyanus; angustiore folio & longiore; Belgicus. H. R. Par. M. H. 3. 134.

3. Cyanus; floridus; odoratus; Turcicus; five Orientalis; major. Park. Theatr. 481. M. H. 3. 134. Flore purpureo. a.

4. Cyanus; floridus; odoratus; Turcicus; five Orientalis; major; flore albo. H. R. Par. M. H. 3. 134. a.

5. Cyanus; floridus; odoratus; Turcicus; five Orientalis; major; flore incarnato. H. L. a.

6. Cyanus; floridus; odoratus; Turcicus; five Orientalis; major; flore luteo. H. L. a.

7. Cyanus; segetum; flore cæruleo. C. B. P. 273. Cyanus, hortenſis, flore simplici. C. B. P. 273. Cyanus. J. B. 3. 21. Papaver, Heracleum, Theophrasti & Dioscoridis. Col. Phytob. 93. Cyanus, arvensis, flore cæruleo. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 7. Fig. 1. Cyanus, segetum, vulgaris, minor, annuus. M. H. 3. 134. a. †.

8. Cyanus; segetum; flore albo. C. B. P. 273. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 7. Fig. 3. a. †.

T

9. Cya-

9. Cyanus; segetum; flore purpureo. *C. B. P.* 273. *H. Eyst. Ibid.*
Fig. 4. a. †.
 10. Cyanus; segetum; flore incarnato. *C. B. P.* 273. *H. Eyst. Ibid.*
Fig. 2. a. †.
 11. Cyanus; segetum; flore violaceo. *C. B. P.* 273. *a. †.*
 12. Cyanus; segetum; flore rubro. *H. Eyst. Ibid. Fig. 5. a. †.*
 13. Cyanus; segetum; flore albo, fundo immaculati candoris. *H. R. Par. a. †.*
 14. Cyanus; segetum; flore ex albo violaceo. *Tabern. Ic.* 148. *a. †.*
 15. Cyanus; segetum; flore albo, umbilico caeruleo, violaceo, purpureo. *H. Eyst. Ibid. Fig. 6. a. †.*
 16. Cyanus; segetum; flore albo, fundo purpureo. *C. B. P.* 273. *H. Eyst. Ibid. Fig. 7. a. †.*
 17. Cyanus; segetum; flore albo, fundo carneo. *H. R. Par. a.*
 18. Cyanus; segetum; flore albo, fundo atropurpureo. *H. R. Par. a.*
 19. Cyanus; hortensis; flore pleno, caeruleo. *C. B. P.* 274. *a.*
 20. Cyanus; hortensis; flore pleno, purpureo. *C. B. P.* 274. *a.*
 21. Cyanus; hortensis; flore pleno medio, purpureo. *C. B. P.* 274. *a.*
 22. Cyanus; frutescens; Hispanicus.

† LAPP. *T.* 450. 256.

Folia maxima, orbicularia.

Squamæ capitulorum in mucrones hamatos desinunt.

1. Lappa; major; arctium Dioscoridis. *C. B. P.* 198. *M. H.* 3.
 146. *Personata, sive Lappa major, vel Bardana. J. B.* 3. 570. *Bardana, sive Lappa major. Dod. p.* 38. *b. †.*
 2. Lappa; major; montana; capitulis tomentosis; sive arctium Dioscoridis. *C. B. P.* 198. *M. H.* 3. 147. *Personata, altera, cum capitulis villosis. J. B.* 3. 571. *b. †.*

GYMNODISPERMÆ, STELLATÆ.

His caules quadranguli.

Folia ad nodos caulium, instar radiantis stellæ, per intervalla circumnata, caules coronant.

Finis pedunculi ovarium sustinet, quod constat binis ovibus subrotundis, arctè concretis, sed per maturitatem separandis: emittit medium apicis ovarii duas tubas breves, apice scabro, rotundulo, instructas.

Flos hermaphroditus, nudus, monopetalus, ovarii apici innatus, absque caliculo, parte inferiori utcumque tubulosus, superiori quadrifariam in quatuor segmenta, acuta, stellatim expansa, profundè sectus, rarò in quinque: stamina respondentia numero segmentorum, oriuntur vel ex interiori tubulosa parte, si hæc paulò major, vel ex ipsis interstitiis segmentorum suprâ in flore, si pars tubulosa brevior, vel deficiens.

Itaque caules quadrati, folia verticillatim nata, flos monopetalus, faciunt, ut verticillatis, quam umbelliferis gymnodispermis, propior gens hæcce censeatur, & gentilitii characteris castè observans.

RUBIA. T. 113. 38.

Folia aspera.

Fructus constat binis baccis succulentis, fœtis semine umbilicato. Malp. An. Pl. 69. 282.

1. Rubia; Tinctorum; sativa. C. B. P. 333. M. H. 3. 326. Rubia sativa. J. B. 3. 714. Rubia. Dod. p. 352. Rubia major. Clus. H. CLXXVII.

2. Rubia; sylvestris; aspera; quæ sylvestris Dioscoridi. C. B. P. 333. M. H. 3. 326. H.

T 2

3. Ru-

3. Rubia; sylvestris; Monspessulana; major. *J. B.* 3. 715. *H.*
4. Rubia; quadrifolia; asperrima, lucida; peregrina. *H. L. H.*

MOLLUGO. *C. B. P.* 334.

Folia mollia, quina, vel plura, nec aspera, nec villosa.
Fructus constat binis seminibus siccis lunatis.

1. Mollugo; montana; latifolia; ramosa. *C. B. P.* 334. *Mollugo.* *Dod. p.* 354. *Clus. H.* CLXXVI. *Rubia, sylvatica, lævis. J. B.* 3. 716. *Gallium, montanum, latifolium, ramosum. T.* 115. *Mollugo, montana, latifolia, erectior. M. H.* 3. 330.
2. Mollugo; hexaphyllos; latifolia; caule firmiori, rubello, tenui; flore albo. *Rubia, Pyrenaica, folio Molluginis. Tournef. Flor.* 2. 58. *Ind.* 56. *H.*
3. Mollugo; Americana; folio parietariae. *Vaill. Anonymos Americana, foliis parietariae scabris, floribus albis, ad foliorum ortum vix conspicuis. Plukn. Phyt.* 136. 4. a.

GALLIUM. *C. B. P.* 335.

Folia molliora adhuc. Cætera ut Mollugini.

1. Gallium; luteum. *C. B. P.* 335. *T.* 115. *M. H.* 3. 327. *Gallium verum. J. B.* 3. 720. *Gallium. Dod. p.* 355. †
2. Gallium; saxatile; glauco folio. *Bocc. Mus. Part. 2. Tab.* 116. *T.* 115. *Gallium, saxatile, glabro folio. Bocc. Mus. Part. 2. pag.* 172. *H.*
3. Gallium; rubrum. *C. B. P.* 335. *M. H.* 3. 332. *Gallium, rubro flore. Clus. H.* CLXXV. *H.*
4. Gallium; nigro-purpureum; montanum; tenuifolium. *Col.* 1. 298. a.
5. Gallium; album; linifolium. *Barr. Obs.* 99. *Rubia lævis, lini folio, floribus albis. Barr. Ic.* 356. *H.*

CRUCIATA. *T.* 115. 39.

Folia mollia, ut Gallio, quaterna ad eundem caulis nodum posita, cætera Molluginis.

Sunt verò 1. Floribus nascentibus in summitate caulium. Spicata dictæ.

1. Cruciata; glabra; folio nervoso, rigido; baccâ gemellâ, siccâ, hispida; flore lacteo. *Rubia erecta, quadrifolia. J. B.* 3. 716. *Mollugo montana, erecta, quadrifolia. Raj. Syn.* 117.
2. Cruciata; glabra; folio rotundiore, nervoso, rigido, minori; bac-

câ gemellâ, sicca; flore lacteo. *In appellatione, descriptione, & synonymiâ, harum Plantarum tricas offendi, ex quibus me expedire non potui: vix ideo ausus Auctorum nomina addere.*

3. Cruciata; palustris; parva; procumbens; flore albo spicato. *An Cruciata, palustris, alba. T. 115? Gallium palustre album. C. B. P. 335.*

4. Cruciata; glabra. *C. B. P. 335.*

5. Cruciata; Orientalis; latifolia; erecta; glabra. *T. Cor. 4. H.*

2. Floribus caulem ambientibus. Verticillatæ dictæ.

1. Cruciata; minima; sessilis; flosculo albo verticillato. *An Cruciata, minima. T. 115?*

2. Cruciata; angustifolia; flosculo luteo, verticillato. *Rubeola, repens, lutea, foliis spinosis. C. B. P. 334. Rubia, minima, Lobelii. Lugd. 1330. †.*

3. Cruciata; tomentosa; flosculis luteis in corniculis longis, hispidis. *a.*

ASPERULA. *C. B. P. 334.*

Folia numero incerta, quatuor plura.

Flores in fastigio caulium in formam umbellæ dispositi.

Fructus siccus, constans binis globulis, fœtis semine umbilicato.

1. Asperula; hexaphyllos; purpurea. *C. B. P. 334. J. B. 3. 720. Myagrum, alterum, minus, Dalechampii. Lugd. 1137. Rubia, procumbens, hexaphyllos, purpurea. H. L. a.*

2. Asperula; odorata; flore albo. *Dod. p. 355. M. H. 3. 331. Asperula, sive rubeola, montana, odora. C. B. P. 334. Rubia, montana, odora. H. L. Rubiis accedens, Asperula quibusdam, sive hepatica stellaris. J. B. 3. 719. Aparine, latifolia, humilior, montana. T. 114.*

3. Asperula; erecta; cærulea. *Asperula, cærulea, arvensis. C. B. P. 334. M. H. 3. 332. Rubia, cærulea, erectior, elatiorve. J. B. 3. 719. Gallium, arvense, flore cæruleo. T. 115. Asperula cærulea. Dod. p. 355. a.*

4. Asperula; erecta; alba. *Rubia, alba, erectior, elatiorve. Flor. 2. 59. a.*

5. Asperula; cærulea; repens. *Rubeola, arvensis, cærulea, repens. C. B. P. 334. Prodr. 145. M. H. 3. 332. Rubeola, parva, flore cæruleo, se spargens. J. B. 3. 719. Aparine, supina, pumila, flore cæruleo. T. 114. a.*

6. Asperula; Italica; palustris; aspera; octophyllos.

APARINE. T. 114. 39.

*Radix annua.**Folia, & caules, aspera valde, numero incerta.**Flores sparsim nascentes.*

1. Aparine; vulgaris. C. B. P. 334. *Aparine*. Dod. p. 353. J. B. 3. 713. M. H. 3. 331. a. †.
2. Aparine; minor; atrovirens; semine minore. a.
3. Aparine; semine lævi. T. 114. *Aparine*, semine leviori. Raj. H. 484. *Aparine*, foliis brevioribus, & semine leviori. M. H. 3. 332. a.
4. Aparine; semine coriandri saccharati. Park. Theatr. 567. *Aparine*, fructu verrucoso. Juncq. Hort. *Aparine*, semine verrucoso. M. H. 3. 332. a.
5. Aparine; maxima; semine sphærico, glaberrimo. a.

RUBEOLA. T. 130. 50.

*Folia quaterna, vel plura.**Flos monopetalos, infundibuliformis, quadrifidus, Ovario vel uni vel gemino insidens.**Ovarium verò ipse fit fructus dispermus.*

1. Rubeola; latiore folio. T. 130. *Rubia*, latifolia, spicata. C. B. P. 334. *Rubia*, spicata. Imperat. 666. J. B. 3. 727. *Rubia*, spicata, *Cretica*. Clus. H. CLXXVII. *Pseudo-rubia*, latifolia, spicata. M. H. 3. 333. a.
2. Rubeola; angustiore folio. T. 130. *Rubia*, angustifolia, spicata. C. B. P. 334. Prodr. 145. *Pseudo-rubia*, spicata, angustifolia. M. H. 3. 333. a.



GYMNOTETRASPERMÆ, VERTICILLATÆ.

Omnes ferè aromaticæ, calidæ, suavi, vel graveolenti, halitu manifestæ.

Caules plerumque quadranguli.

Folia ad caulem opposito situ conjugata, sequente serie versum contrarium semper obtinente ita, ut desuper conspicienti ad decussim composita appareant.

Calix florum oblongus, monophyllos, quinquesfidus, tubulum, vel cucullum chartaceum, referens ita, ut plerumque segmentum supremum cæteris sit longius.

Flores monopetali, imâ parte tubulum simulante, summâ verò multifidâ, exeunt in varias admodum figuras, ut plurimum in quatuor partes, quarum superior & erectior galea, vel labium superius, inferior & propendens labium inferius vel barba, binæ laterales genæ vel fauces appellantur. Ex interiore, inferiore, tubulosâ, parte floris orta semper quatuor stamina, instructa suis testiculis, connivent, intra floris galeam labiumque tecta latent, tubamque ovarii arctè circumapposita hærent.

Hi flores calicibus innexi, & margini ovarii in imo fundo calicis adnati, caulem ad nodos coronant verticilli modo per intervalla, ita tamen, ut in quibusdam intervalla hæc adeò confertim coëant, ut spicam imitentur, in quibusdam ab unâ modò parte.

In fundo calicis, ex apice pedunculi, enascitur placentula fungosa, cui ovarium innascitur constans quatuor semper ovis, arctè connexis; ex centro apicis placentæ tuba erigitur,
inter

inter unita quatuor ova assurgens, longa, apice acuto bifido prædita, qui apex sollicitè inter quatuor testiculos staminum absconditur, dum flos clausus, postea verò altius eminet; ova in fundo calicis tanquam in vasculo maturescunt.

Ordo integer harum Plantarum commodè digeritur in tres lineas. Prima continet eas, quibus flos galeâ & barbâ ornatur; Bilabiatas vocant. Altera complectitur illas, quæ florem barbatum nec galeatum habent; Unilabiatas vel Barbatas dixere. Tertia denique habet flosculis præditas, in quibus vix galea vel barba apparet, Simples fortè nominandas.

1. Bilabiatae.

LAVANDULA. T. 198. 93.

Floris galeâ subrotundâ, bifidâ plerumque, erectâ; barbâ tripartitâ, segmentis ferè equalibus.

Verticilli densius congesti in spicas tenues, graciles, ad fastigia caulium & ramorum natas.

Odor suavis, singularis.

1. Lavandula; latifolia; Indica; subcinerea; spicâ brevior. H. R. Par. T. 198. Lavandula latifolia. Raj. H. 513. Lavendula, latifolia, sterilis. M. H. 3. 352. Tab. post. pag. 452. Ic. H. R. D.

2. Lavandula; latifolia. C. B. P. 216. *Λδὸν ἀπὸ*, quæ Lavandula vulgò. J. B. 3. 281. Lavandula. Dod. p. 273. Lavendula, flore cæruleo & flore albo. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 6. Fig. 3. Lavendula major, sive vulgaris. Park. M. H. 352. H.

3. Lavandula; angustifolia. C. B. P. 216. Flore cæruleo. Lavandula altera. Dod. p. 273. Lavendula, minor, sive spica. Ger. M. H. 3. 352. Spica vulgaris, flore cæruleo. H. Eyst. Aut. o. 3. F. 3. F. 3. H.

4. Lavandula; angustifolia; flore albo. C. B. P. 216. *Λδὸν ἀπὸ*, quæ Lavendula, flore albo. J. B. 3. 281. Spica vulgaris, flore albo. H. Eyst. Aut. o. 3. F. 3. Fig. 2. H.

5. Lavandula; folio dissecto. C. B. P. 216. Lavandula, multifido folio. J. B. 3. 281. Clus. H. 345. Flore cæruleo. Lavendula, multifido folio, Hispanica. M. H. 352. b. H.

6. Lavandula; folio dissecto; flore albo. b. H.

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 153

7. Lavandula; folio longiori, tenuius & elegantius dissecto. T. 198. Commelin. Rar. 27. Lavandula, Canarica, foliis tenuius divisis. M. H. 3. 353. b. H.
8. Lavandula; maritima; Canariensis; spicâ multiplici, cæruleâ. Plukn. Alm. Phyt. T. 303. Fig. 5. b. H.

STOECHAS. T. 201. 95.

Galeâ erectâ, bifidâ, barbâ tripartitâ; flos apparet quinquefidus.

Spicæ florum crassæ, squamatæ, foliolis coloratis in cacumine coronatæ.

1. Stœchas; purpurea. C. B. P. 216. Stœchas, Arabica vulgò dicta. J. B. 3. 277. Stœchas, brevioribus ligulis. Clus. H. 344. M. H. 3. 353. Stœchas. Dod. p. 275. H.
2. Stœchas; folio serrato. C. B. P. 216. Dod. p. 275. M. H. 3. 354. Stœchas, crispo folio. Clus. H. 345. Stœchas, serrato & crispo folio. J. B. 3. 279. Lavandula, foliis crenatis. T. 198. H.
3. Stœchas; cauliculis non foliatis. C. B. P. 216. Stœchas, longioribus ligulis. Clus. H. 344. H. b.

STACHYS. T. 186. 86.

Folia, caules, rami, villosa, incana, mollissimâ lanugine.

Galeâ fornicatâ, erectâ, bifidâ parum, barbâ trifidâ, segmento medio magno, pendulo.

Flores primò in verticillos densos, deinde versus cacumen in spicas congeruntur.

1. Stachys; major; Germanica. C. B. P. 236. Stachys Fuchsi. J. B. 3. 319. Dod. p. 90. Sideritis, Heraclea Dioscoridis. Col. Phytob. 1. 31. Stachys, folio densiore, candicante, serrato & acuto, major. M. H. 3. 381. b.
2. Stachys; major; Germanica; folio angustiore. Flor. 2. 66. b.
3. Stachys; Cretica; pro pseudo-stachyde I in prodromo describitur. C. B. P. 236. Prodr. 113. Stachys, sive pseudo-stachys Cretica, latifolia. M. H. 3. 381. b. H.
4. Stachys; Alpina; magna; flore ex albo rubescente. Pseudo-stachys Alpina. C. B. P. 236. Prodr. 113. Stachys, sive pseudo-stachys Alpina. M. H. 3. 381. H. b.
5. Stachys; Creticæ similis; flore purpureo triplo majore. b. H. b.

154 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

6. Stachys; minor; Italica. C. B. P. 236. Stachys. Dod. p. 90. Stachys, folio candicante, densiore, non serrato, minor. M. H. 3. 381. H.
7. Stachys; verticillata; odora; betonicae foliis pallidis. H. C. 2.
8. Stachys; Canariensis; frutescens; verbasci folio. T. 186. H. A. 2. 197. Stachys, amplissimis verbasci foliis, floribus albis, parvis, non galeatis, spica betonicae. Plukn. Almag. Salvia, sylvestris, amplissimis verbasci foliis, graveolens, flore albo, parvo, Canariensis. Plukn. Almag. & Phytogr. T. 322. Fig. 4. Stachys, Canarica, frutescens, salviae folio, flore candido, arvida salva incolis nominata. M. H. 3. 382. H.
9. Stachys; hormini folio obscure virenti; flore ferrugineo. M. H. Bloef. 198. M. H. 3. 382. Stachys, hormini folio. Flor. 2. 66.
10. Stachys; spinosa; Cretica. C. B. P. 236. M. H. 3. 382. Gaidarothymum. Alp. Exot. 86. Sideritis spinosa. J. B. 3. 328. H. b.
11. Stachys; Orientalis; altissima; foetidissima. T. Cor. 12. Folio, & caule, candidissimo, floris luteoli galea striata. H.
12. Stachys; alba; latifolia; major. Barr. H.
13. Stachys; Cretica; latifolia. T. 186. Voy. 1. H.

BETONICA. T. 202. 96.

Folia crenata, rugosa, viridia.

Galea erecta, imbricata, bifida, barba trifida, segmento medio bifido, majore.

Flores primo in verticillos, deinde ad superiora in spicas, digesti.

1. Betonica; major; Danica. Park. Theatr. 615. M. H. 3. 365. An Betonica, major. Clus. H. xxxviii?
2. Betonica; purpurea. C. B. P. 235. Betonica, vulgaris, purpurea. J. B. 3. 301. Clus. H. xxxix. M. H. 3. 365. Betonica. Dod. p. 40.
3. Betonica; alba. C. B. P. 235. Betonica, flore albo. J. B. 3. 302. Betonica, albido flore. Dod. p. 39.
4. Betonica; flore carneo.
5. Betonica; minima; Alpina; Helvetica. Park. Theatr. 614. M. H. 3. 365.
6. Betonica; minima; Alpina; folio eleganter variegato.
7. Betonica; maxima; folio scrophulariae; floribus incarnatis. Par. Bat. 106. Deser. & Ic. Betonica, Virginiana, elatior, foliis scrophulariae glabris, flore carneo. M. H. 3. 366. Sideritis Canadensis, altissima, scrophulariae folio, flore flavescente. T. 192. a.
8. Betonica; maxima; folio scrophulariae; floribus luteo-pallidis. Schol. Bot. Par. Betonica, Virginiana, elatior, foliis scrophulariae glabris, flore ochroleuco. M. H. 3. 365. b.

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 155

9. *Betonica*; *Orientalis*; folio angustissimo & longissimo; spicâ
florum crassiore. *T. Cor.* 13. *T. Voy.* 2. 296.
10. *Betonica*; *Alpina*; *incana*; *purpurea*. *Barr.*

THYMUS. *T.* 196. 93.

Folia brevia, angusta, rigida.
Caules lignosi, parvi, erecti.
Galeâ surrectâ plerumque bifidâ, barbâ tripartitâ.
Flosculi congesti in capitula, verticillo inferiore remotius
â capitulo hærente.

1. *Thymus*; *vulgaris*; folio latiore. *C. B. P.* 219. *M. H.* 3. 402.
Thymum durius. *Dod.* p. 276. *H.*
2. *Thymus*; *vulgaris*; folio tenuiore. *C. B. P.* 219. *Thymum, vul-*
gare, rigidius, folio cinereo. *J. B.* 3. 2. 263. *Thymus vulgaris.* *H. Eyst.*
Aut. o. 3. *F.* 1. *Fig.* 3. *Thymum, vulgare, durius.* *M. H.* 3. 401. *H.*
3. *Thymus*; *capitatus*; qui *Dioscoridis.* *C. B. P.* 219. *Thymum* —
Creticum, sive Antiquorum. *J. B.* 3. 2. 262. *Thymum cephaloton.* *Dod.* p.
276. *Thymum legitimum.* *Clus.* *H.* 357. *Hyssopus, capitata, minor,*
Thymi odore. *M. H.* 3. 362. *H.*
4. *Thymus*; *vulgaris*; folio tenuiore, candido & graveolente. *C.*
B. P. 219. *Thymus, folio variegato.* *H. R. Par.* *Thymus, foliis candicanti-*
bus, & graveolentibus. *H. R. Par.* *M. H.* 3. 401. *H.*
5. *Thymum*; *legitimum*; *cephalotes*; *angustifolium.* *Salvad.*

SERPILLUM. *T.* 196. 93.

Folia Thymi foliis latiora.
Caules procumbentes, minus lignosi, & duri.
Cætera Thymo quam simillima.

1. *Serpillum*; *vulgare*; *majus.* *C. B. P.* 220. *M. H.* 3. 403. *Flore* 3.
purpureo. *H.*
2. *Serpillum*; *vulgare*; *minus.* *C. B. P.* 220. *Serpillum vulgare.* *J.* 5
B. 3. 2. 269. *Dod.* p. 277. *M. H.* 3. 403. *Serpillum, vulgare, repens.*
Clus. *H.* 359. *H.*
3. *Serpillum*; *vulgare*; *minus*; folio ex albo & viridi vario. *H.*
L. H.
4. *Serpillum*; *angustifolium*; *hirsutum.* *C. B. P.* 220. *Serpillum,*
montanum, repens, hirsutum. *C. B. P.* 220. *Serpillum, angusto, lanu-*
ginosoque folio. *J. B.* 3. 2. 270. *Serpillum, Pannonicum, III.* *Clus.* *H.*
360. *M. H.* 3. 403. *H.*
5. *Serpillum*; *Africanum*; *hirsutissimum.* *Vaill.* *H.*
6. *Serpillum*; *foliis citri odore.* *C. B. P.* 220. *M. H.* 3. 403. *Ser-* 14
pil-

156 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

pillum, citrii odore. *J. B.* 3. 270. *Serpillum citratum*. *H. Eyst. Aut.* 6. 3. *F.* 1. *F.* 2. *H.*

MASTICHINA.

Folia Serpilli foliis majora.

Caules surrecti, fruticosi.

Calix longus angustus, tubulosus, supra explicatus in quinque longas, gracilissimas lacinias, cujus omnes partes subtili lanugine pubescunt ita, ut mera lanugo appareat.

Galea surrecta bifida, barba trifida, ut fere appareat pentapetaloides.

Verticilli densiores, flosculi compacti in capitula oblonga, lanuginosa, candida.

1. *Mastichina*. *Thymra Hispanica*, majorane folio. *T.* 197. *Marum peregrinum*. *H. Eyst. Æst.* 0. 14. *F.* 7. *Fig.* 2. *Sampsuchus*, sive *marum*, *mastichen redolens*. *C. B. P.* 224. *Marum vulgare*, sive *clinopodium*. *Dod.* p. 271. *Clinopodium quibusdam*, *mastichina Gallorum*. *J. B.* 3. 2. 243. *Marum vulgare*. *M. H.* 3. 372. *H. R. D.*

MARRUBIUM. *T.* 192. 91.

Folia rugosa.

Calix longus, quinque aculeatis appendiculis plerumque instructus.

Galea surrecta, bicorni, barba tripartita, faucibus oblongis, gracilibus.

1. *Marrubium*; album; vulgare. *C. B. P.* 230. *M. H.* 3. 376. *Marrubium album*. *J. B.* 3. 2. 316. *Marrubium vulgare*. *H. Eyst. Æst.* 0. 7. *F.* 6. *Fig.* 1. *Clus. H.* xxxi i i i i. *Marrubium*. *Dod.* p. 87.

2. *Marrubium*; folio rotundo, candidissimo. *An Marrubium*, album, candidissimum, & villosum. *T. Cor.* 12? *H.*

3. *Marrubium*; album; latifolium; peregrinum. *C. B. P.* 230. *M. H.* 3. 377. *Marrubium*, candidum, folio subrotundo. *J. B.* 3. 317. *Marrubium candidum*. *Dod.* p. 87. *Marrubium*, alterum, *Pannonicum*. *Clus. H.* xxxi i i i i. *H.*

4. *Marrubium*; album; angustifolium; peregrinum. *C. B. P.* 230. *M. H.* 3. 377. *Marrubium*, album, angustiore folio. *J. B.* 3. 317. *Marrubium*, *Creticum*, angustifolium. *H. Eyst. Æst.* 0. 6. *F.* 9. *Fig.* 3. *H.*

5. *Marrubium*; verticillatum; foliis profundè incis. *Flor.* 2. 67. *Marrubium*, *alysson dictum*, foliis profundè incis. *H. L.* *Marrubium*, *Hispanicum*, calice stellato & aculeato. *T.* 192. *Alysson*, verticillatum, fo-

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 157

liis profundè incis. C. B. P. 232. *Alysson Galeni. Clus. H. xxxv. Dod. p. 88. Marrubium, album, foliis profundè incis, flore cæruleo. M. H. 3. 377. b.*

6. Marrubium; Hispanicum; supinum; foliis sericeis, argenteis. T. 192. Marrubium, album, sericeo, parvo, & rotundiori folio. Bocc. Mus. p. 2. 78. Tab. 69. a. b.

7. Marrubium; folio candidissimo, orbiculari, crassissimo. An Marrubium, album, candidissimum, & villosum. T. C. 12.?

8. Marrubium; album; peregrinum; brevibus & obtusis foliis. C. B. P. 230. Marrubium, Creticum, angustis foliis, inodorum. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 6. Fig. 2. H.

9. Marrubium; Orientale; foliis subrotundis; flore purpureo. T. C. 12. b. H.

LAMIUM. T. 183. 85.

Galea cavâ integrâ, barbâ bifidâ, cordiformi.

Calix quinquefidus, instar tubi oblongus.

Semina triangularia.

1. Lamium; purpureum; foetidum; folio subrotundo; five Galeopsis Dioscoridis. C. B. P. 230. Lamium, annuum, vulgare, rubrum. M. H. 3. 385. Galeopsis, five urtica iners, folio & flore minore. J. B. 3. 323. Urtica, iners, altera. Dod. p. 153. a. †.

2. Lamium; purpureum; foetidum; folio subrotundo; minus. H. L. a. †.

3. Lamium; album; foetidum; folio subrotundo. C. B. P. 231. Var. a. †.

4. Lamium; album; foetidum; folio subrotundo; minus. C. B. P. 231. Var. a. †.

5. Lamium; album; non foetens; folio oblongo. C. B. P. 231. Galeopsis, five urtica iners, floribus albis. J. B. 3. 322. Urtica, iners, five Lamium primum. Dod. p. 153. Lamium, album, vulgare, five Archangelica, flore albo. Park. Tb. 604. M. H. 3. 384. †.

6. Lamium; purpureum; non foetens; folio oblongo. C. B. P. 231. Galeopsis, five urtica iners, flore purpurascente, majore, folio non maculato. J. B. 3. 321. Lamium, album, vulgare, five Archangelica, purpureis floribus. M. H. 3. 384. †.

7. Lamium; parietariae facie. M. H. Blæs. Lamium, annuum, rubrum, parietariae foliis. M. H. 3. 385. a.

8. Lamium; parietariae facie; flore albo. a. *

9. Lamium; maximum; sylvaticum; rubrum. Flor. 2. 68. Lamium maximum, sylvaticum, alterum. C. B. P. 231. Galeopsis, maxima, flore magno, rubro. J. B. 3. App. 853. Galeopsis, maxima, Pannonica. Clus. H. xxxvi. Lamium, Pannonicum, majus, non repens, flore majore ex rubro variegato. M. H. 3. 385.

V 3 10. La-

153 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

10. *Lamium*; foliis caulem ambiens; majus. C. B. P. 231. a. †.
11. *Lamium*; folio caulem ambiens; minus. C. B. P. 232. M. H. 3. 386. *Galinsoga*, seu *ortus iberi*, minus, foliis caulem ambiens. J. B. 3. App. 853. a. †.
12. *Lamium*; rubrum; minus; foliis profundè incis. Raj. Synopf. 129. Pluk. Pb. xli. 3. a.
13. *Lamium*; maximum; fortens; purpureum; galea hormini. *Horminum*, *hyssopifolium*, *latifolium*, *verticillatum*. C. B. P. 238. *Gallitrichis affinis plantae*, *horminum hyssopifolium*, *latifolium*, *Clusio*. J. B. 3. 314. *Horminum*, *hyssopifolium*, III. Claf. H. xxix. *Horminum*, *scutellariae folio crasso*. Vulk. & Hofmann. hoc titulo misere.
14. *Lamium*; albi lineâ notatum. C. B. P. 231. *Lamium*, *montanum*, *Campoclaudianum*. Col. 1. 192. H.
15. *Lamium*; quæ Moldavica; Orientalis; hederæ terrestris folio. T. Cor. 11. Vaill.
16. *Lamium*; Italicum; maximo flore rubro; glabrum.
17. *Lamium*; perenne; villosum, folio cataractæ crispo; flore magno, variegato. Vaill.

CLINPODIUM. T. 195. 92.

Calix longus, tubulosus, quinquefidus, hirsutus, densissimè aggestus.

Galea rotundulâ, surrectâ, bifidâ, barbâ tripartitâ.

Flores in verticillis densis, cauli circumpositis arctissimè.

Semina oblonga.

1. *Clinopodium*; origano simile; elatius; majore folio. C. B. P. 225. M. H. 3. 374. *Clinopodium quorundam*, *origani facie*. J. B. 3. 2. 250. *Acinos*. Lob. Obs. 269.
2. *Clinopodium*; Alpinum; roseum; satorejæ foliis. Bocc. Musf. p. 119. a.
3. *Clinopodium*; angustifolium; minus; pulegii odore; Romanum. Bocc. Musf. p. T. 45. a.
4. *Clinopodium*; Orientale; hirsutum; foliis inferioribus ocymum, superioribus hyssopum, referentibus. T. Cor. 12. a.
5. *Clinopodium*; Canadense; fistulosum; foliis dilutè virentibus & hirsutis. Flor. 2. 69. *Clinopodium*, *Canadense*, *fistulosum*. M. H. Blaf. 382. *Origanum*, *fistulosum*, *Canadense*. Cornut. 14. *Leonurus*, *Canadensis*, *origani folio*. T. 187.
6. *Clinopodium*; Canadense; fistulosum; foliis saturatius virentibus & hirsutis. Flor. 2. 69. *Clinopodium*, *Canadense*, *majus*, *hirsutius*, *floribus fistulosis*. M. H. 3. 374.

7. Cli-

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 159

7. Clinopodium; Orientale; humile; verticillis florum singularibus & crassioribus. *T. Cor.* 12. a.

8. Clinopodium; fistulosum; pumilum; Indiae Occidentalis; summo caule floridum. *Plukn.* a.

9. Clinopodium; spicatum; & verticillatum; Lusitanicum. *T.* 195. *Bigula, odorata, Lusitanica. Corn.* 46. a.

CANNABINA.

Galea cavâ, surrectâ, barbâ trifidâ, segmento medio ampliori.

Verticilli Lamii æmuli.

Caliculi ampli, aculeati, densè aggesti ut in Clinopodio, segmentis calicis in aculeos exeuntibus.

Folia cannabim imitantia.

1. Cannabina; flore purpurascente. *Galeopsis, procerior, caliculis aculeatis, flore purpurascente. T.* 185. *Urtica, aculeata, foliis serratis. C. B. P.* 232. *Cannabis sylvestris quorundam, urticæ inerti similis. J. B.* 3. *App.* 854. *Lamium, annuum, procerius, urticæ folio, verticillis spinosis. M. H.* 3. 386. †. a.

2. Cannabina; flore albo. *Galeopsis, procerior, caliculis aculeatis, floribus candidis. T.* 185. *Urtica, aculeata, foliis serratis, floribus candidis. C. B. P.* 232. a. †.

3. Cannabina; flore magno, luteo; labiis purpureis. *Galeopsis, angustifolia, flore variegato. T.* 185. *Cannabis, spuria, angustifolia, variegato flore, Polonica. Barrell. Ic.* 1158. *Observ.* 241. *Lamium, annuum, procerius, urticæ foliis, flore luteo amplo, labio purpureo. M. H.* 3. 386. *Lamium cannabinum, aculeatum, flore specioso luteo, labiis purpureis. Plukn. Ph.* xli. 4. a. †.

PHLOMIS. *T.* 177. 82.

Radix perennis.

Folia crassa.

Galea magnâ, cavâ, falcatâ, barbâ trifidâ, segmento medio, magno, lato, fimbriato, exporrecto ultra galeam; barbæ arctè incumbens galea.

Calix tubus pentagonus, brevis, amplus, dentatus modò.

Semina oblonga.

1. *Phlomis, Narbonensis; folio hormini; flore purpurascente. T.* 178. *Marrubium, nigrum, longifolium. C. B. P.* 230. *M. H.* 3. 378. *Herba venti, Monspeliensibus. J. B.* 3. *App.* 854. *Herba venti. Lob. Obs.* 286. *H.* 2. *Phlo-*

160 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

2. *Phlomis*; fruticosa; *salviae* folio latiore, & rotundiore. *T.* 177. *Verbascum*, *latis salviae foliis*. *C. B. P.* 240. *Verbascum*, *sylvestre*, *alterum*. *Dod.* p. 146. *Verbascum*, *sylvestre*, *Matthioli*. *Clus. H.* xxviii. *Pseudo-salvia*, *major*, *lutea*, *vulgatior*, *latifolia*. *M. H.* 3. 397. *H.*
3. *Phlomis*; fruticosa; *salviae* folio longiore, & angustiore. *T.* 177. *Verbascum sylvestre*. *Dod.* p. 146. *Phlomis lychnitis*. *Lob. Obs.* 301. *Clus. H.* xxviii. *Verbascum*, *sylvestre*, *flore luteo hianse*. *J. B.* 3. 307. *Pseudo-salvia*, *fruticosa*, *minor*, *lutea*, *verbasci foliis incanis*. *M. H.* 3. 397. *H.*
4. *Phlomis*; fruticosa; folio subrotundo; brevior; flore luteo. *Phlomis*, *Cretica*, *fruticosa*, folio subrotundo; flore luteo. *T. Cor.* 10. *Verbasculum*, *salvisfolium*. *Alpin. Exot.* 109. *Pseudo-salvia*, *minor*, *Cretica*, *lutea*. *M. H.* 3. 397. *H.*
5. *Phlomis*; *Samia*; herbacea; folio *lunariae*. *T. Cor.* 10. *Phlomis*, *Orientalis*, folio *lunariae*. *Ind.* 62. *H.*
6. *Phlomis*; *Orientalis*; foliis laciniatis. *T. Cor.* 10. *H.*
7. *Phlomis*; *Orientalis*; angusto & longiori folio; flore luteo. *T. Cor.* 10. *H.*

HYSSOPUS. *T.* 200. 95.

Folia oblonga angusta.

Galea surrecta, subrotunda, bifida, barba trifida, segmento medio instar cochlearis cavo, bicuspidata, & quasi alato.

Verticilli densi, longè primò distantes, deinde in spicam congesti, unam modò partem caulis occupant.

1. *Hyssopus*; officinarum; caerulea, seu spicata. *C. B. P.* 217. *Hyssopus*, *vulgaris*, *angustifolius*, *flore caeruleo*. *J. B.* 3. 274. *Hyssopus vulgaris*. *Dod.* p. 287. *Clus. H.* 356. *M. H.* 3. 361. *Hyssopus*, *flore caeruleo*. *H. Eyst. Æst. o.* 11. *F.* 10. *Fig.* 4.
2. *Hyssopus*; latifolia. *C. B. Prodr.* 107.
3. *Hyssopus*; vulgaris; alba. *C. B. P.* 218. *M. H.* 3. 361. *Hyssopus*, *flore albo*. *H. Eyst. Æst. o.* 11. *F.* 10. *Fig.* 2.
4. *Hyssopus*; rubro flore. *C. B. P.* 217. *M. H.* 3. 361. *H. Eyst. Æst. o.* 11. *F.* 10. *Fig.* 3. *Hyssopus*, *Arabum*, *rubro flore*. *Lob. Obs.* 237. *Hyssopus*, *vulgaris*, *spicatus*, *angustifolius*, *flore rubro*. *J. B.* 3. 274.
5. *Hyssopus*; montanum; Macedonicum; Valerandi Dourez. *J. B.* 3. 276. *H.*
6. *Hyssopus*; angustifolia; montana; aspera. *C. B. P.* 218. *Hyssopus*, *montana*. *Matth.* 516. *Hyssopus*, *montana*, *Fuchsi*. *Lugd.* 934. *H.*
7. *Hyssopus*; humilior; myrti.olia. *H. R. Par.*

SATUREJA. T. 197. 93.

Folia oblonga, angusta.

Caliculi parvi, acuti, ex uno pedunculo plures, pedunculus utrinque unus.

Galea erecta, bifida, barba trifida, segmento medio crenulato.

Flores in alis foliorum sparsi, non congesti in capita, nec dispositi verticillatim, nec crescentes in pediculis ramosis.

1. Satureja; sativa. J. B. 3. 272. Satureja hortensis, sive cunila — sativa Plinii. C. B. P. 218. Satureja. Dod. p. 289. Satureja domestica. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 3. Fig. 2. Satureja, annua, cunila dicta, vulgaris. M. H. 3. 411. a.

Ob similitudinem faciei totius, odoris, saporisque in hanc familiam inseruntur.

2. Satureja; montana; durior; flore in pediculis ramosis ex alis — foliorum. Satureja montana. C. B. P. 218. Satureja durior. J. B. 3. 272. Thymbra legitima. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 3. Fig. 3. Thymbra. Dod. p. 288. Calamintha, frutescens, Satureje folio, facie, & odore. T. 194. Satureja, hortensis, perennis, vulgaris. M. H. 3. 411. H.

3. Satureja; Cretica; folio rigido, brevi, crasso. Satureja Cretica. C. B. P. 218. Thymbra legitima. Clus. H. 358. T. 197. Tragoriganum. Alpin. Exot. 78. 79. Tragoriganum, Creticum, minus, tenuius. Id. Ibid. in Descrip. H.

4. Satureja; Cretica; folio rigido, crassiore, majore. Tragoriganum, Creticum, folio & ramo majori crassiorique, foliis asperioribus. Alpin. Exot. 79. in Descript. Satureja, Cretica, latiore folio. M. H. 3. 412. H.

5. Satureja; spicata. C. B. P. 218. Satureja, foliis tenuibus, sive tenuifolia S. Juliani quorundam. J. B. 3. 273. Thymbra Sancti Juliani, sive Satureja vera. Lob. Adv. 182. T. 198. Tragoriganum, II. Clus. H. 355. Satureja, perennis, verticillis spicatim & densius dispositis. M. H. 3. 412. H. b.

6. Satureja; Cretica; angusto, oblongo, folio, in pediculis ramosis ex alis foliorum. Calamintha, Cretica, angusto, oblongo, folio. T. 194. Clinopodium Creticum. Alpin. Exot. 265. a.

7. Satureja; Virginiana. Par. Bat. Satureja, floribus in summitate dispositis. H. L. Thymus, cephalotes, autumnalis, longiore folio. T. 196. Serpentaria Virginiana. Bocc. Mus. P. 2. 161. Tab. 108. 115. H.

8. Satureja; major; frutescens; verticillis densissimis. Tragorigani secundi altera species. Clus. H. 355. H.

9. Satureja; an Cretica; spicata. Sherard. H. Mauror? a.

GALEOPSIS. T. 185. 86.

*Calix quinquesfidus, infundibuliformis.**Galea cavâ integrâ, barbâ trifidâ, segmento medio majore.*

1. Galeopsis; procerior; foetida; spicata. T. 185. *Galeopsis, five urtica iners, magna, foetidissima.* J. B. 3. App. 853. *Galeopsis, legitima, vel vera, Dioscoridis.* Clus. H. xxxv. xxxvi. *Lamium, maximum, sylvaticum, foetidum.* C. B. P. 231. *Urtica Herculeâ.* Tab. Ic. 536. *Stachys, foetida sepium, flagellis reptatricibus.* M. H. 3. 382. †.
2. Galeopsis; palustris; folio betonicæ; flore variegato. T. 185. *Galeopsis, angustifolia, foetida.* J. B. 3. App. 854. *Stachys, palustris, foetida.* C. B. P. 236. M. H. 3. 383. *Lyfimachia, galericulata.* *Lyfimachia, galericulata, adulterina.* H. Eyst. Æst. o. 10. F. 7. Fig. 3. *Clymenum, minus, Dalechampii.* Lugd. 1357. a. †.
3. Galeopsis; patula segetum; flore purpurascens. T. 185. *Sideritis, arvensis, angustifolia, rubra.* C. B. P. 233. *Ladanum, segetum, flore rubro, quorundam.* J. B. 3. 855. *Alysson, Galeni, flore purpureo.* Tab. Ic. 541. *Lamium, arvense, annuum, angustifolium, rubrum, verticillis spinosis.* M. H. 3. 386. a. †.
4. Galeopsis; five urtica iners; flore luteo. J. B. 3. 323. T. 185. *Lamium, folio oblongo, luteum.* C. B. P. 231. M. H. 3. 385. *Urtica, iners, tertia, five lamium, luteo flore.* Dod. p. 153. †.
5. Galeopsis; lutea; amplioribus foliis, maculatis. T. 186. *Lamium maculatum.* C. B. P. 231. M. H. 3. 385. *Urtica, mortua, maculis albis respersa.* Col. *Lamium, luteum, foliis maculatis.* Sutherl. H. Edinb.
6. Galeopsis; lutea; foliis pallidis viridibus, marginibus candidis.
7. Galeopsis; Hispanica; frutescens; teucrii folio. T. 186. *Lamium, perenne, arboreum, ex Cretâ.* Zanon. 112. *Teucrium, regium, latifolium, flore albo.* H. R. Par. *Melissa, fruticosa, Cretica, sempervirens, teucrii facie, flore albo.* M. H. 3. 408. *Huic folia rotundiora.* H.
8. Galeopsis; angustifolia; Cretica; viscosa. *Asphaltium, glutinosum, Creticum.* Flor. 2. 78. *Sideritis, viscosa, Cretica, bitumen redolens.* Zanon. 186. *Sideritis, glutinosa, bitumen redolens.* M. H. R. Blaf. M. H. 3. 389. II.
9. Galeopsis; quod lamium; fruticans; teucrii folio lucido; calice & flore magno candido, tantillâ purpurâ variè notato. H. C. 106. II.
10. Galeopsis; folio urticæ; flore luteo; flagellis procumbentibus. co.
11. Galeopsis; folio urticæ aureo variegato; flore luteo; flagellis procumbentibus. co.
12. Ga-

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 163

12. Galeopsis; foetida; angustifolia; humilior. *H. Chelsey. co.*
 13. Galeopsis; palustris; folio betonicae latissimo; flore variegato. *co.*
 14. Galeopsis; Alpina; betonicae folio; flore variegato. *T. 185. Pseudo-stachys Alpina. C. B. P. 236. Stachys, quae Galeopsis Alpina, betonicae folio, flore variegato. Vaill. b. H.*

SCLAREA. *T. 179. 82.*

Foliola verticillis subjecta diversae formae à caeteris.

Folia inferiora rugosa, texturae rarioris.

Calix tubulosus, quinquefidus, quasi bilabiatus. Malp. An. Pl. 41. 118.

Galea falcata, longa, adunca, barba tripartita, segmentum medium bifidum, & cavum. Malp. An. Pl. 43. 141. 47. 168.

Flores plerumque seni nodos caulium circulatim coronant, & quasi spicati componuntur.

Semina subrotunda.

1. Sclarea. *Tab. Ic. 373. T. 179. Horminum, Sclarea dictum. C. B. P. 238. Horminum, sylvestre, I. Clus. H. xxviii. Horminum hortense. H. Eyst. Aest. o. 8. F. 2. Fig. 1. Gallitrichum sativum. J. B. 3. 309. Orvala. Dod. p. 292. Horminum, sativum, vulgare, sive Sclarea. M. H. 3. 392. b. †.*
 2. Sclarea; flore albo. *b.*
 3. Sclarea; Syriaca; flore albo. *T. 179. Horminum Syriacum. C. B. P. 238. Prodr. 114. Ic. & Descr. M. H. 3. 392. H. Eyst. Aest. o. 8. F. 2. Fig. 2. Horminum Syriacum, glutinosum, Aethiopidis folio, flore niveo. H. Mauroc. Horminum, Syriacum, Sclarea dicto congener. An Bisermas Camerarii? H. R. Par. b.*
 4. Sclarea; Orientalis; folio rotundo; flore magno, partim albo, partim purpurascete. *T. Cor. 10. H.*
 5. Sclarea; Lusitanica; glutinosa; amplissimo folio. *T. 179.*
 6. Sclarea; vulgaris; lanuginosa; amplissimo folio. *T. 179. Horminum, Aethiopicum, incanum, Aethiopsis dictum, foliis sinuosis. H. L. Aethiopsis, foliis sinuosis. C. B. P. 241. M. H. 3. 392. Aethiopsis multis. J. B. 3. 315. Aethiopsis. Dod. p. 148. H. Eyst. Aest. o. 8. F. 3. Fig. 1. b.*
 7. Sclarea; laciniatis foliis. *T. 179. Aethiopsis, laciniatis foliis. Barrel. Ic. 188. M. H. 3. 393. b. H.*
 8. Sclarea; Sicula; folio argenteo, subrotundo. *Aethiopsis, tota argentea, perennis, lanuginosa. Cupani. C. H.*
 9. Sclarea; Aethiopica; folio subrotundo; perennis. *Ind. 63. Sclarea*

164 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

rea Afra, folio *Æthiopidis* lanuginoso. *Vaill. Marum Egyptiorum. Alpin. Exot.* 252. *Vesling. in Alp. Alg.* 75. 76. *H.*

10. *Sclarea*; *Indica*; floribus variegatis. *T.* 179. *Sclarea*, *pes tigridis* vulgò dicta. *Horminum*, *Indicum*, maximum, flore variegato. *H. R. Par. Flor.* 2. 70. *Horminum*, majus, amplo flore violaceo, lobis florum aureis punctis notatis. *M. H. Blæs.* 272. *M. H.* 3. 394. *Horminum*, hirsutum, flore violaceo, punctis aureis notato. *M. H.* 3. *Secl.* 11. *Tab.* 13. *Fig.* 16. *b.* *H.*

11. *Sclarea*; folio triangulari, dentato. *T.* 180. *Horminum*, *lappathi* unctuosè folio, seu majus, hastato folio. *M. H. Blæs.* *M. H.* 3. 393. *H.*

12. *Sclarea*; folio triangulari; caule tomentoso. *T.* 180. *Horminum*, hastatis, amplioribus foliis, seu ari modo alatis, caulibus & pediculis araneosâ lanugine villosis, ex insulâ *Gomerâ*. *Plukn. Phyt.* *T.* 301. *Fig.* 2. *Horminum*, *Canariense*, tomentosum, hamato folio. *M. H.* 3. 394. *H.*

13. *Sclarea*; rugoso, verrucoso, laciniato, folio. *T.* 180. *Horminum* *Syriacum*, rugoso, verrucosoque, folio, cornu cervinum exprimente. *Par. Bat. Prodr. Horminum*, rugoso, verrucosoque, folio. *Par. Bat. Plukn. Phytogr. T.* 194. *Fig.* 5. *Horminum*, *ceratophyllum*, rugosum, flore sulphureo. *M. H.* 3. 393. *H. b.*

14. *Sclarea*; *Pyrenaïca*; glutinosa; foliis sinuatis. *T.* 179. *Horminum*, *anguriæ* folio. *Par. Bat. Horminum*, *Pyrenaïcum*, glutinosum, *anguriæ* folio. *Sch. Bot. Par.*

15. *Sclarea*; glutinosa; floris lutei, variegati, barbâ amplâ cavâ. *Horminum*, luteum, glutinosum. *C. B. P.* 238. *M. H.* 3. 394. *Orcula tertia.* *Dod. p.* 292. *Colus Jovis.* *H. Eyf. Æst.* o. 8. *F.* 4. *Fig.* 1. *Galeopsis species*, lutea, viscida, odorata, *nemorensis.* *J. B.* 3. 314. *Salvia*, *montana*, maxima, foliis *hormini*, flore flavescente. *T.* 180.

16. *Sclarea*; *asphodeli* radice. *T.* 179. *Horminum*, sanguineum, *asphodeli* radice. *Triumf.* 69. *M. H.* 3. 394. *Horminum*, sylvestre, maculatum, tuberosum, *Francisci de Honuphriis.* *R. H.* 546. *H.*

17. *Sclarea*; folio amplissimo, sanguineo, *bardanæ.* *Horminum*, folio *bardanæ*, sanguineo, amplissimo *Triumf.* *H.*

18. *Sclarea*; major; foliis in profundas lacinias incisis. *T.* 179. *Horminum*, sylvestre, majus, foliis profundè incisis. *C. B. P.* 239. *Gallitrichum*, sylvestre, comâ virescente. *J. B.* 3. 312. *Hormini* *sylæstris* quarti prima species. *Clus. H. quoad Iconem xxx.* *Horminum*, sylvestre, majus, flore carneo. *M. H.* 3. 393.

19. *Sclarea*; *pratensis*; foliis serratis; flore albo. *T.* 179. *Horminum*, *pratense*, flore albo, foliis serratis. *H. R. Par. Gallitrichum*, sylvestre, flore majore, albo. *J. B.* 3. 312. *Salvia*, *agrestis*, flore albo. *H. Eyf. Vern.* o. 9. *F.* 2. *Fig.* 3. *Horminum*, *pratense*, niveum, foliis incanis. *C. B. P.* 238. *M. H.* 3. 393.

20. *Sclarea*; *pratensis*; foliis serratis; flore cæruleo. *T.* 179. *Hormi-*

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 165

minum, pratense, foliis serratis. C. B. P. 238. M. H. 3. 393. Gallitrichum sylvestre vulgò, sive sylvestris Sclarea, flore cæruleo, magno. J. B. 3. 311. Orvalæ sylvestris species quarta. Dod. p. 293.

21. Sclarea; pratensis; foliis serratis; flore suaverubente. *T. 179. Horminum, pratense, foliis serratis, flore suaverubente. H. R. Par. Gallitrichum sylvestre vulgò, sive sylvestris Sclarea, flore purpureo, magno. J. B. 3. 311.*

22. Sclarea; Africana; amplissimo folio; annua. *Ind. 64. Sclarea Africana, præcox, annua. T. 179. An & Sclarea, maxima, Bætica, annua, flore dilutè cæruleo. T. 179. Horminum, Bæticum, maximum, flore dilutè cæruleo. H. R. Par. ? a.*

23. Sclarea; folio salviæ; major; vel maculata. *T. 180. Horminum, sylvestre, salvifolium, majus, vel maculatum. C. B. P. 239. Hormini sylvestris quinti altera species. Clus. H. xxxi. Horminum, Syriacum, longifolium, elatius, cæruleum. M. H. 3. 394.*

24. Sclarea; folio salviæ; minor; sive glabra. *T. 180. Horminum sylvestre, sive salvifolium minus. C. B. P. 239. M. H. 3. 394. Gallitrichum, glabrum, folio salviæ, flore purpureo. J. B. 3. 312. Hormini sylvestris quinti species prior. Clus. H. xxxi.*

25. Sclarea; foli salviæ; flore purpureo. *T. 180. Horminum, salviæ folio. M. H. Blæs.*

26. Sclarea; Orientalis; folio betonicæ acutissimo; comâ purpurascente. *T. Cor. 10.*

27. Sclarea; Cretica; latifolia; flore vario. *Sher. hoc nomine missa ex Italiâ.*

28. Sclarea; quod horminum sylvestre; flore rubicundissimo, interdum flammeo. *Bocc. a.*

29. Sclarea; Orientalis; foliis rotundioribus, candidissimis. *T. C. 10.*

HORMINUM. *T. 178. 82.*

Omnia ut in Sclarea, sed galeâ cavâ, non falcatâ, nec aduncâ, brevior.

1. Horminum; sylvestre; lavandulæ flore. *C. B. P. 239. M. H. 3. 395. Hormini sylvestris quarti species quinta. Clus. H. xxxi. Gallitrichis affine Maru, si non genus aliquod, sclarea, Hispanica, Tabernæmontani. J. B. 3. 313.*

2. Horminum; pratense; flore minimo. *Schol. Bot. Par. 68.*

3. Horminum; vernum; folio betonicæ; flore cæruleo. *Horminum, vernum, flore vario. Sher.*

4. Horminum; foliis alatis, hirsutis; verticillis non foliosis; cau-

166 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

le & caliculis rubris. *An Horminum, folio napi? M. H. R. Blæs. Horminum, foliis alatis, caulibus purpureis vulgò.*

5. Horminum; sativum. *C. B. P. 238. Horminum. Dod. p. 294. Horminum, comâ purpuro-violaceâ. J. B. 3. 309. M. H. 3. 393. a.*

6. Horminum; comâ rubrâ. *J. B. 3. 309. M. H. 3. 393. a.*

7. Horminum; comâ viridi. *T. 178. Horminum, sativum, alterum, foliis totis viridibus. H. R. Par. a.*

8. Horminum; verbenæ laciniis. *Triumfett.*

9. Horminum; folio querno. *Volk.*

10. Horminum; Ægyptium; minimum; ramosissimum. *Lippii. Horminoides, Ægyptia, annua. Lipp. Vaill. a.*

11. Horminum; sativo simile; comâ purpureâ; flore vario. *H. Cath. a.*

12. Horminum; purpuro-violaceum; rigidius. *H. C. Suppl. Alt.*

13. Horminum; minus; procumbens; folio betonicæ. *H. C.*

14. Horminum; foliis alatis; flore violaceo. *Sher. Triumfett.*

SALVIA. T. 180. 83.

Omnia ferè ut in Sclarea.

Galea falcata vel fornicata, barba trifida, segmentum medium vix excavatum.

Stamina florum referunt fabricam ossis hyoïdis suo inflexu.

1. Salvia; major; an sphacelus Theophrasti? *C. B. P. 237. Salvia latifolia. J. B. 3. 304. Salvia major. Dod. p. 290. Salvia, major, latifolia, flore cæruleo H. Eyf. Æst. o. 8. F. 1. Fig. 1. H.*

2. Salvia; major; an sphacelus Theophrasti; floribus candidis? *C. B. P. 237. Var. Salvia Hispanica, flore albo. H. Eyf. o. 8. F. 1. 2. H.*

3. Salvia; perelegans; tricolor; argentea; Belgarum. *H. R. Par. H.*

4. Salvia; major; foliis ex viridi & luteo variegatis. *H. R. Par. H.*

5. Salvia; major; foliis ex viridi & albo variegatis. *H.*

6. Salvia; latifolia; serrata. *C. B. P. 237. Prodr. 113. Salvia, serrata, crispa. J. B. 3. 305. H.*

7. Salvia; major; arborefcens; foliis vietis, laceris, fimbriâ aureâ donatis. *An Salvia, minor, sinuata, foliis per limbum aureis. H. R. Par? H.*

8. Salvia; Cretica; non pomifera. *Clus. H. 343. Salvia non baccifera. C. B. P. 238. H.*

9. Salvia; folio lato, amplo, subrotundo. *H.*

10. Salvia; minor; aurita & non aurita. *C. B. P. 237. Salvia, minor,*



SALVIA ; *orientalis* ; *latifolia* ; *hirsutissima* ; *viscosa* ; *pinnata* ; *flore*
& calice purpureis ; violacea.
A. radix capillata. B. folia. C. folium vult magnitudinis. D. flores. E. fol & calice vult
magnitudinis. F. semina.

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 167

nor, aurita. J. B. 3. 305. Salvia minor. Dod. p. 290. Salvia, minor, pinnata. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 1. Fig. 3. H.

11. *Salvia; angustifolia; ferrata. C. B. P. 237. Salvia, Cretica, angustifolia. Clus. H. 343. H.*

12. *Salvia; Orientalis; latifolia; absinthium redolens; flore carneo magno. Salvia, absinthites, latifolia, flore carneo. Sher. H.*

13. *Salvia; Orientalis; latifolia; hirsutissima; viscosa; pinnata; flore & calice purpureis; inodora. Salvia, Orientalis, foliis alatis. Sher. An & Salvia, Orientalis, foliis alatis, majoribus, & serratis. T. C. 11? H.*

14. *Salvia; Africana; frutescens; folio scorodonie; flore violaceo. H. A. 2. 181. H. R. D.*

15. *Salvia; Africana; frutescens; folio subrotundo, glauco; flore aureo, magno. H. A. 2. 183. H. R. D.*

16. *Salvia; baccifera. C. B. P. 237. Salvia, Cretica, pomifera. Clus. H. 343. H.*

17. *Salvia; bacciferae similis; sed foliis magis undulatis. H.*

18. *Salvia; Cretica; frutescens; pomifera; foliis longioribus, incanis, crispis. T. C. 10. T. Voy. 1. 77. H.*

19. *Salvia; Hispanica; folio lavandulae. T. 181. H.*

20. *Salvia; absinthium redolens. J. B. 3. 307. Flore albo. H.*

MELISSA. T. 193. 91.

Calix longus, quinquesfidus, tubulosus, tribus segmentis majoribus sic unitis, & binis inferioribus sic unitis, ut bilabiatus appareat.

Galea surrecta, subrotunda, bifida, barba tripartita.

Flores non omnino verticillati in alis foliorum nati, plerumque seni, in utroque latere terni.

1. *Melissa; hortensis. C. B. P. 229. Melissa, vulgaris, odore citri. J. B. 3. 2. 232. M. H. 3. 408. Melissa officinarum. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 1. Fig. 2.*

2. *Melissa; minor; & humilior. Flor. 2. 76.*

3. *Melissa; Romana; molliter hirsuta; & graveolens. H. R. Par. Melissa, Romana, hirsutior. M. H. Blæf. M. H. 3. 408. Melissa, foliis galeopsis. Flor. 2. 76.*

4. *Melissa; peregrina; caule brevi; plantaginis folio. T. 193. Galitrichum, folio rotundiore, flore magno, violaceo. J. B. 3. 313. H.*

5. *Melissa; humilis; latifolia; maximo flore, purpurascens. T. 193. Melissa. Trag. 12. Melissa Fuchsi. Lob. Ic. 515. H. Eyst. Vern. o.*

6. *F. 7. Fig. 3. Melissa, adulterina, quorundam, amplis foliis & floribus, non grati odoris. J. B. 3. 2. 233. Lamium, montanum, Melissa fo-*

168 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

folio. C. B. P. 231. M. H. 3. 385. *Melissophyllum, verum, Fuchii.*
Cord. H.

6. *Melissa*; humilis; latifolia; maximo flore albo. T. 193. H.

7. *Melissa*; quæ bugula Lusitanica; odorata. Corn. 40. *Bugula odorata, Lusitanica.* M. H. 3. 39. *Clinopodium, Lusitanicum, spicatum, & verticillatum.* T. 195. a. Vid. & in *Clinopodiis*.

MOLDAVICA. T. 184. 85.

Folia longa, angusta, crenata.

Galea fornicata, bifida, sursum reflexa, barba bifida, unitæ faucibus marginatis.

Calix tubulosus, sectus in duo labia inæqualia, per maturitatem connivens.

Semina oblonga.

1. *Moldavica*; *betonicae folio*; flore caeruleo. T. 184. *Melissa, Moldavica, flore caeruleo.* H. Eyst. Æst. o. 7. F. 1. Fig. 3. *Melissa, peregrina, folio oblongo.* C. B. P. 229. M. H. 3. 408. *Melissa, Turcica multis dicta.* J. B. 3. 2. 234. Tab. Ic. 351. a.

2. *Moldavica*; *betonicae folio*; flore albo. T. 184. *Melissa, Moldavica, flore albo.* Citrago *Turcica, flore albo.* H. Eyst. Æst. o. 7. F. 2. Fig. 2. a.

3. *Moldavica*; *Americana*; *trifolia*; odore gravi. T. 184. *Cedronella, Canariensis, viscosa, foliis plerumque ex eodem pediculo ternis.* H. A. 2. 81. *Melissa, fortè Canarina, triphyllos, odorem camphoræ spirans penetrantissimum.* Plukn. Phyt. Tab. 325. Fig. 5. *Dracocephalo affinis, Americana, trifolia, odore terebinthinæ.* Volk. b. H.

4. *Moldavica*; *Orientalis*; *betonicae folio*; flore magno, violaceo. T. Cor. 11. a.

5. *Moldavica*; *Orientalis*; *betonicae folio*; flore magno, albido. T. C. 11. a.

6. *Moldavica*; *Orientalis*; *salicis folio*; flore parvo, caeruleo. T. Cor. 11. a.

BRUNELLA. T. 182. 84.

Galea cava, barba trifida, segmentum medium cavum, latius & productius.

Flores habent galeam erectam, cavam, integram, longam, barbam trifidam, segmentis lateralibus extrorsum replicatis, medio pendulo valde cavo, in spicam densam, squamatam, brevem, congesti, cum foliolis interjectis.

Ca.

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 169

Calix bilabiatus, superiori segmento erecto, trifido, inferiori labio binis spinulis armato.

1. Brunella; cæruleo, magno, flore. C. B. P. 261. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 13. Fig. 3. M. H. 3. 363. Prunella, flore magno, folio non laciniato. J. B. 3. 429. Prunella, I. Clus. H. XLIII.
2. Brunella; major; folio non dissecto. C. B. P. 260. Prunella, flore minore, vulgaris. J. B. 3. 428. Brunella. Dod. p. 136. Prunella officinarum. H. Eyst. Æst. o. Arb. & Frut. F. 1. Fig. 2. Prunella vulgaris. Park. Theatr. 526. M. H. 3. 363. b. †.
3. Brunella; major; folio non dissecto; flore albo. C. B. P. 261. b. †.
4. Brunella; folio laciniato. C. B. P. 261. Brunelle altera Icon. Dod. p. 136. Brunella, II, flore purpureo. Clus. H. XLIII. b.
5. Brunella; folio laciniato; flore albo. H. R. Par. Prunella, flore albo, parvo, folio laciniato. J. B. 3. 429. Prunella, II, non vulgaris, albo flore. Clus. H. XLIII. b.
6. Brunella; hyssopifolia. C. B. P. 261. Prunella angustifolia. J. B. 3. 430. Prunella, angustifolia, integra, hirsutior. M. H. 3. 364.
7. Brunella; minor; alba; laciniata. C. B. P. 261. Prunella, flore magno, albo, folio laciniato. J. B. 3. 429.
8. Brunella; major; folio dissecto; flore purpureo; perennis.
9. Brunella; folio verbenæ tenuifoliae.
10. Brunella; Alpina; laciniata; flore magno.
11. Brunella; laciniata; flore elegantissime sulphureo.

OCYMUM. T. 203. 96.

Radix annua in omnibus, unâ Ceylonensi exceptâ.

Galea surrecta, subrotunda, crenata, quadrifida, amplior quam barba, simplex, cava, longa, horizontaliter porrecta, quæ crispa vel leviter incisa.

Calix tubulosus, apertus, quadrifidus, sed pars quinta carens segmento habet foliolum tegens instar clypei illum defectum, & est parte posticâ auritum.

1. Ocymum; caryophyllatum; Monachorum; five acinos; Columnae. J. B. 3. 260. M. H. 3. 407. Acinos Dioscoridis. Col. Phytob. 1. 23. a. prægn.
2. Ocymum; foliorum fimbriis ad endiviam accedentibus; maximum. H. L. a. prægn.
3. Ocymum; latifolium; maculatum; vel crispum. C. B. P. 225. M. H. 3. 406. Ocymum, Sancto-Mauritanum, latum, crispum, maximum.

170 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

num. J. B. 3. 2. 249. Ocymum Indicum. Clus. H. 352. Basilicum, Indicum, maculatum. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 9. Fig. 1. a. præg.

4. *Ocymum; viride; foliis bullatis. C. B. P. 225. M. H. 3. 406. Ocymum, Indicum, viride, majus, foliis protuberantibus. H. Eyst. Æst. o. Arb. & Frut. F. 4. Fig. 2. a. præg.*

5. *Ocymum; foliis fimbriatis, viridibus. C. B. P. 225. M. H. 3. 406. Ocymum, crispum, viride. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 10. Fig. 2. a. præg.*

6. *Ocymum; caryophyllatum; maximum. C. B. P. 225. M. H. 3. 406. Ocymum, latifolium, magnum. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 10. Fig. 1. a. præg.*

7. *Ocymum; caryophyllatum; majus. C. B. P. 226. M. H. 3. 406. Ocymum maximum. Dod. p. 279. Ocymum magnum. J. B. 3. 2. 246. a. præg.*

8. *Ocymum; citri odore. C. B. P. 226. M. H. 3. 406. Ocymum, citratum, vel citri odore. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 2. Fig. 2. a. præg.*

9. *Ocymum; anisi odore. C. B. P. 226. M. H. 3. 407. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 2. Fig. 3. a. præg.*

10. *Ocymum; melissæ odore. a. præg.*

11. *Ocymum; styracis liquidæ odore. a. præg.*

12. *Ocymum; fœniculi odore. a. præg.*

13. *Ocymum; nigrum; latifolium; laciniatum; spicâ nigrâ; flore albo; odore cinnamomi. a. præg.*

14. *Ocymum; vulgatus. C. B. P. 226. Basilicum, seu Ocymum, medium, vulgatus. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 9. Fig. 2. M. H. 3. 406. Ocymum, medium, vulgatus, & nigrum. J. B. 3. 2. 247. a. præg.*

15. *Ocymum; vulgatus; foliis ex nigro virelcentibus; flore albo. H. R. Par. a. præg.*

16. *Ocymum; vulgatus; foliis ex nigro virescentibus; flore violaceo. H. R. Par. a. præg.*

17. *Ocymum; medium; crispum; conglomeratâ brevique spicâ. H. R. Par. a. præg.*

18. *Ocymum; minus; angustifolium; foliis serratis. C. B. P. 226. M. H. 3. 407. Ocymum, minus, angustifolium, flore albo. H. Eyst. Æst. o. Arb. & Frut. F. 4. Fig. 3. a. præg.*

19. *Ocymum; minus; angustifolium; foliis bullatis. H. R. Par. a. præg.*

20. *Ocymum; tricolor. H. R. Par. a. præg.*

21. *Ocymum; minimum. C. B. P. 226. J. B. 3. 2. 247. Ocymum, minimum, caryophyllatum. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 10. Fig. 3. a. præg.*

22. *Ocymum; minimum; foliis ex purpurâ nigricantibus. H. R. Par. M. H. 3. 407. a. præg.*

23. *Ocymum; minus; Chinesse; odoratissimum; flore albo. Triumphett. a. præg.*

24. *Ocymum; Zeylanicum; perenne; frutescens; folio calaminthæ nonnihil simili. Par. Bat. pr. Cottam. H. M. x. 153. Nepeta / menthæ catariæ affinis Indica, candido flore. Ibid. in Notis. H. R. D. præg.*

Mar-

MARRUBIASTRUM. T. 190. 89.

Caliculi quinque exiguis spinosis appendiculis.

Floris galea ferè integra & plana, barba trifida, segmento medio integro majore, ut flosculus ferè appareat quadrifidus. Flores in densos verticillos congesti.

1. Marrubiastrum; sideritidis folio; caliculis aculeatis; flore candicante. T. 190. *Sideritidis* genus, spinosis verticillis. J. B. 3. 428. *Sideritis Romana*, utriculis spinosis. H. L. M. H. 3. 388. b.

2. Marrubiastrum; sideritidis folio; caliculis aculeatis; flore flavo cum limbo atro-purpureo. T. 190. *Sideritis*, montana, parvo flore nigro-purpureo, capite medio croceo. Col. 1. 196. *Sideritis*, montana, parvo, varioque, flore. C. B. P. 233. M. H. 3. 388. a.

3. Marrubiastrum; sideritidis folio; caliculis aculeatis; flore flavo cum limbo atro-purpureo; comâ flavescente. T. Cor. 12. a.

4. Marrubiastrum; folio cardiacæ. Bocc. Mus. p. 2. Tab. 98. a.

5. Marrubiastrum; palustre; foetidum. T. 190. *Lamium*, paludosum, Belgicum, melissæ folio. H. L. An non & Marrubiastrum, vulgare. T. 190. *Sideritis*, alpine, trixaginis folio. C. B. Prodr. 111? M. H. 3. 389. a. †.

6. Marrubiastrum; folio cardiacæ; odore melissæ. Forté, Marrubiastrum, Americanum, floribus in capitulum congestis, melissæ odore. Plum. b.

SIDERITIS. T. 191. 90.

Galea surrecta, barba tripartita, longa, pendula.

Flores verticillati in alis foliorum plerumque incisorum instar cristæ.

1. *Sideritis*; Alpina; hyssopifolia. C. B. P. 233. M. H. 3. 388. *Sideritis montana*. Lob. Adv. 225. *Sideritis*, Valerandi Dourez, brevi spicâ. J. B. 3. 427. *Sideritis*, VII. Clus. H. xli. H.

2. *Sideritis*; vulgaris; hirsuta; erecta. C. B. P. 233. *Sideritis vulgaris*. Clus. H. xxxix. *Sideritis*, vulgaris, hirsuta. J. B. 3. 425. M. H. 3. 387. a.

3. *Sideritis*; hirsuta; vulgaris; humilior. C. B. P. 233. M. H. 3. 387. *Sideritis*, II. Clus. H. xxxix. a.

4. *Sideritis*; arvensis; latifolia; glabra. C. B. P. 233. M. H. 3. 389. *Betonica*, arvensis, annua, flore ex albo flavescente. T. 203. *Sideritis*, glabra, arvensis. J. B. 3. 427. a.

5. *Sideritis*; Persica; odorata; latissimo folio; hirsuta; flore ex luteo albicante. Ex Tourn. H. Maurocen. An *Sideritis*, Orientalis, phloemidis folio. T. Cor. 12? b. H.

Y 2

6. Si-

172 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

6. Sideritis; Hispanica; frutescens; foliis rigidis, profundè dentatis. *Jussieu. b.*
7. Sideritis; frutescens; folio incano oleæ. *Sideritis, Memphitica, fisti folio angusto. Lippii. H.*
8. *An* Sideritis; stœchados folio? *ex H. A.*
9. Sideritis; minima; Ægyptia; ramosa. *Lippii. a.*
10. Sideritis; Lusitanica; minor; flosculis luteis. *b.*
11. Sideritis; Hispanica; procumbens; flore albo; major. *T.*
192. *H.*
12. Sideritis; Hispanica; frutescens; sive lignosior. *T. 192. H.*
13. Sideritis; Orientalis; folio phlomidis. *T. C. 12. H.*

RUYSCHIANA.

Radix perennis.

Folia rosmarini tenuiora quoad crassitiem.

Galea cava, bifida, & trifida, barba trifida, segmento medio propendente, bifido atque convoluto in spiram.

Flores speciosi, seni plerumque in verticillos, raros primo, deinde in spicam, congesti.

1. Ruyschiana; flore cæruleo, magno. *Hyssopus, Austriaca, magno flore, folio chamæpitidis. H. L. Chamæpitys, cærulea, Austriaca. C. B. P. 250. Chamæpitys Austriaca. Clus. H. CLXXXV. H. Eyst. Vern. o. 7. F. 6. Fig. 3. Prunella, hyssopi folio viridi, amplo flore cæruleo. M. H. 3. 364. H.*

CHAMÆCLEMA. *Cordi Hist.*

Radix repentissima, & caules in flagella distributi.

Folia crassa, rugosa, subrotunda, crenata.

Galea surrecta, subrotunda; bifida, barba trifida.

Flos utrinque nodo caulium in pedunculis ramosis adnatus.

1. Chamæclema; vulgare. *Hedera, terrestris, vulgaris. C. B. P. 306. M. H. 3. 409. Chamæcissus, sive hedera terrestris. J. B. 3. App. 855. Hedera terrestris. Dod. p. 394. Calamintha, humilior, folio rotundior. T. 194. †.*
2. Chamæclema; minus. *Hedera, terrestris, minor, & elegantior. C. B. P. 306. Var. Calamintha, humilior, folio rotundior, minor, & elegantior. T. 194. †.*
3. Chamæclema; minus; flore purpureo. *Hedera, terrestris, vulgaris, flore purpureo. H. R. Par. Calamintha, humilior, folio rotundior, flore purpureo. T. 194.*
4. Cha-

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 173

4. *Chamaeclema*; minus; folio variegato, aureo.

MOLUCCA. T. 187. 88.

Calix expansus, amplus, campaniformis, quasi membranaceus, apertus.

Galea cava, barba tripartita, segmento medio ferè bifido; in centro calicis exiguus flosculus latet.

Semina angulosa, vix tecta.

1. Molucca. J. B. 3. 2. 234. *Molucca laevis*. Dod. p. 92. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 2. Fig. 1. *Melissa, Moluccana, odorata*. C. B. P. 229. *Molucca Syriaca, laevis*. M. H. 3. 380. a.

2. Molucca; spinosa. Dod. p. 92. *Melissa, Moluccana, foetida*. C. B. P. 229. *Molucca, odorata, spinosa*. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 1. Fig. 1. *Molucca asperior, Syriaca, & Maseluc Turcarum*. Lob. M. H. 3. 380. a.

PSEUDO-DICTAMNUS. T. 188. 89.

Radix perennis.

Calix orbicularis, patens, semina matura tecta recondens, quasi in acetabulo.

Galea surrecta, fornicata, bifida, barba tripartita.

Verticilli marrubii albi æmuli, densè congesti, apicibus aculeatis.

1. Pseudo-dictamnus; acetabulis Moluccæ. C. B. P. 222. M. H. 3. 378. Pseudo-dictamnus, acetabulis majoribus. Flor. 2. 67. H. R. D.

2. Pseudo-dictamnus; verticillatus; inodorus. C. B. P. 222. M. H. 3. 379. Pseudo-dictamnus. Dod. p. 281. Pseudo-dictamnus, acetabulis minoribus. Flor. 2. 67. Dictamnus, adulterinum, quibusdam verticillatum, vel potius gnaphalium Veterum. J. B. 3. 2. 255. Pseudo-dictamnus, foliis verticillatis. H. Eyst. Æst. o. 6. F. 9. F. 2. H. R. D.

3. Pseudo-dictamnus; Hispanicus; amplissimo folio nigricante & villoso. T. 188. Pseudo-dictamnus, seu marrubium nigrum, Siculum, galeopsidis Anguillare respondens. Bocc. Mus. p. 2. T. 114. H.

4. Pseudo-dictamnus; Hispanicus; folio scrophulariæ. T. 188. Galeopsidis Anguillare. 278. Galeopsidis Anguillare, sive Pseudo-dictamnus, nigrum, Siculum. Bocc. Mus. 2. 151. H.

5. Pseudo-dictamnus; Hispanicus; amplissimo folio candicante & villoso. T. 188. Marrubium album, rotundifolium, Hispanicum. Par. Bat. Marrubium, subrotundo folio. Bocc. Mus. 2. 167. Tab. 122. H.

6. Pseudo-dictamnus; Africanus; foliis subrotundis, subtus incanis. H. A. 2. 179. Pseudo-dictamnus, Africanus, hederæ terrestris folio.

174 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

Oldenland. T. 188. *Marrubium, rotundifolium, Africanum, folio bedere terrestris. Flor. 2. 67. Dictamnus, flore rubro vulgò. b. H. R. D.*

7. Pseudo-dictamnus; Hispanicus; foliis crispis & rugosis. T. 188. *Marrubium, dictamni spurii foliis & facie. Par. Bat. Pseudo-dictamnus, nigro, rotundo, crispo, folio. Bocc. Mus. 2. 152. T. 129. Pseudo-dictamnus Hispanicus, folio rugosiore. M. H. 3. 380. H.*

8. Pseudo-dictamnus; Hispanicus; folio amplissimo, candicante, & villoso. T. 188. *H.*

CATARIA. T. 202. 95.

Pedunculus utrinque unus, ramosus.

Galea surrecta, subrotunda, bifida, barba tripartita, segmento medio excavato, amplo, & eleganter crenato, caeteris binis segmentis, ut alis, orificium patulum labiorum cingentibus.

1. Cataria; major; vulgaris. T. 202. *Mentha, Cataria, vulgaris, & major. C. B. P. 228. M. H. 3. 414. Mentha, Cataria. J. B. 3. 2. 225. Cataria herba. Dod. p. 99. Mentha felina, nepeta Tragi, herba felis, & Cataria. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 4. Fig. 3. b.*

2. Cataria; quæ nepeta; minor; folio melissæ Turcicæ. H. C. b.

3. Cataria; angustifolia; major. T. 202. *Cataria, folio longiore. Dod. p. 99. Mentha, Cataria, angustifolia, major. C. B. P. 228. M. H. 3. 414. Mentha, Cataria, Hispanica, angustioribus foliis. J. B. 3. 2. 226. Nepeta Germanica. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 4. Fig. 2. Nepeta, altissima, angustifolia, floribus niveis. Flor. 2. 75.*

4. Cataria; angustifolia; major; flore cæruleo-purpurascente. *Nepeta, altissima, angustifolia, floribus purpurascens. Flor. 2. 75.*

5. Cataria; Lusitanica; erecta; folio betonicæ; tuberosâ radice. T. 202. *Flore cæruleo. Betonica, nepetæ odore, radice tuberosâ. Flor. 2. 66. Cataria, radice tuberosâ, flore cæruleo spicato. Griseb. Virid. b. H.*

6. Cataria; Lusitanica; erecta; folio betonicæ; tuberosâ radice; flore albo. *Ind. 70. b. H.*

7. Cataria; quod horminum; spicatum; flore & odore lavandulæ. *Bocc. Rar. 39. Vaill. b.*

8. Cataria; minor; vulgaris. T. 202. *Cataria tenuifolia. Clas. H. xxxiii. Mentha Cataria minor. C. B. P. 228. M. H. 3. 414. Nepetella. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 4. Fig. 1. a.*

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 175

BALLOTE. T. 184. 85.

Radix perennis.

Calix tubulatus, pentagonus, quinquefidus, condens semina oblonga.

Galea cava, barba trifida, segmento medio ampliori, cordiformi.

Verticilli à medio ad summum caulem per intervalla adhaerent, in unum plerumque latus vergentes, constantque multis in uno communi pedunculo floribus congestis.

1. Ballote. Matth. 825. Marrubium, nigrum, fetidum, Ballote Dioscoridis. C. B. P. 230. M. H. 3. 377. Marrubium, nigrum, sive Ballote. J. B. 3. 318. Flore purpureo. †.

2. Ballote; flore albo. T. 185. †.

3. Ballote; minor; floribus purpureis in ramosis pedunculis. Missa fuit titulo marrubii verticillati, foliis profundè incisis. H.

CALAMINTHA. T. 193. 92.

Calix longus, tubulosus.

Galea surrecta, subrotunda, bifida, barba tripartita.

Flores nati in pedunculis ramosis, oblongis, qui nascuntur ex alis foliorum.

1. Calamintha; magno flore. C. B. P. 229. M. H. 3. 412. Calamintha, montana, flore magno, ex calice longo. J. B. 3. 2. 229. Calamintha, montana, praestantior. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 7. Fig. 1.

2. Calamintha; vulgaris; vel officinarum Germaniæ. C. B. P. 228. Calamintha, flore magno, vulgaris. J. B. 3. 2. 228. Calamintha montana. Dod. p. 98. Calamintha, montana, vulgaris. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 7. Fig. 2. M. H. 3. 413.

3. Calamintha; pulegii odore; foliis latioribus. H. L. Calamintha, pulegii odore, sive nepeta. C. B. P. 228. Calamintha, angustis foliis. H. Eyst. Æst. o. 7. F. 8. Fig. 2. Calamintha, flore minore, odore pulegii. J. B. 3. 2. 229. Pulegium sylvestre, sive Calamintha altera. Dod. p. 98. a.

4. Calamintha; incana; ocymi foliis. C. B. P. 228. Calamintha, folio & flore parvo, incana. J. B. 3. 2. 320. Calamintha, II, incana. Lob. Ic. 514. H. R. D.

5. Calamintha; Hispanica; frutescens; mari folio. T. 194. Satureja, Hispanica, frutescens, mari folio. Elem. de Botan. H. R. D.

6. Calamintha; montana; præalta; pulegii odore; dentatis foliis; flo-

176 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

floribus dilutè cæruleis, ex longo ramoso, brachiato pedunculo prædeuntibus. *Bocc. Musf. 2. 45. Calamintha, præalta, pulegii odore. Ejusd. T. 40. Calaminthæ præaltæ pulegii odore Icon altera ex Sabaudia. Ejusd. T. 38. b. H.*

ACINOS. *Raj. Meth. 64.*

Folia Ocymi minoris.

Calix oblongus, striatus, collo angusto, ventre turgido, quasi bilabiatus.

Galea surrecta, subrotunda, plerumque bifida, barba tripartita.

Flos ex alis foliorum, secundum caules, non in capitula congestus, nec in pedunculis, sed in arctos verticillos.

1. Acinos; seu clinopodium arvense; ocymi facie; majus. *Flor. 2. 73. Clinopodium, arvense, ocymi facie, foliis latioribus. C. B. P. 225. Acinos, sive ocymum sylvestre. Dod. M. H. 3. 404. a.*

2. Acinos; multis. *J. B. 3. 2. 259. Clinopodium, arvense, ocymi facie. C. B. P. 225. T. 195. Ocymum, sylvestre, acinos. Dod. p. 280. Clinopodium vulgare. Clus. H. 354. a.*

3. Acini; pulchra species. *J. B. 3. 2. 260 Clinopodium montanum. C. B. P. 225. T. 195. Clinopodium Austriacum. Clus. H. 353. Clinopodium Creticum, folio & odore origani. Missa hoc titulo quoque fuit. Acinos, Austriaca, foliis latioribus dentatis. M. H. 3. 405. b. H.*

DRACOCEPHALON. *T. 181. 83.*

Calix longus, tubulosus.

Folia Persicæ angustiora.

Galea cava, integra, connivens, barba tripartita, mediâ parte bifidâ, & lateralibus partibus bifidis, quæ formant fauces, ut flos rictum capitis draconisingat, vel potius florem digitalis imitetur.

Verticilli rariores ad nodos caulium binos ternos-ve, flores complexi.

1. Dracocephalon; Americanum. *Breyn. Prodr. 1. 34. Dracocephalus, angustifolius, folio glabro, serrato. M. H. 3. 417. Pseudo-digitalis, foliis dentatis Persicæ. Bocc. Rar. 11. Digitalis, Indica, angustifolia, profundè serrata, Persicæ folio. H. R. Par. Digitalis, Americana, purpurea, folio serrato. A. R. Par. 79. H.*

CASSIDA. T. 181. 84.

Calix brevis, profundè bifidus, segmento superiori adnætitur erecta auricula instar galeæ posterius excavatæ, ut superiori parte cristatus sit ut capsula, cujus figura cassidem caput munientem imitatur: pars superior cristam, inferior verò inferiorem galeæ clausæ partem exhibet. Intus recondit semina oblonga.

Flos constat tubo longo, ejus brevis Galea refert galeam, binis auriculis instructam; barba bifida plerumque.

1. Cassida. Col. 1. 187. *Scutellaria, peregrina, folio lamii. H. L. Flor.*
2. 78. *Lamium peregrinum, sive scutellaria. C. B. P. 231. Prodr. 110.*
111. *Scutellaria, teucris facie. J. B. 3. 291. Lamium astragaloides. Corn. 129. Scutellaria spicata, major, lamii folio. M. H. 3. 416. H. b.*
2. Cassida; flore exalbido. T. 182. Cassida, flore ex albo pallente. Col. 1. 190. *Descr. Scutellaria, teucris facie, flore albo. J. B. 3. 291. b. H.*
3. Cassida; folio melissæ; flore purpureo, longiore. *Scutellaria, Virginiana, erecta, cærulea, melissæ foliis, seu foliis dentatis. M. H. 3. 416. Sect. 11. Tab. 19. b. H.*
4. Cassida; palustris; vulgatiore; flore cæruleo. T. 182. *Scutellaria, aquatica, vulgò tertianaria dicta. H. L. Lyfimachia, cærulea, galericulata, vel gratiola cærulea. C. B. P. 246. Tertianaria, aliis lyfimachia galericulata. J. B. 3. 453. Lyfimachia galericulata. Lob. Ic. 344. Scutellaria palustris, repens, cærulea. M. H. 3. 416. co. †.*
5. Cassida; palustris; vulgatiore; flore albo. T. 182. †. co.
6. Cassida; palustris; minima; flore purpurascente. T. 182. *Gratiola minor, & latifolia nostras. Park. Theatr. 220. H.*
7. Cassida; Orientalis; altissima; urticæ folio. T. 11. co. H.
8. Cassida; peregrina; foliis urticæ latifoliæ rugosis; flore cæruleo. Cassida, *Americana, procerior. T. 182. Scutellaria Americana, aquatica, major. H. L. co. H.*
9. Cassida; Orientalis; incana; foliis laciniatis; flore luteo. T. Cor. 11. H.
10. Cassida; Orientalis; folio chamædryos; flore luteo. T. Cor. 11. T. Voy. 2. 306. a. b. H.
11. Cassida; Cretica; fruticosa; folio cataris; flore albo. T. C. 11. b. H.
12. Cassida; Alpina; supina; flore magno. T. 182. *Teucrium astragaloides, Cassida minor. H. R. Par. H.*
13. Cassida; quæ scutellaria; folio teucris nitido; flore spicato, annuente, purpureo. H. C. 198.

MAJORANA. T. 199. 94.

Galea surrecta, subrotunda, bifida, barba tripartita, ut flos ferè quinquefidus appareat.

Flores congeruntur in capitula rotunda, densa, brevia, conflata ex ordine quaternio foliolorum squamatis sibi mutuo incumbentium.

1. Majorana; vulgaris. C. B. P. 224. Majorana, majori folio, ex semine nata. J. B. 3. 2. 241. Majorana, sive marum. Dod. p. 270. Amarracus vulgaris. H. Eyst. Aut. o. 1. F. 5. Fig. 2. Majorana, vulgaris, æstiva. Park. M. H. 3. 358.

2. Majorana; rotundifolia; scutellata; exotica. H. R. Par. 114. M. H. 3. 359. Majorana, rotundifolia, cochleata, radice perenni. Jonsq. Hort. An & Majorana latifolia. H. Eyst. Æst. o. Frut. & Arb. F. 13. Fig. 2? Origano cognata, Zatarendi. C. B. P. 223. Zatarbendi herba. J. B. 3. 2. 256. Zatarbendi, origanum Indicum. Vesting. Observ. 31. H. R. D.

3. Majorana; Cretica; origani foliis; villosa; saturejæ odore; corymbis majoribus, albis. T. Cor. 13. Origanum Smyrneum. Wheler. Itin. 243. H. R. D.

DICTAMNUS. Raj. Meth. 61. Flor. 2. 79.

Calix bifolius, dein alius ad decussim prioris, iterum sic tertius, donec fiat inde squamosum caput; ex centro omnium squamarum nascitur

Flos, cujus galea surrecta, subrotunda, bifida, barba tripartita.

Flosculi duo, utrinque unus, exeunt ex squamis foliosis, simul cum verticillis in longas laxas spicas aggestis.

1. Dictamnus; Creticus. C. B. P. 222. M. H. 3. 357. Dictamnus Creticus, seu vera. J. B. 3. 2. 253. Dictamnus verum. Dod. p. 281. Origanum, Creticum, latifolium, tomentosum, seu Dictamnus Creticus. T. 199. H. R. D.

2. Dictamnus; montis Sipyli; origani foliis. Flor. 2. 79. Origanum montis Sipyli. H. L. 463. Ic. & Descr. Origanum, spicatum, montis Sipyli, foliis glabris. Whel. Raj. H. 540. Dictamnus Sipylicus, majorane foliis. M. H. 3. 357. Dictamnus montis Sipyli, folio glabro, glauco. Breyn. Prodr. 2. H. R. D.

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 179

ORIGANUM. T. 198. 94.

Calix longus, simplex, tubulosus, inter squamas foliaceas latens; in hoc est

Flos, galeâ surrectâ, subrotundâ, bifidâ, barbâ tripartitâ, mediâ parte instar cochlearis cavâ.

*Flores congeruntur in spicas squamosas, muscarii emulas, aliquando instar umbellæ, utrinque unus ex squamulis pro-
veniens.*

1. Origanum; sylvestre; humile. C. B. P. 223. Prodr. 109. M. H. 3. 359. Origanum, repens, villosum, Aurelianensium. H. R. Par. Floribus purpureis.

2. Origanum; sylvestre; humile; floribus candidioribus.

3. Origanum; humilius; latifolium; glabrum. T. 199.

4. Origanum; sylvestre; cunila bubula Plinii. C. B. P. 223. Origanum, vulgare, spontaneum. J. B. 3. 236. Origanum sylvestre. Dod. p. 285. Origanum vulgare. H. Eyst. Aut. o. 2. F. 5. Fig. 3. Origanum, onites, majus. Lob. Adv. 211. Origanum sylvestre, vulgare. Tragi. Matth. M. H. 3. 359.

5. Origanum; sylvestre; album. C. B. P. 223. M. H. 3. 359.

6. Origanum; sylvestre; foliis variegatis, argenteis. Flor. 2. 78.

7. Origanum; sylvestre; foliis variegatis, aureis. Flor. 2. 79.

8. Origanum; Creticum. C. B. P. 223. J. B. 3. 2. 238. M. H. 3. 360. Origanum, minus, Chium, odoratissimum, flore albo; ex Triumfett. H. Maurocen. 133. Origanum, onites dictum. H. Eyst. Aut. o. 2. F. 5. Fig. 2. H.

9. Origanum; Creticum; flore purpureo. Origanum minus, Chium, odoratissimum, flore purpureo. H.

10. Origanum; Orientale; folio brunellæ glauco; flore albo. Vaill. H.

11. Origanum; dictamni Cretici facie; folio crasso nunc villosa, nunc glabro. T. C. 13. T. Voy. 1. 240. H.

ROSMARINUS. T. 195. 92.

Radix perennis.

Caules duri, frutescentes.

Folia angusta, oblonga, graveolentia.

Caliculi ex viridi canescentes, bidentati, vel tridentati, oblongi, tubulosi, bilabiati.

Galea bifida, retrorsum reflexa, quasi cornuta, cum staminibus aduncis, barba trifida, segmento medio instar cochlearis excavato, in medio bifido.

1. Rosmarinus; hortensis; angustiore folio. C. B. P. 217. M. H. 3.

180 GYMNOTETRASPERRMÆ VERTICILLATÆ.

410. *Rosmarinum coronarium*. Dod. p. 272. *Rosmarinus*, *coronarius*, *fruticosus*, *sive nobilior*, *angustiore folio*. J. B. 2. 25. *Rosmarinus coronarius*. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 1. F. 3. H. R. D.

2. *Rosmarinus*; *striatus*; *sive aureus*. Park. Theatr. 74. M. H. 3. 410. *Rosmarinus*, *folio variegato*. T. 195. H. R. D.

3. *Rosmarinus*; *hortensis*; *angustiore folio*; *argenteus*. H. R. Par. 158. M. H. 3. 410. H. R. D.

4. *Rosmarinus*; *spontaneus*; *folio eleganter variegato*. H. R. D.

5. *Rosmarinus*; *spontaneus*; *sive latifolius*. C. B. P. 217. *Rosmarinus*, *coronarius*, *fruticosus*, *ignobilior*. J. B. 2. 25. *Rosmarinus hortensis*, *latiore folio*. M. H. 3. 410. H. R. D.

6. *Rosmarinus*; *spontaneus*; *sive latifolius*; *folii apice in hamum curvato*. *Rosmarinus*, *folio extremo reflexo*. K. Ind. 72. H. R. D.

LEONURUS. T. 187. 87.

Calix longus, tubulatus, semina recondens.

Galea imbricata, multo longior barbâ tripartitâ, flores in verticillos densissimos acti.

1. *Leonurus*; *perennis*; *Africanus*; *sideritidis folio*; *flore phæniceo*, *majore*. Breyn. Prodr. 2. *Leonurus*, *Capitis Bonæ Spei*. Breyn. Cent. 1. 171. 172. *Cardiaca*, *Africana*, *perennis*, *foliis sideritidis*, *floribus longissimis*, *phæniceis*, *villosis*. H. L. *Stachys Africana*, *frutescens*, *angustifolia*, *flore longissimo*, *phæniceo*, *Leonurus dicta*. M. H. 3. 383. H. R. D.

2. *Leonurus*; *minor*; *Capitis Bonæ Spei vulgò*. *Cardiaca*, *Africana*, *nepetæ folio*, *floribus phæniceis*, *majoribus*. Flor. 2. 82. *Stachys Africana*, *frutescens*, *melissæ foliis*, *floribus brevioribus*, *phæniceis*. M. H. 3. 383. H. R. D.

3. *Leonurus*; *annuus*; *Americanus vulgò*. *Leonurus*, *annuus*, *Americanus*, *nepetæ folio*, *flore phæniceo*, *minore*. Breyn. Prodr. 2. *Cardiaca*, *Americana*, *annua*, *nepetæ folio*, *floribus phæniceis*, *minoribus*. H. L. *Stachys Americana*, *annua*, *urticæ foliis*, *floribus brevioribus*, *phæniceis*. M. H. 3. 383. H. a.

CARDIACA. T. 186. 87.

Galea imbricata, & multo longior barbâ suâ trifidâ.

Semina angulata, totam capsulam brevem validè ex calice factam occupantia.

1. *Cardiaca*. J. B. 3. 320. Dod. p. 94. Lob. Ic. 516. *Marrubium*, *Cardiaca dictum*, *fortè I Theophrasti*. C. B. P. 230. M. H. 3. 378. b.

2. *Cardiaca*; *crispa*. Raj. H. 571. *Cardiaca*, *foliis eleganter crispis*. Cat. Hort Oxon. 38. b.

2. Bar-

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 181

2. Barbatae non galeatae.

TEUCRIUM. Raj. Meth. 60. Flor. 2. 83.

Calix tubulatus, quinquefidus, aut campaniformis, recondens in fundo semina subrotunda.

Flos galea omnino carens, ex tubo brevissimo explicatur in quinque magna segmenta; sunt stamina assurgentia in loco galeae, barba quinquefidâ, segmento medio excavato, ceteris in cervice floris sibi mutuo oppositis; flores ex alis foliorum nati.

1. Teucrium; calice tubulato; flore pallide luteolo. *Teucrium. C. B. P. 247. Teucrium multis. J. B. 2. 290. Teucrium verum. H. Eyst. Æst. 0. 7. F. 11. Fig. 1. Chamædrys assurgens. Dod. p. 44. Chamædrys, frutescens, Teucrium vulgò. T. 205. Teucrium, vulgare, fruticans, sive I. Clus. H. 348. Chamædrys fruticosior, sive Teucrium vulgare, flore ochroleuco. M. H. 3. 421. H. R. D.*

2. Teucrium; calice tubulato; flore purpureo. *Teucrium, regium, purpureum, M. H. Blaf. Chamædrys, erecta, Teucii folio, purpurea. Flor. 2. 83. Chamædrys, fruticosior, sive Teucrium, lucidum, parvo folio, flore venuste purpureo. Plukn. Phyt. T. 65. Fig. 1. M. H. 3. 422. H. R. D.*

3. Teucrium; Bæticum; calice campanulato. *Teucrium Bæticum. Clus. Hif. 229. T. 208. Teucrium, fruticans, Bæticum, sive III. Clus. H. 348. Teucrium, peregrinum, folio sinuoso. C. B. P. 247. Chamædrys, fruticosior, flore violaceo, foliis subtus incanis. M. H. 3. 422. H. R. D.*

4. Teucrium; Bæticum; calice campanulato; folio eleganter variegato. *H. R. D.*

5. Teucrium; calice campanulato; stœchados facie. *Teucrium, frutescens, stœchados Arabicæ folio & facie. T. Cor. 14. Rosmarinum, stœchados facie. Alp. Exot. 103. Polium, erectum, Creticum, & fortè fruticosum Dioscoridis. Pon. Bald. Ital. 156. H. R. D.*

6. Teucrium; calice campanulato; laciniatum; flore magno subcæruleo. *Teucrium, Orientale, angustifolium, laciniatum, flore magno, suaveverubente. T. Cor. 14. a. H.*

7. Teucrium; calice campanulato; laciniatum; flore parvo subcæruleo. *Teucrium, supinum, humilius, verbenæ tenuifoliae foliis. Jusseu. a.*

8. Teucrium; calice tubulato; Creticum; purpureum. *Teucrium Creticum, odoratum, flore purpureo. H. R. Par. Chamædrys fruticosa, Cretica, purpureo flore. T. 205. H. R. D.*

182 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

CHAMÆDRYS. *Raj. Meth.* 60.

Habitus herbaceus.

Folia quercina, parva, crassa.

Calix tubulatus.

Flos Teucrii.

1. Chamædrys; major; repens. *C. B. P.* 248. *Dod. p.* 43. *M. H.* 3. 422. *Chamædrys, vulgò vera æstimata. J. B.* 3. 288. *Chamædrys. H. Eyst. Vern.* o. 8. *F.* 9. *Fig.* 3. †.

2. Chamædrys; minor; repens. *C. B. P.* 248. *Dod. p.* 43. *M. H.* 2. 422.

3. Chamædrys; foliis laciniatis. *Lob. Obs.* 209. *Botrys chamædryoides. C. B. P.* 138. *Botrys verticillata. J. B.* 3. 298. *Chamædrys, minor, annua, laciniatis foliis. M. H.* 3. 423. *Chamæpitys altera. Dod. p.* 46. *a.*

4. Chamædrys; folio pulchrè laciniato, majore, odorato; flore rubello. *b.*

5. Chamædrys; major; repens; flore albo. *C. B. P.* 248. *Var.*

6. Chamædrys; Hispanica; tenuifolia; multiflora. *H. R. Par. T.* 205. *H. R. D.*

7. Chamædrys; Hispanica; tenuifolia; latiori folio; multiflora. *H. R. Par. H. R. D.*

MARUM.

Habitus fruticosus.

Folia Serpilli lanceolata.

Flos Teucrii unus ex singulis alis foliorum.

Odor acer, volatilis.

1. Marum; Syriacum; vel Creticum. *H. L. Marum, Syriacum, vulgò. Flor.* 2. 84. *Marum Cortusi. J. B.* 3. 242. *M. H.* 3. 420. *Chamædrys, incana, maritima, frutescens, foliis lanceolatis. T.* 205. *Majorana, Syriaca, vel Cretica. C. B. P.* 224. *H. R. D.*

2. Marum; Hispanicum; nigrum; flore purpureo; piperella Hispanis. *Barr. Ic.* 694. *Marum, Hispanicum, nigrum, Bocc. Mus.* 2. 166. *T.* 117.

CHAMÆPITYS. *T.* 208. 98.

Folia angusta, trifida.

Galeæ loco denticuli, barba tripartita, segmento medio bifido.

Flo-

GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE. 183

Flores in verticillis rarioribus, duobus plerumque, utrinque uno, sparsim in alis foliorum, hinc inde.

1. Chamæpitys; lutea; vulgaris; five folio trifido. C. B. P. 249. M. H. 3. 424. Chamæpitys major. H. Eyst. Æst. o. Arb. & Frut. F. 1. Fig. 3. Chamæpitys, vulgaris, odorata, flore luteo. J. B. 2. 295. Ajuga, five Chamæpitys mas Dioscoridis. Lob. Ic. 382. Adv. 164. a.

2. Chamæpitys; moschata; foliis ferratis; an prima Dioscoridis. C. B. P. 249. Chamæpitys, five Iva moschata, Monspeliensium. J. B. 3. 296. M. H. 3. 425. Chamæpitys, spuria, prior, five anthyllis altera. Dod. p. 47. a.

SCORDIUM. Raj. Meth. 66.

Flos Chamædryos, ex qualibet alâ foliorum unus, vel alter.

Calix tubulatus.

Odor allii.

1. Scordium. C. B. P. 247. J. B. 3. 292. Dod. p. 126. H. Eyst. Vern. o. 8. F. 9. Fig. 2. Chamædryos palustris, allium redolens. M. H. 3. 423. Chamædryos, palustris, canescens, seu Scordium officinarum. T. 205. †.

2. Scordium; alterum; five salvia agrestis. C. B. P. 247. Scorodotis, five Scordium, folio salviæ. J. B. 3. 293. Salvia agrestis, five sphacelus. Dod. p. 291. Chamædryos, fruticosa, sylvestris, melissæ folio. T. 205. Chamædryos, elatior, salviæ folio, flore ochroleuco. M. H. 3. 423. †.

3. Scordium; frutescens; folio angusto salviæ; flore luteolo. H.

POLIUM. T. 206. 97.

Folia plerumque incana.

Stamina loco galeæ, barba, ut Chamædryos, quinque-fida.

Flos colligitur in capitula innata fastigiis caulium & ramorum.

1. Polium; lavandulæ folio. C. B. P. 220. M. H. 3. 356. Polium, foliis & facie lavendulæ. H. Eyst. Aut. o. 2. F. 12. Fig. 2. Polium, VII flore albo. Clus. H. 363. Polium, lavandulæ folio, semina Recentiorum. Lob. Obs. 258. H.

2. Polium; montanum; luteum. C. B. P. 220. M. H. 3. 355. Polium, montanum, III. Clus. H. 361. Polium. Dod. p. 283. Polium luteum. Lob. Ic. 487. H.

3. Polium; lavandulæ folio angustiori. C. B. P. 220. H.

4. Po-

184 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

4. Polium; montanum; repens. C. B. P. 221. *Polium, repens*, & III. Dod. p. 283. *Polium, montanum, purpureum. Polium, repens, supinum, Clusii. Lob. Obs. 257. H.*

5. Polium; Pyrenaicum; supinum; hederæ terrestris folio. T. 206. *An Chamædrys montis Sumani. J. B. 3. 289. ? H.*

6. Polium; montanum; luteum; dasiphyllum; ferratum; tomentosum. M. H. 3. 355. *Barrel. Ic. 33. Descr. 1073. Ic. H. †.*

7. Polium; montanum; luteum; ferratis, angustioribus, incanis, foliis. *Barrel. Ic. 34. Descr. 1089. Ic. H.*

8. Polium; montanum; album; supinum; folio ad suprema crenato; capitulis multis, globosis. H.

9. Polium; maritimum; supinum; Venetum. C. B. P. 221. M. H. 3. 156. *Polium Venetum. J. B. 3. 300. H.*

10. Polium; Hispanicum; fruticosum; maritimum; rorismarini folio; flore rubro. T. 207. H.

BUGULA. T. 208. 98.

Folia Brunellæ majora, dentata.

Calix longus, tubulosus, in quinque, vel 5 in sex, profunda segmenta scissus.

Flos galeā carens, parte superiori ambitu tubulosæ partis floris terminatur; barba trifida, in tria magna, cava, segmenta, divisa, medio segmento bifido.

Flores disponuntur in spicas densas, crassas, interpositis foliolis.

1. Bugula; sylvestris; villosa; flore cæruleo. T. 209. *Consolida, media, Genevensis. J. B. 3. 432. Consolida, media, pratensis, hirsuta. H. R. Par.*

2. Bugula. Dod. p. 135. *Consolida, media, pratensis, cærulea. C. B. P. 260. Bugula, vulgaris, sylvatica, cærulea. M. H. 3. 391. Consolida, media, quibusdam Bugula. J. B. 3. 430. Consolida media. H. Eyst. Fern. o. 1. F. 6. Fig. 1. †.*

3. Bugula; flore cinereo, vel albo. T. 109. *Bugula media, flore carneo. M. H. 3. 391. Consolida, media, pratensis, cinerea, vel alba. C. B. P. 260. Var.*

4. Bugula; folio maximo; flore pallidè cæruleo. *An Bugula, Alpina, maxima. T. 209?*

5. Bugula; sylvestris; villosa; flore suaverubente. T. 209. *Consolida, media, Genevensis, flore rubello. J. B. 3. 432. Bugula, carneo flore. Clus. H. XLIII.*

6. Bugula; Orientalis; villosa; flore inverso, candido cum oris purpureis. T. C. 14. H.

3. Nec galeatæ, nec barbatae.

MENTHA. T. 188. 89.

Radix reptatrix.

Flos quadrifidus, nec galea, nec barba, apparente, labio tamen utcumque bifido, verticilli densi.

Odor suavis, balsamicus, aromaticus.

1. *Mentha; rotundifolia; crispa; spicata. C. B. P. 227. J. B. 3. 2. 218. Mentha altera. Dod. p. 95. Balsamita, & cruciata Mentha, vulgò. co.*

2. *Mentha; crispa; Danica; aut Germanica; speciosa. Park. Tb. 32. M. H. 3. Sect. 11. T. 6. Fig. 5. co.*

3. *Mentha; rotundifolia; spicata; altera. C. B. P. 227. Mentha rotundifolia, rubra, aurantii odore. M. H. 3. 369. Menthastrum, spicatum, cultum, folio rotundiore, rugoso. J. B. 3. 2. 318. Sifymbria Mentha, agrestis, sativæ Menthae cruciatæ congener aut eadem. Lob. Obs. 272. Menthastrum, niveum, Anglicum. H. Eyf. Æst. o. 7. F. 3. F. 1. co.*

4. *Mentha; crispa; verticillata. H. Eyf. o. 7. F. 5. F. 1. Mentha rotundiore folio glabro, pulegii flore. M. H. 3. 369. Mentha I. Dod. p. 95. Folio eleganter variegato ex aureo & viridi. co.*

5. *Mentha; crispa; verticillata. C. B. P. 227. Mentha I. Dod. p. 95. Mentha, crispa, verticillata. H. Eyf. Æst. o. 7. F. 5. Fig. 1. Mentha, vulgata, serpens, rotundiore folio, pulegii flore coronato. Lob. Obs. 271. co.*

6. *Mentha; angustifolia; spicata. C. B. P. 227. Mentha tertia. Dod. p. 95. Mentha, Romana, sive præstantior, angustifolia. Lob. Obs. 271. co.*

7. *Mentha; angustifolia; spicata; magis ferrata. Mentha quarta. Dod. p. 95. co.*

8. *Mentha; latifolia; spicata; magis ferrata.*

9. *Mentha; arvensis; verticillata; hirsuta. J. B. 3. 2. 217. M. H. 3. 369. Calamintha, arvensis, verticillata. C. B. P. 229. Pulegium sylvestre, sive Calamintha altera. Dod. p. 98. co.*

10. *Mentha; arvensis; verticillata; folio rotundiore; odore aromatico. D. Vernon. Raj. Syn. 123. co.*

11. *Mentha; hortensis; verticillata; ocymi odore. C. B. P. 227. M. H. 3. 369. Mentha, verticillata, minor, acuta, non crispa, ocymi odore. J. B. 3. 2. 216. co.*

12. *Mentha; rotundifolia; palustris; seu aquatica; major. C. B. P. 227. M. H. 3. 370. Mentha aquatica, sive sifymbrium. J. B. 3. 2. 223. Sifymbrium. Dod. p. 97. †. co.*

13. *Menthastrum; Chalepense; angustifolium; rarò florens. H.*

186 GYMNOTETRASPERMAE VERTICILLATAE.

PULEGIUM. Raj. Meth. 61. Flor. 2. 80.

Verticilli densiores; flosculi minimi; labio superiore integro.

Cætera Menthae.

1. Pulegium; latifolium. C. B. P. 222. Pulegium. J. B. 3. 256. Dod. p. 256. Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare. T. 189. Pulegium regium. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 15. F. 2. M. H. 3. 371. co.

2. Pulegium; angustifolium. C. B. P. 222. M. H. 3. 371. Pulegium, cervinum, angustifolium. J. B. 3. 2. 257. Mentha, aquatica, saturejæ folio. T. 190. Pulegium cervinum. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 15. F. 3 co.

3. Pulegium; angustifolium; flore albo. H. R. Par. Mentha, aquatica, saturejæ folio, flore albo. T. 190. co.

4. Pulegium; latifolium; hirsutum; flore cæruleo. Pulegium tomentosum, minimum. Bocc. M. H. 3. 271. a.

LYCOPUS T. 190. 89.

Calix brevis, in sex segmenta divisus acuta.

Flos ferè campaniformis, quadrifidus, aut quinquefidus, segmentis subrotundis.

Verticilli densiores, longius distantes.

1. Lycopus; palustris; glaber. T. 191. Pseudo-marrubium, aquaticum, vulgare. M. H. 3. 378. Marrubium, palustre, glabrum. C. B. P. 230. Marrubium, aquaticum, quorundam. J. B. 3. 318. Marrubium aquaticum. Dod. p. 395. †. a.

2. Lycopus; foliis in profundas lacinias dissectis. T. 191. Marrubium, palustre, foliis profundissime dissectis. Flor. 1. 80. Pseudo-marrubium aquaticum, glabrum, foliis dissectioribus. M. H. 3. 378. a. †.

VERBENA. T. 200. 94.

Calix longus, tubulosus, quinquefidus.

Flos quinquefidus.

Semina totum pericarpium implentia.

Flores in capitulis, vel spicis, non in verticillis.

1. Verbena; Americana; altissima; urticæ foliis angustioribus; spicis brevioribus; floribus cæruleis. Flor. 2. 80. M. H. 3. 408. Verbena, Americana, altissima. Par. Bat. 242. Ic. & Descr. H.

2. Verbena; Americana; altissima; urticæ foliis angustioribus; spicis brevioribus; floribus purpureis. Flor. 2. 81. H.

3. Ver-

3. Verbena; Americana; altissima; urticæ foliis angustioribus; floribus albis. *Flor.* 2. 81. *H.*
4. Verbena; Canadensis; folio urticæ. *Zanon.* 203. *H. R. Par. Flor.* 2. 81. *M. H.* 3. 408. *H.*
5. Verbena; Lusitanica; latifolia; procerior. *T.* 200. *a.*
6. Verbena; communis; flore cæruleo. *C. B. P.* 269. *M. H.* 3. 408. —
Verbena vulgaris. *J. B.* 3. 443. *Verbenaca recta.* *Dod.* p. 150. *a.*
7. Verbena; tenuifolia. *C. P. P.* 269. *M. H.* 3. 419. *Verbenaca supina.* *J. B.* 3. 444. *Dod.* p. 250. *a.*
8. Verbena; nodiflora. *C. B. Prodr.* 125. *Id. & Descr. Verbena, nodiflora, foliis minoribus, viridibus.* *M. H.* 3. 419. *H.*

GYMNOTETRASPERMÆ ASPERIFOLIÆ.

Folia ut plurimum aspera, alterna plerumque, aut absque ordine adnata cauli.

Caules ferè teretes.

Caliculi quinquefidi, aperti, apicibus segmentorum ferè acutis ex fine pedunculi.

Flores monopetali, marginibus quinquepartitis, congesti ad spicas in modum caudæ scorpii fabrefactas in plurimis, habentes quinque stamina nata ex tubulo floris.

In centro calicis erigitur placentula fungosa, ex centro ejus emergit tuba ovarii, cui accrescunt quatuor semina, nuda, placentæ calicis innata.

Malp. An. Pl. 43. 139.

BORRAGO. T. 133. 53.

Folia latiora, aspera.

Calix amplus, quinquefidus, in quinque longos, graciles, ad unguem incisos, radios instar stellæ expansos, divisus.

Flos monopetalos, rotatus, segmentis quinque majoribus, mucronatis, stellatis, ad basin usque dissectis; ex interiore

parte floris ad centrum eriguntur quinque parva segmenta petaloïdea, alba, apice bifido, infra quæ iterum quinque parva segmenta erecta, petaloïdea, acuta, intra hæc stamina. Semina rugosa, viperino capiti similia.

1. Borrago; floribus cæruleis. *J. B. 3. 574. Buglossum, latifolium, Borrago, flore cæruleo. C. B. P. 256. Buglossum, sive Borrago. Matth. 1186. Borago, flore cæruleo. H. Eyst. Vern. o. 6. F. 14. Fig. 3. Borrago bortenfis. Ger. M. H. 437. a.*

2. Borago; floribus albis. *J. B. 3. 574. Borago, flore albo. H. Eyst. Vern. o. 6. F. 14. Fig. 3. a.*

3. Borago; Constantinopolitana; flore reflexo, cæruleo; calice velicario. *T. Cor. 6. T. Voy. 1. 523. H.*

BORRAGINOÏDES.

Folia angusta.

Calix pentagonius, infrâ in quinque alas acutas desinens.

Semina placentæ pyramidalî, excavatæ innata, ut in loculis, a parte placentæ crenata.

Cætera Borraginis.

1. Borragnioïdes; angustifolia; flore pallescente cæruleo. *Borrago peregrina, angustifolia, flore albo. Quibusdam. Anchusæ degeneris facie, Indicæ Orientalis herba quadricapsularis. Plukn. ph. LXXVI. 3. Cynoglossoides. Vaill. a. prægn.*

BUGLOSSUM. T. 133. 53.

Omnia ut in Borragine.

Flos minor, orbicularibus segmentis.

1. Buglossum; angustifolium; majus; flore cæruleo. *C. B. P. 256. Buglossum, vulgare, majus. J. B. 3. 578. Buglossum, Italicum, flore cæruleo. H. Eyst. o. 8. F. 5. Fig. 3. Anchusa, Alcibiadion. Dod. p. 629. Buglossum, perenne, majus, sativum. M. H. 3. 438. b.*

2. Buglossum; sylvestre; minus. *C. B. P. 256. Echium Fuchsii, sive Borrago sylvestris. J. B. 3. 581. Buglossa sylvestris. Dod. p. 628. Buglossum, sylvestre, asperum, minus, annuum, foliis undulatis. M. H. 3. 439. a. †.*

3. Buglossum; latifolium; sempervirens. *C. B. P. 256. Buglossum, folio borraginis, Hispanicum. J. B. 3. 577. Buglossum, sempervirens, Hispanicum, latifolium. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 5. Fig. 1. Borrago sempervirens. Ger. M. H. 3. 437.*

4. Bu-



BORRAGINOIDES ; angustifolia ; flore pallescente , caerulea .
A. radix annua . B. folium . C. calix clausus . D. flos . E. calix propria magnitudine .
F. flos nativæ magnitudinis . H. ovarium in calice . I. ovarium . K. semen .

1

2

3

4

5

6

GYMNOTETRASPERMAE ASPERIFOLIAE. 189

4. Buglossum; annuum; sylvestre; Creticum; flore azureo. Zanon. M. H. 3. 439. *Borrigo*, sylvestris, Cretica, flore azureo. Zan. 51. a.
5. Buglossum; Creticum; variegatum; odoratum. Flor. 2. 60. *Buglossum*, Creticum, minimum, odoratum, flore vario eleganti. H. R. Par. *Borrigo*, muralis, Cretica, flore odorato. Zanon. 47. Buglossum, annuum, humile, bullatis foliis, flore rubro, striis albis eleganter depicto. M. H. 3. 439. a.
6. Buglossum; Orientale; flore luteo. T. Cor. 6. H.
7. Buglossum; Orientale; angustifolium; flore parvo cæruleo. T. Cor. 6. a.
8. Buglossum; Creticum; verrucosum; perlatum quibusdā. H. R. Par. *Buglossum Lusitanicum*, bullatis foliis. M. H. R. Blæs. a.
9. Buglossum; Creticum; majus; flore cæruleo purpurante. H. R. Par. a.
10. Buglossum; Creticum; majus; flore rubente, roseo. a.
11. Buglossum; Creticum; majus; flore albo. a.
12. Buglossum; Creticum; majus; flore purpurascente. a.

ANCHUSA. Raj. Meth. 56. Flor. 2. 61.

Omnia ut Buglossum, sed radix ut plurimum rubentissima.

1. Anchusa; puniceis floribus. C. B. P. 255. *Anchusa Monspeliensis*. J. B. 3. 584. *Anchusæ* alterum genus, *onochites* dictum. Clus. H. CLXV. Buglossum radice rubrā, sive Anchusa, vulgatiore, floribus cæruleis. T. 134. Buglossum, perenne, minus, puniceis floribus. M. H. 3. 438. b. a.
2. Anchusa; purpurea. Park. Theatr. b. a.
3. Anchusa; floribus albis. Buglossum radice rubrā, sive Anchusa vulgatiore, floribus albis. T. 134. b. a.
4. Anchusa; angustifolia; procumbens; lithospermi facie. Flor. 2. 61. Buglossum, arvense, annuum, lithospermi folio. T. 134. Lithospermum, arvense, radice rubrā. C. B. P. 258. Lithospermum, nigrum, quibusdā, flore albo, semine echii. J. B. 3. 592. Lithospermum certium. Dod. p. 83. *Echioides alba*. Col. 1. 185. Lithospermum, annuum, album, tetracarpon, semine nigro, anguloso. M. H. 3. 447. b. a.
5. Anchusa; lutea; minor. J. B. 3. 583. M. H. 3. 442. *Anchusa, lutea, minima*. Lob. Obs. 312. Buglossum, luteum, annuum, minimum. T. 134. *Echioides, lutea, minima, Apula, campestris*. Col. 1. 184. b.

LITHOSPERMUM. T. 137. 55.

Calix ad basin usque sectus, quinquefidus in quinque longa, gracilia segmenta.

Flores parvi, monopetali, infundibuliformes, multifidi, orâ latâ.

Semina durissima, glaberrima, polita, nitentia, subrotunda.

1. Lithospermum; majus; erectum. C. B. P. 258. *Lithospermum, sive milium solis.* J. B. 3. 590. *Lithospermum minus.* Dod. p. 83.

2. Lithospermum; minus; repens; latifolium. C. B. P. 258. *Lithospermum, majus, Dodonæi, flore purpureo, semine anchusæ.* J. B. 3. 572. *Lithospermum majus.* Dod. p. 83. *Lithospermum, repens, majus.* Clus. H. CXLIII. *Lithospermum, perenne, procumbens, flore purpureo-cæruleo majore.* M. H. 3. 447.

HELIOTROPIMUM.

Flores in partes quinque majores dissecti plerumque intercurrentibus totidem minoribus segmentis, collecti in spicas longas in extremitate inflexas in formam caudæ scorpii.

1. Heliotropium; majus; Dioscoridi. C. B. P. 253. M. H. 3. 452. *Heliotropium, majus, flore albo.* J. B. 3. 604. *Heliotropium.* Dod. p. 70. *Heliotropium majus.* Clus. H. XLVI. a.

2. Heliotropium; Canariense; arborescens; folio scorodonix. H. A. 129. H. R. D.

3. Heliotropium; arborescens; folio teucris; flore albo in capitula densa congesto. H. R. D.

4. Heliotropium; Americanum; cæruleum; foliis hormini. Ac. Reg. Par. 83. Plukn. 245. 4. M. H. 3. 451. *Aguaraguinba.* Pison. Edit. 1658. 229. a. prægn.

5. Heliotropium; Americanum; cæruleum; foliis hormini angustioribus. H. L. M. H. 3. 452. *Jacua Acauga.* Pison. Edit. 1658. 229. a. prægn.

6. Heliotropium; Americanum; procumbens; glaucophyllum. Flor. 2. 61. *Heliotropium monospermum, Indicum, procumbens, glaucophyllum, floribus albis.* Plukn. 36. 3. *Heliotropium, Americanum, procumbens, facie lini umbilicati.* Par. Bat. *Heliotropium, Curassavicum, foliis lini umbilicati.* Par. Bat. Prodr. M. H. 3. 452. *Heliotropium, Americanum, minus, glabrum, folio angusto, glauco.* Breyn. Prodr. 2. H.

7. Heliotropium; minus; angustifolium; arvense; seu hirsutum. Flor. 2. 61. *Echium, scorpioides, arvense.* C. B. P. 254. *Echium, scorpioides.*

GYMNOTETRASPERMAE ASPERIFOLIAE. 191

pioïdes, solissequum, flore minore. J. B. 3. 589. Lithospermum, arvense, minus. T. 137. Scorpioïdes, tertium, minus, Dodonæi. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 1. Fig. 3. Scorpioïdes tertium. Dod. p. 72. Scorpiurus, annuus, arvensis, hirsutus, cæruleus. M. H. 3. 450. a. †.

8. Heliotropium; minus; angustifolium; palustre; seu glabrum. Flor. 2. 61. Ecbium, scorpioïdes, palustre. C. B. P. 254. Ecbium, scorpioïdes, solissequum, flore majore, cæruleo. J. B. 3. 589. Lithospermum, palustre, minus, flore cæruleo. T. 137. Scorpioïdes, major, tertia, Dodonæi. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 1. Fig. 2. Scorpiurus, palustris, perennis, viridioribus foliis. M. H. 3. 451. a. †.

9. Heliotropium; minus; supinum. C. B. P. 253. T. 139. Heliotropium, minus, supinum, quorundam. J. B. 3. 605. Heliotropium-supinum. Dod. p. 70.

10. Heliotropium; Mexicanum; mali limonii foliis; Tlachichtlino patlahoac; seu herba usta; latifolia. Recc. Hern. 292. a. prægn.

ASPERUGO. T. 135. 54.

Calix bifolius, foliolis cristatis constans, per maturitatem compressus adeo, ut ferè concreseat in speciem pelvis, quatuor semina condens.

Flos monopetalos, infundibuliformis, quinquesidus, caducus; margo interior flosculi, ubi incipit explicari, coit in speciem conniventis tubi.

Habitus asper undique.

1. Asperugo; vulgaris. T. 135. Buglossum, sylvestre, cauliculis procumbentibus. C. B. P. 257. Cynoglossa, fortè Topiaria Plinio, seu Ecbium lappulatum quibusdam. J. B. 3. 590. Asperugo spuria. Dod. p. 356. Borrigo, minor, sylvestris, καρχηρόπους. Col. 1. 181. Des. 183. 1c. Buglossum, sylvestre, cauliculis procumbentibus, fructu pedem anserinum referente. M. H. 3. 439. a.

CYNOGLOSSUM. T. 139. 57.

Calix monophyllus, quinquesidus, profundè sectus.

Flos monopetalos, infundibuliformis, quinquesidus, profundè sectus, ubi ex angusto in latum explicari incipit, quinque capitula villosa, erecta instar columnarum cylindricarum, sub his ex tubo floris quinque stamina.

Fructus constat quatuor capsulis asperis plerumque & lappa

192 GYMNOTETRASPERMAE ASPERIFOLIAE.

paceis, affixis placentæ pyramidali, quadrilateræ, fœtis semine plano.

1. Cynoglossum; majus; vulgare. C. B. P. 257. M. H. 3. 448. Cynoglossum vulgare. J. B. 3. 598. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 6. Fig. 2. Cynoglossum. Dod. p. 54. Cynoglossa, vulgaris, major. Col. p. 1. 169. Descr. Flore rubro. b. †.

2. Cynoglossum; majus; vulgare; flore albo. C. B. P. 257. T. 139. b. †.

3. Cynoglossum; floribus ex albo & rubro variegatis. H. L. Flor. 2. 62. b.

4. Cynoglossum; montanum; maximum. T. 139. Cynoglossum, maximum, Belgicum. C. B. P. 257. M. H. 3. 448. Cynoglossa, montana, maxima, frigidarum regionum. Col. 1. 168. Descr. Ic. 170. b.

5. Cynoglossa; media; argentea; Apula; campestris; calidarum regionum. Col. 1. 172. Descr. 171. Ic. Cynoglossum, Creticum, argenteo, angusto, folio. C. B. P. 257. M. H. 3. 449. b. H.

6. Cynoglossum; sempervirens. C. B. P. 257. Prodr. 119. M. H. 3. 449. Cynoglossa, folio virenti. J. B. 3. 600. Cynoglossum, montanum, virenti folio, flore minore. T. 140. b.

7. Cynoglossum; minus. C. B. P. 257. Cynoglossa, minor, Plinii. Col. 1. 179. Ic. Cynoglossa, minor, montana, serotina, altera, Plinii. Col. 1. 180. Descr. Buglossum, angustifolium, semine echinato. T. 134. Lappula rusticorum. Lugd. 1240. Cynoglossum, birsutum, vineale, minus, flosculis minimis, cæruleis. M. H. 3. 449. a.

8. Cynoglossum; Creticum; latifolium; fœtidum. C. B. P. 257. M. H. 3. 449. Cynoglossum Creticum II. Clusii J. B. 3. 601. Clus. H. CLXII. Cynoglossum, folli molli, incano, flore cæruleo, striis rubris variegato. M. H. R. Blæs. b. †.

9. Cynoglossum Narbonense. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 6. F. 3. b. H.

OMPHALODES. T. 140. 58.

Calix monophyllus, mollis, expansus in quinque, longa, gracilia, segmenta.

Flos monopetalos, rotatus, quinquesfidus, in segmenta magna rotunda explicatus, cum umbilico assurgente medio, ex inferiore, interiore, angustiore parte floris, quinque stamina tubam arctè amplexa.

Fructus constat capsulis quatuor, cavis, umbilicatis, calathum referentibus, semen ferè planum continentibus, placentæ pyramidatae, quadrilateræ, affixis.

1. Omphalodes; pumila; verna; symphyti folio. T. 140. Symphytum,

GYMNOTETRASPERMAE ASPERIFOLIAE. 193

tum, minus, borraginis facie. C. B. P. 259. *Symphytum, minimum, repens, sive borrago minima Herbariorum.* J. B. 3. 597. *Borrago minima.* H. Eyst. Hyem. o. 1. F. 4. Fig. 1. *Borrago, minor, verna, repens, folio lævi.* M. H. 3. 437. co.

2. *Omphalodes; Lusitanica; lini folio.* T. 140. *Umbilicata linifolia.* Flor. 2. 62. *Linum umbilicatum.* Park. Theatr. 1687. *Buglossa affinis, semine umbilicato, seu cotylode.* I. R. H. 496. *Cynoglossum, minus, album, lini foliis glaucis, semine umbilicato.* M. H. 3. 449. a.

3. *Omphalodes; Lusitanica; elatior; cynoglossi folio.* T. 140. *Linum umbilicatum, folio latiori.* Ind. 78. a.

PULMONARIA. T. 136. 55.

Calix tubo similis, pentagonus, quinquefidus.

Flos monopetalos, cylindricus inferius, orâ quinquefidâ in segmenta rotunda, pelvum referens superius, ex lateribus partis cylindricæ internæ eleganter fimbriatis oriuntur quinque stamina.

1. *Pulmonaria; vulgaris; latifolia; flore albo.* T. 136. *Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia.* C. B. P. 259. M. H. 3. 444. *Pulmonaria, Italarum, ad buglossum accedens.* J. B. 3. 595. *Pulmonaria, vulgaris, maculoso folio.* Clus. H. CLXIX.

2. *Pulmonaria; Alpina; foliis mollibus, subrotundis; flore cæruleo.* T. 136. *Symphytum, seu Pulmonaria Alpina, foliis mollibus, subrotundis, flore cæruleo.* H. R. Par. *Pulmonaria maculosa.* H. Eyst. Vern. o. 1. F. 1. Fig. 4. *Symphytum maculosum.* Dod. p. 135. *Symphytum magis maculosum.* Ind. 78. *Pulmonaria, Batavica, maxima, foliis longioribus, maculis majoribus conspersis.* M. H. 3. 444.

3. *Pulmonaria; foliis echii.* Lob. Ic. 586. *Pulmonaria, angustifolia, rubente cæruleo flore.* C. B. P. 260 M. H. 3. 444. *Pulmonaria, V, Pannonica.* Clus. H. CLXX. *Symphytum maximè maculosum.* Ind. 78.

4. *Pulmonaria; folio non maculoso.* Clus. H. CLXIX. *Symphytum, minus, non maculatum, Germanicum, angustifolium, floribus è rubentibus cæruleis.* M. H. 3. 444.

5. *Pulmonaria; major; non maculosa.* J. B. 3. 493. *Pulmonaria, viridi, subrotundo, non maculato, folio.* Bocc. Mus. p. 2. 135.

6. *Pulmonaria; Orientalis; calice vesicario; foliis echii; flore purpureo, infundibuliformi.* T. Cor. 6. a.

ECHIUM. T. 135. 54.

Calix valdè amplius, in quinque longa, gracilia, segmenta, divisus.

Flos monopetalos, imâ parte cylindricus, infundibuliformis, inflexus, parte superiore superat inferiorem ita, ut referat quasi galeam bifidam, & labium trifidum; stamina ejus quinque sunt inflexa, quasi corniculata.

Semina viperino capiti similia.

1. Echium vulgare. C. B. P. 254. J. B. 3. 586. M. H. 3. 440. Ecbium. Dod. p. 631. b. †.
2. Echium; Creticum; latifolium; rubrum. C. B. P. 254. M. H. 3. 441. Ecbium, Creticum, I. Clus. H. CLXIII. a.
3. Echium; Creticum; angustifolium; rubrum. C. B. P. 254. M. H. 3. 441. Ecbium, Creticum, II. Clus. H. CLXV. b.
4. Echium; sylvestre; hirsutum; maculatum. C. B. P. 254. M. H. 3. 440. Ecbium, rubro flore. J. B. 3. 589. Clus. H. CLXIII. b.
5. Echium; majus; & asperius; flore dilutè purpureo. Bot. Monsp. M. H. 3. 440. Lycopsis, Monspelica, floribus dilutè purpureis. M. H. Blaes. H. b.
6. Echium; procumbens; annuum; flosculis atro-rubentibus. M. H. Blaes. b. H.
7. Echium; Ægyptiacum; ferox; flore albo. Lippii. An Ecbium, Orientale, longioribus foliis. M. H. 3. 441. Lycopsis Ægyptiaca. C. B. P. 255. Lycopsis Dioscoridis & Rawolf. H. L. App. Ecbium ferox, Ægyptium, flore carneo. Ind. 79. a.
8. Echium; majus; & asperius; flore albo. C. B. P. 254. M. H. 3. 440. Ecbium, flore albo, majus. J. B. 3. 588. Ecbium, flore. Cam. 738. b.
9. Echium; folio amplissimo; Lusitanicum. T. 135. Ecbium, folio asperrimo, verrucoso. Ind. 78. b.
10. Echium; foliis angustis & villosis. T. 136. Anchusa, angustis, villosis, foliis. Bocc. Mus. 2. 84. T. 78. Ecbium perlatum, angustifolium, Hispanicum, quorundam. a.
11. Echium; annuum; folio lithospermi arvensis; flore caeruleo, parvo. Micheli. a.

SYMPHYTUM. T. 138. 56.

Calix usque ad basin sectus in quinque, longa, gracilia, segmenta.

Flos monopetalos, in inferiore parte cylindraceus, orâ
su-

superiore urceum referens quinquefidâ, pendulus, ex inferiore, inferiore, parte fistulosâ floris, ubi incipit explicari, enascuntur quinque stamina, & quinque acuti conniventes pali, alternatim posita.

Semina polita, lucida, lithospermi.

1. Symphytum; consolida major; mas; flore purpureo. C. B. P. 259. M. H. 3. 444. Symphytum magnum. J. B. 3. 593. Dod. p. 134. Symphytum, majus, flore purpureo. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 7. Fig. 3. †.

2. Symphytum; consolida major; foemina; flore albo, vel pallidè luteo. C. B. P. 259. Symphytum, flore pallido. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 7. Fig. 3. †.

3. Symphytum; consolida major; mas; flore purpureo cæruleo. C. B. P. 259.

4. Symphytum; consolida major; mas; flore coccineo. An Symphytum, majus, flore rubro. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 7. Fig. 2? †.

5. Symphytum; majus; tuberosâ radice. C. B. P. 259. M. H. 3. 444. Symphytum tuberosum. J. B. 3. 594. Dod. p. 134. Symphytum, tuberosum, majus. Clus. H. CLXVI.

6. Symphytum; echii folio angustiore; radice rubrâ; flore luteo. T. 138. Anchusa, lutea, minor. C. B. P. 255. M. H. 3. 442. Anchusa, echioides, lutea, cerinthoides, montana. Col. 1. 183. b. H.

CERINTHE. T. 79. 56.

Folia glauca, vel viridia.

Flos monopetalos, campaniformis, tubulatus, multifidus, orâ quandoque clausâ, aliâs patente.

Pistillum calicis tetragonum sit fructus, constans testis duabus subrotundis, divisus in duo loculamenta foeta semine ut plurimum oblongo.

1. Cerinthe; quorundam; major; versicolore flore. J. B. 3. 602. Clus. H. CLXVII. Cerinthe, seu cynoglossum, montanum, majus. C. B. P. 258. M. H. 3. 445. Maru, herba. Dod. p. 632. a.

2. Cerinthe; quorundam; major; flore ex rubro-purpurascēte. J. B. 3. 603. Clus. H. CLXVIII. Cerinthe, flore ex rubro-purpurascēte. C. B. P. 258. M. H. 3. 446. a.

3. Cerinthe; quorundam; major; spinoso folio; flavo flore. J. B. 3. 602. Cerinthe, flavo flore, asperior. C. B. P. 258. M. H. 3. 445. Cerinthe, quorundam, major, flavo flore. Clus. H. CLXVII. a.

4. Cerinthe; quorundam; minor; flavo flore. J. B. 3. 603. Clus. H. CLXVIII. Cerinthe minor. C. B. P. 258. M. H. 3. 446. a.

Bb 2

5. Ce-

196 GYMNOTETRASPERMÆ ASPERIFOLIAE.

5. Cerinthe; flore versicolore ex luteo & albo. *a.*
6. Cerinthe; flore versicolore ex albo & rubro. *a.*
7. Cerinthe; flore versicolore ex albo & purpureo. *a.*
8. Cerinthe; folio non maculato, viridi. *C. B. P. 258. Cerinthe, V, folio non maculato. Clus. App. Alt. ad Lib. V. M. H. 3. 446. H.*

CERINTHOIDES.

Folia glauca, glabra.

Calix monophyllus, tubulatus, pentagonus, in quinque plicas alatus.

Flores parvi, tubulosi, quinquesidi, non stellati.

Semina levia.

1. Cerinthoïdes; argentea; flore pulchrè cæruleo. *Buglossum, marinum, incanum, flore cæruleo. H. L. T. 135. Cynoglossum, maritimum, procumbens, læve, purpuro-cæruleum. Flor. 2. 62. Cynoglossum, procumbens, glaucophyllum, maritimum, nostras, floribus purpuro-cæruleis, seminibus lævibus. Plukn. T. 172. Fig. 3. Cynoglossum, perenne, maritimum, procumbens, foliis glaucis, brevioribus. M. H. 3. 450. Ecbium marinum. Phytol. Britann. Raj. Synops. 120. H.*

GYMNOTETRASPERMÆ
TETRAPETALÆ.

Unâ familiâ constant, quæ vocatur

POTAMOGEITON. *T. 232. 103. Raj. Meth. 22.*

Radix fibrosa, vivax.

Folia ad caules alterna, ad exortum pedunculi florum spicatorum bina, juncta ex adverso.

Calix tetraphyllos. Raj. Meth. 22. Nullus. T. 232.

Flos tetrapetalos, in spicam congestus.

Semina quatuor, angulosa, nuda, singulis flosculis succedentia.

Nasci in aquis, & sub iis crescere.

1. Potamogeton; rotundifolium. *C. B. P. 193. Raj. Syn. 60. Potamogeton, rotundiori folio. J. B. 3. 776. Potamogeton, I. Lugd. 1007. Potamogeton spicata. Tab. Ic. 739. †.*
2. Po-

GYMNOTETRASPERMAE TETRAPETALAE. 197

2. Potamogeton; foliis latis, splendentibus. C. B. P. 193. *Potamogeton, altera, Dodonæi. J. B. 3. 778. Potamogeton, tertia. Dod. p. 582. Potamogeton perfoliatum. Raj. Syn. 61. †.*

3. Potamogeton; longo, serrato, folio. C. B. P. 193. *Lapathum, fluitans, longo, serrato, folio. J. B. 2. 988. Potamogeton, altera. Dod. p. 582. Oxylapathum, aquaticum, Dalechampi. Lugd. 603. †.*

4. Potamogeton; foliis crispis, conjugatis. *Potamogeton, foliis crispis, sive lactuca ranarum. C. B. P. 193. Potamogiton, seu fontalis, media, lucens. J. B. 3. 777. Tribulus, aquaticus, minor, alter. Clus. H. cclii. †.*

5. Potamogeton; seu fontalis crispa; foliis alternis; cauliculis compressis. *Potamogiton, seu fontinalis crispa. J. B. 3. 778. Tribulus, aquaticus, minor. Clus. H. cclii. †.*

6. Potamogiton; aquis immersum; folio pellucido, lato, oblongo, acuto. *Raj. Syn. 61. Potamogeton, foliis angustis, splendentibus. C. B. P. 193. Potamogeton, alterum. Dod. Belg. 923. †.*

7. Potamogiton; caule compresso; folio graminis canini. *Raj. Syn. 61. Hist. 189. †.*

8. Potamogiton; pusillum; gramineo folio; caule rotundo. *Raj. Hist. 190. Syn. 62. †.*

9. Potamogeton; flosculis ad foliorum nodos. *T. 233. Millefolium, aquaticum, flosculis ad foliorum nodos. C. B. P. 141. Myriophyllum, aquaticum, minus. Clus. H. cclii. †.*

10. Potamogeton; foliis pennatis. *T. 233. Millefolium, aquaticum, pennatum, spicatum. C. B. Prodr. 73. M. H. 3. 622. Millefolium, pennatum, aquaticum. J. B. 3. 783. †.*

11. Potamogeton; ramosum; angustifolium. *C. B. P. 193. Prodr. 101. J. B. 3. 778. †.*



PLANTÆ ENANGIOSPERMÆ.

Perficientes semina sua vasculis inclusa.

MONOANGIÆ, POLYSPERMÆ, VASCULO BREVIORI.

Quibus à flore quolibet nascitur unum conceptaculum, condens semina multa, placentæ communi adnata per pedunculum exiguum.

I.

Flore monopetalo.

PRIMULA VERIS. T. 124. 47.

Radix perennis.

Folia oblonga, rugosa.

Calix quinquesidus, pentagonus, mollis, cui insidet

Flos monopetalus, hypocrateriformis, margine in quinque segmenta cordata, bifida, fisso, præditus quinque staminibus ex interiore pariete tubuli floris.

Conceptaculum seminale est testa oblonga, in calice recondita, tubâ longâ instructa, apice dehiscente.

Semina subrotunda.

Malp. An. Pl. 43. 139. 44. 147. 44. 148. 48. 173.

1. Flore singulari in singulo quoque cauliculo.

1. *Primula veris*; pallido flore; humilis. *Clus. H. 302. Primula veris, sylvestris, flore pallido. H. Eyst. Vern. 6. 1. F. 1. Fig. 5. Verbasculum, sylvestre, majus, singulari flore. C. B.P. 241. M.H. 2. 555. Herba paralyfis. Cæs. 261.*

2. *Primula veris*; Constantinopolitana; flore albo. T. 125. *Carchichec Turcarum, sive Primula veris, Constantinopolitana. Corn. 85. Primula veris, hortensis, singulari flore. Flor. 2. 85. Verbasculum Turcicum, seu Carchichec Turcarum. M. H. 2. 555.*

3. *Primula veris*; Constantinopolitana; flore dilutè carneo. T. 125

4. *Primula veris*; Constantinopolitana; flore dilutè purpureo. *T.* 125.
5. *Primula veris*; Constantinopolitana; flore majore purpureo. *T.* 125.
6. *Primula veris*; Constantinopolitana; flore minore purpureo. *T.* 125.
7. *Primula veris*; Constantinopolitana; flore miniato. *T.* 125.
8. *Primula veris*; Constantinopolitana; flore luteo. *T.* 125.
9. *Primula veris*; Constantinopolitana; flore flavescente. *T.* 126.
10. *Primula veris*; Constantinopolitana; flore obsoletè pallido. *T.* 126.
11. *Primula veris*; Constantinopolitana; flore obsoleto. *T.* 126.
12. *Primula veris*; flore pleno. *H. Eyf. Vern. o. 1. F. 5. Fig. 3. Verbasculum, sylvestre, magno, plenoque, flore. C. B. P. 242. Primula veris, floribus plenis, ex singularibus pediculis. J. B. 3. 497.*

2. Flore plurimo in umbellam quasi congesto.

1. *Primula veris*; umbellata; odorata; pratensis. *Flor. 2. 186. Primula veris, odorata, flore luteo, simplici. J. B. 3. 495. Primula veris, flavo flore, elatior. Clus. H. 301. Primula veris, major, floribus luteis, odoratis. Dod. p. 147. Verbasculum, pratense, odoratum. C. B. P. 241. M. H. 2. 554. Primula veris, flore luteo. H. Eyf. Hyem. F. 4. F. 5. Herba paralyfis, vulgaris. Trag.* 2
2. *Primula veris*; pallido flore; elatior. *Clus. H. 302. Primula veris, caulifera, pallido flore, inodoro, aut vix odoro. J. B. 3. 496. Verbasculum pratense, vel sylvaticum inodorum. C. B. P. 241. M. H. 2. 554.* 3
3. *Primula veris*; geminato flore. *H. Eyf. Vern. o. 1. F. 5. Fig. 4. Verbasculum proliferum. C. B. P. 242. M. H. 2. 554. Malp. An. Pl. 44. 147. Flore flavescente.*
4. *Primula veris*; Anglicana; flore pleno. *H. Eyf. Vern. o. 9. F. 3. Fig. 2. Primula veris, caulifera, flore luteo, pleno, odorato. J. B. 3. 496. Verbasculum, hortense, multiplex. C. B. P. 242. Malp. An. Pl. 44. 148.*
5. *Primula veris*; hortensis; umbellata; caule & flore folioso, coccineo, majore. *H. L.*
6. *Primula veris*; hortensis; umbellata; flore folioso, luteo, minore. *H. L.*
7. *Primulae veris*; umbellatae; odoratae; hortensis; simplicis varietas uberrima pro varietate jucundissimâ coloris multiplicis.
8. *Primulae veris*; umbellatae; geminato flore abundans & grata ratione pigmenti discrepantis copia.

AURICULA URSI. T. 120. 46.

Radix perennis.

Folia lævia, densa, pingua.

Calix parvus, brevis, ut flos ferè nudus, quinquesidus, rigidus, constans.

Flos infundibuliformis, quinquesidus, segmentis bifidis, instructus quinque staminibus, brevibus, ex interiore pariete tubuli floris.

Fructus est testa globosa, in calice recondita, emittens tubam longam, per maturitatem ovarii apex dehiscens.

Semina plurima, exigua.

1. Auricula ursi; flore luteo. J. B. 3. 499. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 2. Fig. 3. Clus. H. 302. Auricula ursi, lutea. H. L. Sanicula, Alpina, lutea. C. B. P. 242. M. H. 2. 557. Alisma, sive Damasonium, Dioscoridis. Col. Phytob. 1. 8.
2. Auricula ursi; flore purpureo. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 2. Fig. 2.
3. Auricula ursi; flore albo. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 2. Fig. 3.
4. Auricula ursi; flore magno, atro-purpureo, holoserico, simplici, umbone candido, amplissimo. H. L.
5. Auricula ursi; flore magno, undulato, obsoletè incarnato, umbone pallido, amplissimo. H. L.
6. Auricula ursi; flore magno, undulato, colore vario, umbone amplissimo, flavescente. H. L.
7. Auricula ursi; umbone triplici, vario. H. L.
8. Auricula ursi; umbone amplissimo, radiato, aureo. H. L.
9. Auricula ursi; umbone amplissimo, stellato, aureo. H. L.
10. Auricula ursi; flore nigricante, ferrugineo, majore. T. 121.
11. Auricula ursi; densis & variegatis foliis; flore maximo. T. 121.
12. Auricula ursi; flore variegato. T. 121. Auricula ursi, flore rubro, maculis albidis, foliis subhirsutis. J. B. 3. App. 868.
13. Auricula ursi; foliis rotundis. T. 121. Auricula ursi, V. Clus. H. 304.
14. Auricula ursi; angustifolia. T. 121.
15. Auricula ursi; Alpina; angustifolia. T. 121.
16. Auricula ursi; foliis quasi farinâ adpersis. T. 121. Auricula ursi, VII. Clus. Cur. Post. Fol. 30.
17. Auricula ursi; carnei coloris; foliis minimè serratis. J. B. 3. App. 868. Auricula ursi, IV. Clus. H. 304.
18. Auricula ursi; flore magno, pleno, flavo. H. L.
19. Auricula ursi; flore magno, pleno, albo. H. L.
20. Auricula ursi; flore magno, pleno, purpureo.

21. Auricula urfi; flore magno, pleno, atro-puniceo, holoserico. *H. L.*

22. Auricula urfi; flore magno, pleno, coccineo. *H. L.*

23. Auricula urfi; flore magno, pleno, ex aureo, albo, & puniceo, variegato. *H. L.*

24. Auricula urfi; flore magno, pleno, ex flavo & coccineo variegato. *H. L.*

25. *Fertilissima abundantia Auriculæ urfi, quâ spectatorem demulcet flore variegatae magnitudinis, figuræ, coloris; umbone floris magno, parvo, variè colorato, plano, radiato, stellato; ambitu floris integro, undulato, cordiformi, stellato, reflexo, unicolore, versicolore; segmentis florum unâ, vel multiplici, serie discretis; flore magis, minus-ve, cineribus farinaceis adperso; folio integro, serrato, viridi, cinericeo, rotundiore, longiore, latiore, angustiore. Amœnitate hæc speciosa frui avidus reperiet, unde desiderium expleat, in horto instructissimo Viri Clarissimi, Frederici Dekkers, Medicinæ in hæc Academiâ Professoris Celeberrimi, & Floræ pulcherrimæ Cultoris guarissimi atque liberalissimi. Qui omnes ostentat species, quas ordine recenset Joannes Georgius Volckamer usque 66. numero, in Hesperidibus Noriberg. & præter has alias quam plurimas.*

26. Auricula urfi; minima; flore carneo & niveo. *J. B. 3. App. 869. Sanicula, Alpina, minima, crenata. Flor. 2. 86. Auricula urfi, VIII. Clus. H. 305. Sanicula, Alpina, minima, carnea & nivea. C. B. P. 243. Primula veris, angustifolia, alba. H. Eyst. Vern. o. 7. F. 4. Fig. 5. Plumula veris, vulgò. H.*

27. Auricula urfi; minima; flore rubro. *Primula veris, angustifolia, rubra. H. Eyst. Vern. o. 7. F. 4. Fig. 4. Plumula veris, vulgò. H.*

28. Auricula urfi; Alpina; folio gramineo; jasmmini lutei flore. *T. 122. H.*

29. Auricula urfi; Africana; folio lato, splendente, spinoso. *H.*

ANDROSACE. *T. 123. 48.*

Folia plantaginea, crenata.

Calix magnus, expansus, quinquefidus, succingens umbellam floriferam, sex pedunculis florigeris ornatam. Finis cujusque pedunculi explicatur in calicem magnum, quinque-lobatum, expansum.

Flos hypocrateriformis, pentapetaloides, centro apicis ovarii insidens, staminibus quinque instructus, parte posteriore, inferiore pertusus.

Fructus globosus, centro insidens calicis, emittit tubam cavam.

1. Folia; annua. T. 123. Alsine affinis, Androsace Matthioli, altera. J. B.

3. 368. Clus. H. CXXXIV. *Androsace*, dicta major. M. H. 2. 556. *Auriculae urfi* affinis, *Androsace* dicta, major. H. L. a.

SAMOLUS. T. 143. 60.

Folia subrotunda, non crenata, alterna.

Calix quinquefidus, profundè dissectus, ut quinquefolius appareat.

Flosculus monopetalus, rotatus, quinquefidus, instructus quinque staminibus, & quinque corniculis albis, ovario ferè insidet.

Ovarium calice coronatum descripto fit fructus, fetus plurimo semine exiguo, debiscens in multas partes.

1. Samolus Valerandi. J. B. 3. 791. *Veronica*, aquatica, folio subrotundo, non crenato. M. H. 3. 323. H. L. 622. *Anagallis*, aquatica, folio rotundo, non crenato. C. B. P. 252. a. †.

SOLDANELLA. T. 182. 16.

Radix perennis.

Folia rigida, Asari minora.

Flos campaniformis, fimbriatus.

Fructus cylindraceus, apice debiscente.

1. Soldanella; Alpina; rotundifolia. C. B. P. 295. *Soldanella*, montana quibusdam. J. B. 2. 817. *Soldanella*, Alpina, minor. Clus. H. 309. H.

LYSIMACHIA. T. 141. 59.

Folia oblonga, integra, bina, terna, quaterna, ad singulos nodos caulium.

Flos monopetalus, rotatus, multifidus, sparsus in summis ramis.

Fructus fit testa ferè globosa, apice debiscens.

1. *Lyfimachia*, lutea; major; quæ Dioscoridis. C. B. P. 245. *Lyfimachia* lutea. H. Eyf. Æst. o. 10. F. 6. Fig. 3. J. B. 2. 901. *Lyfimachium* luteum. Dod. p. 84. *Blattarie* affinis planta, major, flore luteo. M. H. 2. 491. Foliis binis, ternis, quaternis, quinis.

2. *Lyfimachia*, bifolia; flore luteo, globoso. C. B. P. 245. *Lyfimachia*, altera, lutea Lobelio, flore quasi spicato. J. B. 2. 902. *Lyfimachia*, lutea, altera. Clus. H. L. *Lyfimachia*, lutea, Pannonica, major. H. Eyf. Æst. o. 10. F. 7. F. 1.

3. Ly-

3. *Lyfimachia*; sempervirens; spicata; ephemerum dicta; flore blattariæ. *H. L. Lyfimachia*, spicata, flore albo, folio salicis. *T.* 141. *Blattariæ* affinis planta, bifolia, lævis, flore albo, ephemerum. *M. H.* 2. 491. *Ephemerum Matthioli*. *J. B.* 2. 905.
4. *Lyfimachia*; Orientalis; angustifolia; flore purpureo. *T. Cor.* 7. *b. H.*
5. *Lyfimachia*; annua; minima; polygoni folio. *T.* 142. *Linum*, minimum, stellatum. *C. B. P.* 214. *Prodr.* 107. *Bot. Monsp. a.*
6. *Lyfimachia*; Canadensis; lutea; folio jalappæ. *Sarazen. H.*

NUMMULARIA. *Flor.* 2. 93.

Folia orbicularia, conjugata.

Calix quinquefidus, occultans capsulam seminalem, constans quinque longis, gracilibus, instar stellæ expansis, segmentis.

Flos monopetalus, rotatus, quinquefidus, sectus in unguem usque, præditus quinque staminibus, quæ ex ambitu basios floris in unum concresecunt, ex alis foliorum

In fundo calicis placenta, cui innascitur ovarium, quod fit

Vasculum rotundum, calice reconditum, emittens tubam longam.

1. *Nummularia*; lutea; major. *C. B. P.* 309. *M. H.* 2. 567. *Nummularia. H. Eyst. Æst.* 0. 12. *F.* 2. *Fig.* 3. *Dod.* p. 600. *Nummularia*, sive *Centimorbia*. *J. B.* 3. 370. *Lyfimachia*, humifusa, folio rotundiore, flore luteo. *T.* 141. †.

2. *Nummularia*; rubra. *J. B.* 3. 371. *Nummularia*, minor, purpurascens flore. *C. B. P.* 310. *Prodr.* 136. *M. H.* 2. 567. *Lyfimachia*, humifusa, folio rotundiore, flore purpurascens. *T.* 141. †.

ANAGALLIS. *Flor.* 2. 93. 94.

Folia conjugata.

Calix quinquefidus, in quinque longa, angusta, segmenta, instar stellæ expansus.

Flos pentapetaloides, stellatus, longis pedunculis innixus, ovario circumnatus, cum staminibus quinque.

Aliquando calix & flos habent modò quatuor segmenta, tumque & quatuor modò stamina.

Vascula rotunda, horizontaliter dissilientia.

1. *Anagallis*; lutea; nemorum. *C. B. P.* 252. *M. H.* 2. 569. *Anagallis*, lutea, nummulariæ similis. *J. B.* 3. 370. *Anagallis*, flavo flore.

Clus. H. CLXXXI 1. Lysimachia, humifusa, folio subrotundo, acuminato, flore luteo. T. 142. †.

2. *Anagallis; phœniceo flore. C. B. P. 252. M. H. 2. 568. Anagallis, phœnicea, mas. J. B. 3. 369. Anagallis, mas. Dod. p. 32. a. †.*

3. *Anagallis; cæruleo flore. C. B. P. 252. M. H. 2. 569. Anagallis, cærulea, fœmina. J. B. 3. 369. Anagallis, fœmina. Dod. p. 32. a. †.*

4. *Anagallis; cærulea; foliis binis, ternis-ve, ex adverso nascentibus. C. B. P. 252. M. H. 2. 569. Anagallis, tenuifolia, Monnelli. Clus. Hist. App. Alt. ad. Libr. VI. Flore ampliore. H. L. H.*

5. *Anagallis; flore purpurascens. C. B. P. Var. 252. a. †.*

6. *Anagallis; flore carneo. Park. Theatr. 558. a. †.*

HYDROPHYLLON. T. 81. 16.

Radix parte superiore Dentariæ similis.

Folia Valerianæ sylvestris.

Calix quinquefidus, stellatus, segmentis longis, angustis, bispidis, lanugine instructis, florem longè exsuperantibus.

Flos tubulosus, quinquefidus, Echii flori similis, quinque staminibus præditus.

In fundo calicis placenta, cui innascitur ovarium, instructum tubâ bifidâ, apicibus recurvis.

Flosculi cum caliculis arctè uniti in globum referunt caput pilosum.

1. *Hydrophyllon; Morini. Joncq. Hort. 43. Dentariæ affinis, echii flore, capsulâ anagallidis. A. R. Par. 77. Dentariæ affinis, echii flore. H. R. Par. Dentariæ affinis, flore echii, capsulâ rotundâ. M. H. Blas. 259. Dentariæ facie planta, monopetalos, fructu rotundo, monopyreno. M. H. 3. 599.*

GENTIANA. T. 80. 40.

Folia conjugata.

Calix monophyllus, membranaceus, instar vaginæ.

Flos calathoides, quadrifidus, quinquefidus, septemfidus, octofidus. Rivin. ad Raj. 24.

Fructus unicapsularis, membranaceus, ovatus, acuminatus, bivalvis, bicornis. Rivin. Ibid.

Semina plana, orbiculata, marginata.

1. *Gentiana; major; lutea. C. B. P. 187. M. H. 3. 484. Gentiana,*
cul-

vulgaris, major, ellebori albi folio. J. B. 3. 520. *Gentiana Veterum.* Clus. H. 311.

2. *Gentiana; asclepiadis folio.* C. B. P. 187. J. B. 3. 523. M. H. 3. 484. *Gentiana, II, cæruleo flore.* Clus. H. 312.

3. *Gentiana; cruciata.* C. B. P. 188. M. H. 3. 483. *Gentiana, minor, seu vulgi cruciata.* J. B. 3. 522. *Gentiana, III, cruciata.* Clus. H. 313. *Cruciata.* H. Eyst. Vern. o. 8. F. 8. Fig. 3. †.

4. *Gentiana; Alpina; flore magno.* J. B. 3. 523. *Gentianella, Alpina, latifolia, & angustifolia, magno flore.* C. B. P. 187. *Gentiana, V, Gentianella, major, verna.* Clus. H. 314. *Gentiana V, sive Gentianella, verna, major.* Clus. H. Ger. M. H. 3. 483.

5. *Gentiana; Alpina; pumila; verna; major.* T. 80. *Gentianella, Alpina, verna, major.* C. B. P. 188. *Gentianella, quæ hippion.* J. B. 3. 527. *Gentiana, VI, Gentianella, minor, verna.* Clus. H. 315. *Gentianella, minima, verna, flore cæruleo.* H. Eyst. Vern. o. 7. F. 5. Fig. 3. M. H. 3. 483. †.

6. *Gentiana; angustifolia; autumnalis; major.* C. B. P. 188. *Gentiana, palustris, angustifolia.* C. B. P. 188. M. H. 3. 483. *Gentiane species, calathiana quibusdam, radice perpetua, sive palustris.* J. B. 3. 524. *Pneumonanthe.* Tabern. Ic. 787. *Campanula, autumnalis.* Dod. p. 168. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 11. Fig. 2. †.

7. *Gentiana; palustris; latifolia; flore punctato.* C. B. P. 188. M. H. 3. 482. *Gentiana, punctato flore, subcæruleo, Pennæi.* J. B. 3. 528. *Gentiana, XII, punctato flore.* Clus. H. 316. †

MENYANTHES. T. 117. 15.

Radix perennis, repens.

Folia formâ & magnitudine fabaceâ, terna in uno pedunculo.

Finis pedunculi fit calix monophyllus, quinquefidus, expansus.

Flos infundibuliformis, quinquefidus, profundissimè incisus, segmentis eleganter per cirrhos albos intus fimbriatus, in thyrsum congestus.

Fructus oblongus, bivalvis, unicapsularis, tubâ longâ apice scabro instructus, sætus seminibus rotundis, in fundo calicis latens.

1. *Menyanthes; palustre; latifolium, triphyllon.* T. 117. *Trifolium palustre.* C. B. P. 327. Dod. p. 580. J. B. 2. 389. H. Eyst. Vern. o. 7. F. 1. Fig. 3. *Trifoliata paludosa.* M. H. 2. 149. *Acopa Dioscoridis.* M. H. 3. 604. *Majus, & rotundiori folio.* †.

Cc 3

2. Me-

2. Menyanthes; palustre; angustifolium; triphyllon. T. 117. *Tri-
folium*, palustre, minus, acutiori folio. C. B. P. 327. Var. †.

GLAUX. T. 88. 60.

Radix perennis.

Folia conjugata, crassiuscula, pingua.

*Flos campaniformis, patens, vel clausus, quinquefidus, nu-
dus, parvus, ad folia hærens, staminibus quinque instru-
ctus, natis ex imâ parte basios ovarii, & pariete interno
imi floris.*

*In imo fundo floris ovarium globosum, tubâ longâ instru-
ctum, apice per maturitatem hiantem.*

1. Glaux; maritima. C. B. P. 215. Glaux, exigua, maritima. J. B.
273. Gerard. 562. M. H. 3. 607.

2. Glaux; maritima; minima.

CORTUSA. Flor. 2. 87. Par. Bat. 129.

Radix perennis.

*Folia subrotunda, rugosa, crenata, hederæ terrestri si-
milis.*

Calix parvus, quinquefidus.

Flos infundibuliformis, multifidus, umbellatus.

*Fructus subrotundus, acuminatus, oblongus, in calice
hærens.*

1. Cortusa. J. B. 3. 499. Cortusa Matthioli. Clus. H. 307. *Sanicu-
la*, montana, latifolia, sinuata. C. B. P. 243. M. H. 2. 558. *Auricu-
la* urf, laciniata, seu Cortusa Matthioli, flore rubro. T. 121.

HOTTONIA.

Radix fibrosa, repentissima.

Caulis erectus, nudus.

*Folia capillacea, pennata, alternè accreta ramis, qui in or-
bem appositi sunt cauli, atque inde quaquaversum expansi.*

*Eidem cauli adnascuntur verticillatim pedunculi, quorum
extrema expanduntur in calicem pentaphyllum, constantem
quinque longis, gracilibus, foliolis, in speciem radiantis stelle
expansis.*

*In centro calicis nascitur placenta; ex ambitu ejus flos
emer-*

emergit monopetalus, imâ parte tubulosus, ibi ovarium amplexus, suprâ expansus in quinque segmenta, larga, obtusa, profundè incisa, instar rosæ expansa; ubi expandi tubulus floris in amplum incipit pariete interno producit quinque stamina, brevia, suis instructa testiculis.

Ovarium, eidem placentæ innatum, est ferè sphaericum, emittens ex centro apicis umbilicati tubam longam, gracilem, cujus apex excavatus in formam cymbæ; constat uno loculo, in quo erigitur placenta cylindrica, crassa, gerens pileolum ut fungi pileati, cujus convexæ superficiei accrescunt undique semina plurima sphaerica.

1. *Hottonia*. *Millefolium aquaticum*, seu *viola aquatica*, caule nudo. C. B. P. 141. M. H. 3. 622. *Viola aquatilis*. Dod. p. 584. *Myriophyllum*, *equisetifolium*, *fluviatile*. Lob. Adv. 354. Obs. 460. *Millefolium aquaticum*, dictum *viola aquatica*. J. B. 3. 782. *Millefolium aquaticum floridum*, sive *viola aquatica*. Park. Tb. 1256. *Viola palustris*. Ger. †. aq.

Sanctam mihi memoriam Viri Clari, Petri Hotton, Decessoris mei, pio animo commendare fas sit omnibus, qui sapientiam, virtutem, remque herbariam amant, coluntque. Fuit sanè ipse omnibus his, si quis alius, inchytus. Sublati ex oculis sentiant Manes gratam superesse Bonis Viri egregii recordationem!

2.

Flore pentapetalo.

MITELLA. T. 242. 126.

Radix perennis.

Folia Cortusæ.

Finis pedunculi fit calix, monophyllus, quinquefidus, apertus.

Flos rosaceus, pentapetalus, spicatus, petalis natis ex interstitiis segmentorum calicis.

Fructus subrotundus, acuminatus, bifariam debiscens in formam Mithræ Episcopalis, fœtus seminibus multis.

1. *Mitella*; *Americana*; florum petalis integris. T. 242. *Cortusa*, *Americana*, flore spicato, petalis integris. H. L. App. 661. Flor. 2. 87. Par. Bat. 124. *Cortusa Indica*, vel *hedera terrestris*. Stap. in Theop. 366. *Sanicula*, *montana*, *Americana*, *repens*. H. R. Par.

2. *Mitella*; *Americana*; florum petalis fimbriatis. T. 242. *Cortusa*, *Americana*, flore spicato, petalis fimbriatis. H. L. App. 661. Flor. 2. 87. Par. Bat. 139. *Sanicula*, seu *Cortusa Americana*, altera, flore minuto, fimbriato. H. R. Par. H.

3. Mi-

3. *Mitella*; *Americana*; flore squallidè purpureo, villosa. *Cortusa*, *Americana*, flore squallidè purpureo, villosa. *Flor.* 2. 87. *Plukn. Phytogr.* T. 58. Fig. 3. *Cortusa*, *Americana*, floribus herbidis. *Par. Bat. Ic.* 3. *Descr.* 130. Huic calix est monophyllus, globosus, quinquefidus, segmentis profundè incisis.

Flos constat petalis quinque tenerrimis, instar staminum, habetque stamina quinque instructa testiculis rubro-croceis. In imo calicis fundo placentula, cui innascitur ovarium instructum binis longis tubis, recurvis, ut in *Geo*: unde & eò referri sanè poterit.

Foliis cordatis. Capsulis lappaceis.

4. *Mitella*; *Americana*; maxima; tinctoria. T. 242. *Orleana*, seu *Orellana*, folliculis lappaceis. *H. L. Urucu. Pison. Edit.* 1658. 133. *Achiotl*, seu *Medicina tingendo apta. Hernand.* 74. *Pregn. H.*

LEONTOPETALON. T. C. 49. 484.

Radix crassa, tuberosa, perennis.

Flos rosaceus, pentapetalus vel hexapetalus, nudus, quinque staminibus ornatus.

Finis pedunculi floris placentulam format, intra florem positam, orbicularem, cui innascitur ovarium, tubâ suâ instructum, quæ fit vesica angulosa, simplex, acuminata, ex centro fundi hujus axis erigitur rectus, cui adnascuntur undique semina globosa.

1. *Leontopetalon. H. Eyf. Æst.* o. 4. F. 2. F. 1. *Dod. p.* 69. C. B. P. 324. J. B. 3. 489. M. H. 2. 285. *Leontopetalon, foliis costæ ramose innascentibus. T. C.* 49. H.

ALSINE. T. 242. 126.

Folia conjugata, integra.

Calix quadrifolius vel quinquefolius apparet, profundissimè dissectus.

Flos rosaceus tetrapetalus, vel pentapetalus, petalis integris vel bifidis, stamina aliquando terna, singula gerentia duos testiculos, aliquando sena, imò 5 dena quandoque.

Fructus membranaceus, unicapsularis, subrotundus, vel conicus, apice dehiscens.

Semina exigua.

1. *Alsine*; altissima; nemorum. C. B. P. 251. M. H. 2. 550. *Alsine*, major, repens, perennis. J. B. 3. 362. *Alsine major. Dod. p.* 29. †.

2. Al-

2. *Alfina*; media. C. B. P. 250. M. H. 2. 550. *Alfina vulgaris*, sive *morsus gallinae*. J. B. 3. 363. *Alfina minor*. Dod. p. 29. †.
3. *Alfina*; minor; capitulis lini. C. B. P. 251. M. H. 2. 550. a. †.
4. *Alfina*; minor; multicaulis. C. B. P. 250. *Alfina minima*. J. B. 3. 364. Dod. p. 30. a. †.
5. *Alfina*; *spargula dicta*; major. C. B. P. 251. M. H. 2. 551. *Spargula*. J. B. 3. 722. Dod. p. 537. a. †.
6. *Alfina*; *spargulae facie* media. C. B. P. 251. *Spargula*, marina, nostras. J. B. 3. 722. *Spargula marina*. Lugd. 1385. a. †.
7. *Alfina*; *spargulae facie*; minor; sive *spargula*; minor; flosculo subcaeruleo. C. B. P. 251. Prodr. 119. *Spargula purpurea*. J. B. 3. 722. *Alfina*, *spargulae facie*, minor, sive perennis. Flor. 1. 59. *Alfina*, *spargula*, major, maritima, perennis, flore violaceo. M. H. 2. 551. a. †.
8. *Alfina*; *spargulae facie*; minima. Commel. Ind. a. †.
9. *Alfina*; *spargulae facie*; minima; seminibus marginatis. T. 244. a.
10. *Alfina*; folio cali; flore magno albo, purpurascens. An *Alfina*, saxatilis, laricis folio, major, & majore flore. T. 243? *Auricula muris*, pulchro flore, folio tenuissimo. J. B. 3. 360. *Alfina*, folio cali, flore subcaeruleo. Ind. 83. a. †.
11. *Alfina*; pusilla; folio capillaceo; flosculo albo. *Arenaria*. J. B. 3. 723. *Alfina*, saxifraga, angustifolia, minima, montana. Col. 1. 292. Descr. 290. Ic. *Alfina*, pusilla, graminea, flore tetrapetalo. T. 243.
12. *Alfina*; hyperici folio. D. Vaillant. T. 242. a. †.
13. *Alfina*; verna; glabra. Bot. Monsp. 14. *Alfina*, tetrapetalos, caryophylloides, holosteum minimum. Raj. Syn. 206. a.
14. *Alfina*; palustris; tenuissimis foliis; sive saxifraga; palustris; alinaefolia. Ger. Raj. H. 1033. T. 243. aq.
15. *Alfina*; pelagica; & littoralis. Clus. H. 251. *Alfina*, littoralis, foliis portulacae. C. B. P. 251. Rubiae affinis, maritima, portulacae foliis. H. L. 530.
16. *Alfina*; palustris; folio serpilli. Bocc. Rar. 48. *Alfina*, palustris, tricoccus, folio portulacae aquaticae. a.
17. *Alfina*; ramosa; foliis acutis; flore majore. A Sherardo missa.
18. *Alfina*; Acadientis; buxi folio; perennis. H.
19. *Alfina*; Hispanica; folio myrti. Salvad.
20. *Alfina*; qui caryophyllus; saxatilis; folio ericae; corymbis umbellatis. C. B. P. 211. *Symphytum petraeum*, sive *gymnosophyton majus* Thelio. 114. *Alfina*, folio ericae, umbellata. Nissole.

LYCHNIS. T. 333. 175.

Folia integra, conjugata.

Calix integer, tumidior, tubulatus, plerumque striatus, stabilis, aliquando ampullosus orâ angustâ.

Dd

Flos

H. LXXXIII. MONINGIOSPERMAE.

Corolla tubulosa, petalis in orbem positis, sepe ornatus duobus, tri-
bus, vel quatuor, staminibus, filamentis quinque, vel sex

filamentis, apice debiscens, tubis

sepalis, angulata, vel reniformia.

Diocoridis; sativa; flore dilute rubente.
Lychnis, coronaria, flore rubro, simplici. H.

Diocoridis; sativa; flore rubro, velut

Lychnis, coronaria, flore rubro, simplici. C. B. P. 204. Lychnis,
coronaria, flore rubro, simplici. H. Eyf. Æst. o. 9. F. 2. Fig. 1. b.

Diocoridis; sativa; flore albo. C. B. P.
Lychnis, coronaria, flore albo. M. H. 2. 540. Lychnis, co-

Diocoridis; sativa; floribus albis, lincis
incarnatis punctatis. C. B. P. 203. Lychnis,
coronaria, flore albo. M. H. 2. 540. Lychnis, coron-
aria, flore albo. H. Eyf. Æst. o. 9. F. 2. Fig. 3. & 4. Fig. 2. b.

Lychnis, coronaria; major. C. B. P. 204. Lychnis, coronaria,
seu pseudo-melanthium. J. B. 3. 341. Pseudo-
melanthium, flore albo. H. Eyf. Æst. o. 1. F. 4. Fig. 2. Nigella-

Lychnis, coronaria; major; flore albo. C. B. P. 204. Pseudo-
melanthium, flore albo. H. Eyf. Æst. o. 1. F. 4. Fig. 3. a.

Lychnis, coronaria; similibus; Africana; glabra; angustifolia;
Lychnis, coronaria; nigellastrum minus glabrum dicta,
Lychnis, coronaria. M. H. 2. 543. a.

Lychnis, coronaria; flore albo est.

Lychnis, coronaria; flore coccineo; major. C. B. P. 203. Lychnis,
coronaria, flore coccineo, seu arantio, simplici. M. H. 538. Flos
Constantinopolitanus, minor. J. B. 3. 344. Flos Constantinopolitanus,

Constantinopolitanus, miniatus. H. Eyf. Æst. o. 9. F. 5. Fig. 2.

11. *Lychnis*; hirsuta; flore candido; major. *C. B. P.* 203. *Flos Constantinopolitanus*, albus. *H. Eyst. Æst.* o. 9. *F.* 5. *Fig.* 3.
12. *Lychnis*; Chalcedonica; flore pleno, miniato, seu arantiaco. *M. H.* 2. 538.
13. *Lychnis*; sylvestris; alba; simplex; elatior. *An Lychnis*, sylvestris, alba, simplex, Lusitanica, odorato, majori, flore. *Flor.* 2. 89? b.
14. *Lychnis*; sylvestris; alba; simplex. *C. B. P.* 204. *Ocymoides*, album, multis. *J. B.* 3. 342. *Lychnis*, sylvestris, hirsuta, perennis, alba, simplex. *M. H.* 2. 541. †. b.
15. *Lychnis*; sylvestris; simplex; flore purpurascens. *Ind.* 84. b.
16. *Lychnis*; sylvestris; alba; elatior; calice ampullato, striato, amplo. *Muscipula*, major, calice turgido, ventricoso. *J. B.* 3. 349. b.
17. *Lychnis*; sylvestris; calice ampullato, striato, amplo, flore, & cauliculis purpurascens. b.
18. *Lychnis*; alba; multiplex. *C. B. P.* 204. *Ocymoides*, album, flore pleno. *J. B.* 3. 343. *Lychnis*, sylvestris, hirsuta, perennis, alba, multiplex. *M. H.* 2. 541. *Lychnis*, sylvestris, flore pleno, albo. *H. Eyst. Æst.* o. 9. *F.* 1. *Fig.* 1.
19. *Lychnis*; sylvestris; five aquatica; alba; simplex. *Lychnis*, sylvestris, alba. *Dod.* p. 171.
20. *Lychnis*; sylvestris; five aquatica; purpurea; simplex. *C. B. P.* 204. *Ocymoides*, purpureum, multis. *J. B.* 3. 343. *Lychnis*, sylvestris, purpurea. *Dod.* p. 171. *Lychnis* sylvestris. *H. Eyst. Æst.* o. 1. *F.* 5. *Fig.* 2. *Lychnis*, sylvestris, minus hirsuta, flore rubello, simplici. *M. H.* 2. 541.
21. *Lychnis*; purpurea; multiplex. *C. B. P.* 204. *Lychnis*, sylvestris, flore multiplici. *Dod.* p. 171. *Lychnis*, sylvestris, flore rubro, pleno. *H. Eyst. Æst.* o. 9. *F.* 1. *Fig.* 2. *Lychnis*, sylvestris, minus hirsuta, flore rubello, eleganter multiplici. *M. H.* 2. 541.
22. *Lychnis*; Cretica; flore parvo; calice striato, purpurascens. *T. Cor.* 24. a.
23. *Lychnis*; supina; Sicula; calice amplissimo, striato. *T.* 337. *Lychnis*, speciosissima, flore aquatè purpureo, granatina, seu saturatè rubrà nubeculà per medium segmentato. *H. Cath.* a.
24. *Lychnis*; Orientalis; calice pyramidato, striato, longissimo. *T. C.* 24. a.
25. *Lychnis*; sylvestris; latifolia; caliculis turgidis, striatis. *C. B. P.* 205. *M. H.* 2. 543. *Lychnis*, sylvestris, II. *Clus. H.* 288. a.
26. *Lychnis*; sylvestris; angustifolia; caliculis turgidis, striatis. *C. B. P.* 205. *Muscipula* majori, calice ventricoso, similis. *J. B.* 3. 350. *Lychnis* angustifolia, caliculis striatis. *Ind.* 86. a.
27. *Lychnis*; sylvestris; quæ Beën album vulgò. *C. B. P.* 205. 1. *Beën album*, officinarum. *J. B.* 3. 356. *Beën album*, sive *polemonium*.

Dd 2
Dod.

Dod. p. 172. Lychnis, sylvestris, flore albo. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 5. Fig. 3. Melandryum Plinii, quorundam. Clus. H. 293. Papaver spumeum. Lob. Observ. 184. Lychnis, sylvestris, perennis, quæ Beën album vulgò. M. H. 2. 535. Flore albo. Malp. An. Pl. 41. 125. 48. 178.

28. *Lychnis; quæ Beën album vulgò; flore pallidé incarnato. H. L.*

29. *Lychnis; sylvestris; quæ Beën album; angustifolia; flore pleno, odorato. Clus. H. 293. Deser.*

30. *Lychnis; sylvestris; quæ Beën album vulgò; Anglicana; procumbens. Flor. 2. 90. Lychnis, maritima, repens. C. B. P. 205. Lychnis, maritima, Anglicana. J. B. 3. 357. Lychnis, perennis, angustifolia, marina, Anglica, procumbens. M. H. 2. 535.*

31. *Lychnis; Suecica; Beën album; folio, habitu, calice, amplissimis; gumsepungar five scrotum arietis dicta. Lychnis, Suecica, gumsepungar, scrotum arietis dicta. Ind. 85. a.*

32. *Lychnis; Orientalis; supina; maritima; capsulis Lychnidis coronariæ. T. Cor. 24. a. b. H.*

33. *Lychnis; frutescens; myrtifolia; Beën albo similis. C. B. P. 205. Beben albo officinarum similis planta, sempervirens. J. B. 3. 357. Ocymastrum fruticosum. Camer. Ic. xxxiii. Saponaria, frutescens, acutis foliis, ex Sicilia. Bocc. Rar. 58. H.*

34. *Lychnis; frutescens; myrtifolia; Beën albo similis; flore albo. H. L. H.*

2. 35. *Lychnis; sylvestris; quæ saponaria vulgò. T. 336. Saponaria, major, levis. C. B. P. 206. Saponaria vulgaris. J. B. 3. 346. Saponaria. Dod. p. 179. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 12. Fig. 1. Lychnis, saponaria dicta, major, vulgaris, simplex. M. H. 2. 547. †.*

36. *Lychnis; seu saponaria; flore pleno. T. 336. Lychnis, saponaria dicta, major, vulgaris, flore pleno. M. H. 2. 547. Saponaria, flore pleno. Corn. 209. †.*

37. *Lychnis; saponaria; concava, Anglica. Saponaria, concava, Anglica. C. B. P. 206. Prodr. 103. M. H. 2. 548. Gentiana, folio convoluto. J. B. 3. 521. †.*

38. *Lychnis; Orientalis; saponariæ folio & facie; flore parvo & multiplici. T. Cor. 24. H. b.*

7 39. *Lychnis; segetum; rubra; foliis perfoliata. C. B. P. 204. Vaccaria. Dod. p. 104. J. B. 3. 357. Lychnis segetum, vaccaria dicta. M. H. 2. 542. a.*

40. *Lychnis; sylvestris; viscosa; angustifolia; rubra. C. B. P. 205. Lychnis, sylvestris, III, Clus. H. 289. Odontidi, five flori cuculi, affinis, Lychnis sylvestris, I. Clus. Pann. 4. Hist. J. B. 3. 348. Lychnis, viscosa, sylvestris, flore incarnato. H. Eyst. Vern. o. Arb. & Frut. F. 5. Fig. 2. Lychnis, sylvestris, angustifolia, viscosa, præcox, foliis caryophylli. M. H. 2. 536.*

41. *Lychnis*; sylvestris; viscosa; angustifolia; rubra; altera; flore pleno.

42. *Lychnis*; sylvestris; viscosa; angustifolia; alba. *H. Edinb.*

43. *Lychnis*; sylvestris; vel marina; flore rubro, [pulcherrimo. *Ind.* 85. *Virid. Lusit. a.*

44. *Lychnis*; Orientalis; annua; supina; antirrhini folio; flore minimo, purpurascens. *T. Cor.* 24. *a.*

45. *Lychnis*; noctiflora; angustifolia; odorata. *T.* 335. *Lychnis*, sylvestris, viscosa, peregrina, flore noctu, quam die, magis odoro. *Zanon.* 126. *b. H.*

46. *Lychnis*; pratensis; flore laciniato, simplici. *M. H.* 2. 537. *Flos cuculi*, odontitis quibusdam. *J. B.* 3. 347. *Caryophyllus*, pratensis, flore laciniato, simplici, sive flos cuculi. *C. B. P.* 210. *Armerius* sylvestris. *Dod. p.* 177. *Odontitis* Plinii, simplici flore. *Clus. H.* 292.

47. *Lychnis*; pratensis; flore laciniato, pleno. *M. H.* 2. 537. *Lychnis*, pratensis, flore laciniato, pleno, ampliore, purpureo. *T.* 336. *Flos cuculi*, flore multiplicato, purpureo. *J. B.* 3. 348. *Odontitis* Plinii, pleno flore. *Clus. H.* 293. *Odontitis* Plinii. *H. Eyf. Æst.* o. 9. *F.* 7. *Fig.* 2.

48. *Lychnis*; pratensis; flore laciniato, albo, simplici. *T.* 336. *Caryophyllus*, pratensis, flore laciniato, simplici, albo. *C. B. P.* 210.

49. *Lychnis*; pratensis; flore laciniato, pleno, ampliore, albo. *T.* 336. *Flos cuculi*, flore multiplicato, altero, albo. *J. B.* 3. 348.

50. *Lychnis*; viscosa; purpurea; latifolia; lævis. *C. B. P.* 205. *Centaurium minus*, adulterinum quibusdam, *Lychnidis viscidæ* genus. *J. B.* 3. 355. *Lychnis*, sylvestris, *I. Clus. H.* 288. *Muscipula*, flore rubro. *H. Eyf. Æst.* o. 1. *F.* 7. *Fig.* 3. *a.*

51. *Lychnis*; viscosa; alba; latifolia; lævis. *C. B. P.* 205. *Muscipula*, flore albo. *H. Eyf. Æst.* o. 1. *F.* 7. *Fig.* 2. *a.*

52. *Lychnis*; viscosa; foliis inferioribus bellidis; flore minimo, rubro, aut carneo. *H. R. Monsp.*

53. *Lychnis*; montana; viscosa; alba; latifolia. *C. B. P.* 206. *Polemonium petraeum*, Gesneri. *J. B.* 3. 351. *Lychnis* sylvestris, seu montana, latifolia, viscosa, florum petalis supra albis, subtus virentibus, interdum se contrahentibus. *M. H.* 2. 535. *b.*

54. *Lychnis*; ramosa; florum petalis albis, reflexis; caliculo purpurascens, splendido.

55. *Lychnis*; major; noctiflora; Dubrensis; perennis. *Raj. H.* 995. *Syn.* 281. *Lychnis*, folio bellidis crassiori, subbirsuto. *Ind.* 85.

56. *Lychnis*; noctiflora. *C. B. P.* 205. *Ocymoides non speciosum*. *J. B.* 3. 344. *Ocymoides noctiflorum*. *Cam. Hort.* xxxiiii. *Ocymastrum*, noctiflorum, flore albo. *H. Eyf. Æst.* o. 7. *F.* 12. *Fig.* 3. *a.*

57. *Lychnis*; Orientalis; longifolia; nervosa; flore purpurascens. *T. Cor.* 24. *a.*

58. *Lychnis*; sylvestris; minima; flore muscoso. *Bot. Monsp.* 171. *a.*

59. *Lychnis*; facie auriculæ urfi. *C. B. P.* 206. *Prodr.* 103. *Vista-
go*, auriculæ facie, *Cretica*. *J. B.* 3. 351. *Lychnis sylvestris*, latifolia.
Clus. H. 294. b.

60. *Lychnis*; sylvestris; minima; exiguo flore. *C. B. P.* 206. *Prodr.*
103. †. b.

61. *Lychnis*; segetum meridionalium; annua; hirsuta; floribus al-
bis, uno versu dispositis. *M. H.* 2. 544. a.

62. *Lychnis*; hirta; minor; flore variegato. *T.* 338. *Lychnis*, bir-
futa, flore eleganter variegato. *Raj. H.* 997. a.

63. *Lychnis*; hirta; minor; flore albo. a.

64. *Lychnis*; hirta; minor; flore carneo. a.

65. *Lychnis*; segetum meridionalium; annua; hirsuta; floribus
rubris, uno versu dispositis. *An Lychnis*, flore flammeo, parvo. *H.*
C.? a.

66. *Lychnis*; sylvestris; alba; spicâ reflexâ. *Bot. Monsp.* 171.

67. *Lychnis*; Orientalis; bupleuri folio. *T. Cor.* 24. *T. Voy.* 2.
380. *H.*

68. *Lychnis*; Orientalis; maxima; folio buglossi, undulato. *T.*
Cor. 24. *T. Voy.* 2. 361. *H.*

69. *Lychnis*; Orientalis; perennis; foliis angustissimis; floribus
albis, conglobatis, petalis angustissimis. *A Sberardo missa.* b.

70. *Lychnis*; minima; rigida; Cherleri. *J. B.* 3. 352. *M. H.* 2.
544.

71. *Lychnis*; Hispanica; valerianæ rubræ folio; purpurascente
flore. *T.* 338. *H.*

72. *Lychnis*; Alpina; linifolia; multiflora; peramplâ radice. *T.*
338. *Lychnis*, Alpina, glabra, caryophylli holostei folio. *M. H. R.*
Blusf. H.

Gr. Leu.

73. *Lychnis*; arvensis; glabra; flore majore. *M. H.* 2. 546. *Ca-
ryophyllus*, arvensis, glaber, flore majore. *C. B. P.* 210. *Gramen Fuch-
sii*, sive leucanthemum. *J. B.* 3. 361. *Alfene*, pratensis, gramineo folio,
ampliore. *T.* 243. †.

74. *Lychnis*; arvensis; glabra; flore minore. *M. H.* 2. 546. *Ca-
ryophyllus*, arvensis, glaber, flore minore. *C. B. P.* 210. *Gramini Fuchsi*
leucanthemo affinis & similis herba. *J. B.* 3. 361. †.

75. *Lychnis*; Hispanica; folio kali; multiflora. *T.* 338. *Kali*, ver-
miculatum, albo, globoso, flore. *Barrell. Ic.* 119. *Observ.* 663. *H.*

76. *Lychnis*; maritima; saxatilis; folio anacampterotis. *T. Cor.* 24.
Beben album, sive polemonium, saxatile, fabariæ folio, *Siculum.* *Bocc.*
Mus. Part. 2. pag. 133. *Beben*, album, foliis fabariæ. *Ejusdem. Tab.*
92. *H.*

77. *Lychnis*; viscosa; floribus parvis, purpurascens albis. *C.*
B. P. 205. *Lychnis*, Italica, floribus orbiculatis, albis extus incarnatis.
Par. Bat. Lychnis, sylvestris, 11, e semine nata. *Clus. H.* 294.

78. *Lych-*

78. *Lychnis*; quæ *ocymoides*; minus; sive album. *Lugd. T.*
 79. *Lychnis*; qui *caryophyllus*; *Alpinus*; calice oblongo, hirsuto. *C. B. P.* 209. *Vaillant. Caryophyllus, sylvestris, VII, Clus. H.* 285. *H.*
 80. *Lychnis*; *umbellifera*; *montana*; *Helvetica*. *Zanon.* 128. *Lychnis coronaria, sylvestris. C. B. P.* 204. *M. H.* 2. 540. *H.*
 81. *Lychnis*; *ocymastri* facie; flore viridi. *Par. Bat. Lychnis, flore pallide viridi. Ind.* 85.

ALSINASTRUM. *T.* 244.

Calix monophyllus, in quinque profunda segmenta, acuta, divisus ita, ut pentaphyllus appareat.

Flos rosaceus, pentapetalus, Alsines, petalis profunde bifidis, staminibus decem instructus.

Ovarium in centro calicis est ovatum, tribus instructum tubis.

1. *Alsinastrum*; *gratiolæ* folio. *T.* 244. *Lychnis, folio centaurii minoris, glabro. Ind.* 86.

MYOSOTIS. *T.* 244. 126.

Omnia ut in Alsine.

Flos major.

Fructus cornu bubulo similis, apice dehiscens.

1. *Myosotis*; *Hispanica*; *segetum. T.* 245. *Alfine corniculata. Clus. H.* clxxxiiii. *Lychnis, segetum, minor. C. B. P.* 204. *Lychnis, segetum, minima. M. H.* 2. 544. *a. †.*
 2. *Myosotis*; *hirsuta*; *altera*; *viscosa. T.* 245. *Alfine, altera, viscosa, hirsuta. C. B. P.* 251. *Alfine, spuria, IV. Dod. p.* 31. *Alfine altera, hirsuta, viscosa, foliis longis saturatius virentibus. M. H.* 2. 551. *a. †.*
 3. *Myosotis*; *incana*; *repens. T.* 244. *Lychnis, incana, repens. C. B. P.* 206. *M. H.* 2. 537. *Ocymoides, lychnitis, radice reptante. J. B.* 3. 353. *Ocymoides, lychnitis. Col. Phytob. App.* 20. *Lychnis, incana, & tomentosa, cauliculis procumbentibus, foliis latioribus, & brevioribus. H. L.* 394.
 4. *Myosotis*; *tenuissimo folio, rigido. T.* 245.
 5. *Myosotis*; *Alpina*; *latifolia. T.* 244. *Caryophyllus holostius, Alpinus, latifolius. C. B. P.* 210. *Prodr.* 104.
 6. *Myosotis*; *Orientalis*; *perfoliata*; *folio lychnidis. T. C.* 18. *a.*

ROS SOLIS. T. 245. 127.

*Folia setis pubescentia guttulas stillantibus.**Finis pedunculi fit calix oblongus, tubulatus, quinquesidus, segmentis acutis, intra quem flos rosaceus, pentapetalus, staminibus quinque donatus.**Ovarium ex centro calicis, intra florem, est conicum acuminatum, per maturitatem dehiscens, fœtum seminibus multis.*

1. Ros solis; folio subrotundo. C. B. P. 357. M. H. 3. 620. Rorida, sive Ros solis, major. Lob. Ic. 811. Ros solis, foliis circinate rotundatis. J. B. 3. 761. Rorella, seu Ros solis. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 8. F. 3. a. †.

2. Ros solis; folio oblongo. C. B. P. 357. M. H. 3. 620. J. B. 3. 761. Ros solis. Dod. p. 474. Rorida, sive Ros solis, & Droßion Recentiorum. Lob. Ic. 811. a. †.

CARYOPHYLLUS. T. 329. 174.

*Folia oblonga, integra, conjugata, caulibus absque pedunculis adhærentia.**Calix bifolius, parvus, includens alterum, parvum, bifolium, deinde oritur supra hos tertius cylindricus, membranaceus, supra quinquesidus. Malp. An. Pl. 41. 124. A. A. B. C. C.**Flos pentapetalos, petalis ex longo, tenui, initio in latum excrescentibus, & ex imo calicis longi profundo emergentibus, in orbem positus, stamina decem habens.**Ovarium innascitur placenta in fundo calicis sita, est instructum binis tubis longis, erectis, fitque fructus cylindricus, calice involutus, apice dehiscens, fœtus seminibus foliaceis.*

1. Caryophyllus; hortensis; simplex; flore majore. C. B. P. 208. M. H. 2. 561. Caryophylli flos simplex. Dod. p. 174. Caryophyllus, simplici flore. Swert. T. 18. N°. 7. Caryophyllus, sylvestris, major, vulgarior. Lob. Ic. 440. Caryophyllus, simplex, hortensis. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 11. Fig. 2. Betonica, coronaria, sive Caryophyllus, flore simplici, sativus. J. B. 3. 325. Flore miniato.

2. Caryophyllus; hortensis; simplex; flore majore, pallidè purpureascente, vel incarnato. C. B. P. 208.

3. C

See p. 217 in Vol. 2 misplac'd.

3. Caryophyllus; hortensis; simplex; versicolor. *C. B. P.* 208. *H. Eyst. Æst. o. 14. F. 11. Fig. 2.*
4. Caryophyllus; hortensis; simplex; variegatus, petalis albescen-
tibus stigmatibus rubris adspersis. *C. B. P.* 208. *Caryophyllus, major,*
sylvestris, variegatus. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 12. Fig. 1.
5. Caryophylli hortensis, simplicis, flore majore, amena ex di-
versitate colorum varietas.
6. Caryophyllus; maximus; ruber. *C. B. P.* 207. *M. H.* 2. 561.
Caryophyllus, maximus, plenus, flore rubro. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 6.
Fig. 1. Tunica officinarum.
7. Caryophyllus; maximus; alter; lato porri folio. *H. R. Par.*
8. Caryophyllus; maximus; variegatus. *C. B. P.* 207. *M. H.* 2. 561.
Caryophyllus, major, rubens & albicans, flore pleno, punctulis rubentibus
fortuitis adperso. Lob. Ic. 441. Caryophyllus, multiplex, maximus, varie-
gatus. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 9. Fig. 1. Betonica, coronaria, flore pleno,
maximo, punctis rubris variegato. J. B. 3. 327.
9. Caryophyllus; maximus & plenissimus; colore misto, carneo;
corniculis quibusdam carneis. *Bry. C. B. P.* 207. *M. H.* 2. 561.
10. Caryophyllus; maximus & plenissimus; colore vario in diversis
foliis scarlatino, dilutius rubente, albo. *Bry. C. B. P.* 207. *M. H.*
2. 561.
11. Caryophyllus; maximus & plenissimus; colore rubro, satura-
tione, staminulis tribus niveis in medio. *Bry. C. B. P.* 207. *M. H.* 2.
561.
12. Caryophylli maximi, hortensis, pleni, amplissima diversitas.
13. Caryophyllus; altilis; major. *C. B. P.* 207. *M. H.* 2. 561. *Ca-*
rtyophyllus multiplex. Lob. Ic. 441. Caryophylli flos, multiplex. Dod. p.
174. Caryophyllus, flore majore. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 4. Fig. 1. Flo-
re rubro.
14. Caryophyllus; plenus; miniato colore. *H. Eyst. Æst. o. 14. F.*
11. Fig. 1.
15. Caryophyllus; flore majore; dimidiatâ parte carneus; dimidia-
tâ verò alterâ rubris & albis striis & punctis variegatus; plenus. *H.*
Eyst. Æst. o. 14. F. 4. Fig. 1.
16. Caryophyllus; multiplex; foliis florum ex rubro & albo dimi-
diatim divisus & punctatis. *H. Eyst. Æst. o. 14. F. 5. Fig. 1.*
17. Caryophyllus; plenus; purpurascens; punctatis & laciniatis fo-
liis. *H. Eyst. Æst. o. 14. F. 8. Fig. 1.*
18. Caryophyllus; plenus; miniato colore. *H. Eyst. Æst. o. 14. F.*
11. Fig. 1.
19. Caryophyllus; purpureus; flore multiplici, laciniato. *H. Eyst.*
Æst. o. 14. F. 11. Fig. 3.
20. Caryophyllus; multiplex; flore albo. *H. Eyst. Æst. o. 14. F.*
o. 1.

age belongs to Vol. 1.

21. Caryophyllus; multiplex; laciniatus; flore pleno. *H. Eyst. Ib. Fig. 2.*
22. Caryophyllus; multiplex; flore è purpureo rubescente. *H. Eyst. Ib. Fig. 3.*
23. Caryophyllus; plenus; lætè rubescens, instar florum mali perfici. *H. Eyst. Æst. o. 14. F. 7. Fig. 7.*
24. Caryophyllus; multiplex; flore carneo. *H. Eyst. Æst. o. 14. F. 5. Fig. 2.*
25. Caryophyllus; purpureus; flore multiplici, profundè laciniato. *H. Eyst. Ibid. Fig. 3.*
26. Caryophyllus; flore minore, pleno, rubescens, punctatus. *H. Eyst. Æst. o. 14. F. 4. Fig. 2.*
27. Caryophyllus; miniatus, medio albescens. *H. Eyst. Ib. Fig. 3.*
28. Caryophyllus; tenuifolius; plumarius; flore pleno, purpurascens. *Flor. 2. 92. Caryophyllus, flore tenuissimè dissecto. C. B. P. 209. Caryophyllus, plumarius, flore inodoro, tenuissimè secto. M. H. 2. 562. Superba Recentiorum. Lob. Adv. 189. Observ. 241. Caryophylleus minor. Dod. p. 174. Caryophyllus sylvestris. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 12. 13. 14. Betonica, coronaria, tenuissimè dissecta, sive Caryophyllea, superba, elatior, vulgaris. J. B. 3. 330. Armerius, simplici flore. Clus. H. 287.*
29. Caryophyllus; tenuifolius; plumarius; flore pleno, albo. *Flor. 2. 92.*
30. Caryophyllus; tenuifolius; plumarius; flore pleno, albo, cum corollâ purpureâ. *Flor. 2. 92.*
31. Caryophyllus; tenuifolius; plumarius; flore simplici, albo, cum duobus corniculis. *Flor. 2. 92.*
32. Caryophyllus; tenuifolius; plumarius; flore simplici, pallidè incarnato, cum duobus corniculis. *Flor. 2. 92.*
33. Caryophyllus; tenuifolius; plumarius; flore simplici, albo, cum corollâ sanguineâ. *Flor. 2. 92.*
34. Caryophyllus; tenuifolius; plumarius; flore simplici, carneo, cum corollâ pallidè purpurascens. *Flor. 2. 93.*
35. Caryophyllus; tenuifolius; plumarius; serotinus; flore simplici, odoratissimo. *Flor. 2. 93.*
36. Caryophylli tenuifolii, plumarii, multiplex ex varietate suavi pulchritudo.
37. Caryophyllus; barbatus; hortensis; latifolius. *C. B. P. 208. Caryophyllus, barbatus, hortensis, simplex, latifolius. M. H. 2. 563. Armeria, multis in latum orbiculum congestis floribus. Lob. Ic. Adv. 188. Obs. 241. Flos armerius, ruber. H. Eyst. o. 9. F. 4. Fig. 2. Betonica, coronaria, latifolia, angustiore caliculo, foliis fastigiatis cincto, flore suaverubro. J. B. 3. 333.*
38. Caryophyllus; barbatus; hortensis; latifolius; flore albo. *C. B. P. 208. Flos armerius, albus. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 4. Fig. 1.*
39. Ca-

39. Caryophyllus; barbatus; hortensis; latifolius; flore variegato. *Flos armerius, variegatus. H. Eyst. Æst. o. 9. F. 4. Fig. 3. Caryophyllus, barbatus, hortensis, simplex, latifolius, flore versicolore, rubro & carneo guttato in eodem ramulo, seu diversicolore ex albo, rubro, & medio. H. L.*
40. Caryophyllus; barbatus; hortensis; simplex; latifolius; flore carneo. *H. L.*
41. Caryophyllus; barbatus; flore multiplici. *C. B. P. 208. M. H. 2. 563. Betonica, coronaria, latifolia, petraea, pleno flore rubro, vel ad purpureum accedente. J. B. 3. 333. Armerius, pleno, rubro, flore. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 14. Fig. 1. Armerius, pleno flore. Clus. H. 287.*
42. Caryophyllus; barbatus; flore multiplici, albo. *C. B. P. 208.*
43. Caryophyllus; barbatus; flore multiplici, roseo. *C. B. P. 208.*
44. Caryophyllus; barbatus; hortensis; angustifolius. *C. B. P. 209. M. H. 2. 563. Betonica, coronaria, minus latifolia, flore profundè dissecto. J. B. 3. 333. Armerius flos, alter. Dod. p. 176. Colore rubro.*
45. Caryophyllus; barbatus; hortensis; angustifolius; colore niveo. *C. B. P. 209.*
46. Caryophyllus; barbatus; hortensis; angustifolius; colore purpurascens, oris albis. *C. B. P. 209.*
47. Caryophyllus; barbatus; hortensis; angustifolius; flore versicolore in eodem ramulo. *C. B. P. 209.*
48. Caryophyllus; barbatus; sylvestris; annuus; angustifolius; perpaucis capitulis donatus. *M. H. 2. 563. Caryophyllus, barbatus, sylvestris. C. B. P. 209. Viola, barbata, angustifolia. J. B. 3. 335. a.*
49. Caryophyllus; barbatus; sylvestris; latifolius; annuus; multis capsulis, simul junctis, donatus. *M. H. 2. 563. Caryophyllus, sylvestris, prolifer. C. B. P. 209. H. Eyst. Æst. o. 14. F. 13. Fig. 2. Betonica, coronaria, squamosa, sylvestris. J. B. 3. 335. a.*
50. Caryophyllus; Sinensis; supinus; leucoii folio; flore vario. *T. Ac. Reg. 1705. H.*
51. Caryophyllus; Sinensis; supinus; leucoii folio; flore rubro. *H.*
52. Caryophyllus; Sinensis; supinus; leucoii folio; flore albo. *H.*
53. Caryophyllus; Sinensis; supinus; leucoii folio; flore pleno. *H.*
54. Caryophyllus; repens; angustifolius; flore eleganti rubro.
55. Caryophyllus; minimus; muralis. *C. B. P. 211. Betonica coronaria, sive tunica minima. J. B. 3. 337. Tunica minima. Lugd. 1191. Lychnis, minima, muralis. M. H. 2. 547. Flore rubro. a. b.*
56. Caryophyllus; minimus; muralis; flore albo. *a. b.*
57. Caryophyllus; montanus; saxatilis; flore dilutè rubente; foliis angustissimis. *Micheli.*

PORTULACA. T. 236. 118.

Folia succulenta, crassiuscula.

Calix monophyllus, bifidus, ovario artē adhaerens.

Flos rosaceus, pentapetalus.

Ovarium ex calicis fundo, fit vas ovatum, constans duabus testis, quarum prior alteram includit, exterioris dimidiata pars matura horizontaliter diffiliens, relinquit interiorem, pariter dein horizontaliter diffilientem, sætamque plurimis, exiguis, seminibus.

1. Portulaca; latifolia; sativa. C. B. P. 288. M. H. 2. 570. Portulaca, hortensis, latifolia. J. B. 3. 678. Portulaca sativa. Dod. p. 661. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 3. F. 1. a. †.

2. Portulaca; sativa; latifolia, foliis flavis. M. H. 2. 570. Portulaca, sativa, latifolia, flavesces, sive foliis aureis. H. R. Par. a. †.

3. Portulaca; angustifolia; sive sylvestris. C. B. P. 288. M. H. 2. 571. Portulaca, sylvestris, minor, sive spontanea. J. B. 3. 678. Portulaca sylvestris. Dod. p. 661. a. †.

4. Portulaca; Curassavica; lanuginosa; procumbens. Par. Bat. 215. H. A. 1. 9. b. H.

5. Portulaca; Africana; sempervirens; flore rubicundo. H. A. 1. 177. H. R. D.

6. Portulaca; Curassavica; folio capparidis. Par. Bat. 213. H. R. D.



PLANTÆ DIANGIÆ POLYSPERMÆ.

In his ovarium fructum parit, qui constat binis vasculis, quæ vel ope septi mediæ, vel totâ fabricâ, distincta sunt, atque singula continent semina plurima placentæ affixa. Capsulæ quandoque in dextris & sinistris, aliâs in anteriori & posteriori, vel & in superiori & inferiori, parte existunt. Continet verò classis hæc varia admodum genera Plantarum, valde quidem dissimilia inter se, sed unâ tamen vasculi fabricâ congruentia.

1. Flore rosaceo, polypetalo.

SALICARIA. T. 253. 129.

Calix tubulosus, striatus, multifidus.

Flos rosaceus, hexapetalus, nascens ex incisuris superioribus interioris parietis calicis tubulati, serie ferè verticillatâ, staminibus multis, usque ad octodecim, præditus.

Ovarium tubâ longâ apice pelvisiformi ornatum maturum

Fit testa ovata, bicapsularis, calice obvoluta, fœta seminibus exiguis.

Erectæ.

1. Salicaria; vulgaris; purpurea; foliis oblongis. T. 253. *Lyfimachia*, spicata, purpurea, fortè Plinii. C. B. P. 246. *Lyfimachia*, purpurea, quibusdam spicata. J. B. 2. 902. *Pseudo-lysimachium*, purpureum, alterum. Dod. p. 86. *Lyfimachia altera*. H. Eyst. Æst. o. 10. F. 7. Fig. 2. *Blattaria*, rubra, spicata, major, glabra, communis, folio acuto. M. H. 2. 490. †.

2. Salicaria; purpurea; foliis subrotundis. T. 253. *Lyfimachia*, spicata, lanuginosa, folio subrotundo, flore purpureo. H. R. Par. *Lyfimachia*, spicata, purpurea, folio subrotundo, ocymi facie. H. L. Munt. H. 744. *Blattaria*, rubra, spicata, major, lanuginosa, folio subrotundo. M. H. 2. 490.

Ee 3.

Pro-

PORTULACA. T. 236. 118.

Folia succulenta, crassiuscula.

Calix monophyllus, bifidus, ovario arctè adhærens.

Flos rosaceus, pentapetalus.

Ovarium ex calicis fundo, fit vas ovatum, constans duabus testis, quarum prior alteram includit, exterioris dimidiata pars matura horizontaliter dissiliens, relinquit interiorem, pariter dein horizontaliter dissilientem, sætamque plurimis, exiguis, seminibus.

1. Portulaca; latifolia; sativa. C. B. P. 288. M. H. 2. 570. Portulaca, hortensis, latifolia. J. B. 3. 678. Portulaca sativa. Dod. p. 661. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 3. F. 1. a. †.

2. Portulaca; sativa; latifolia, foliis flavis. M. H. 2. 570. Portulaca, sativa, latifolia, flavesces, sive foliis aureis. H. R. Par. a. †.

3. Portulaca; angustifolia; sive sylvestris. C. B. P. 288. M. H. 2. 571. Portulaca, sylvestris, minor, sive spontanea. J. B. 3. 678. Portulaca sylvestris. Dod. p. 661. a. †.

4. Portulaca; Curassavica; lanuginosa; procumbens. Par. Bat. 215. H. A. 1. 9. b. H.

5. Portulaca; Africana; sempervirens; flore rubicundo. H. A. 1. 177. H. R. D.

6. Portulaca; Curassavica; folio capparidis. Par. Bat. 213. H. R. D.



PLANTÆ DIANGIÆ POLYSPERMÆ.

In his ovarium fructum parit, qui constat binis vasculis, quæ vel ope septi mediæ, vel totâ fabricâ, distincta sunt, atque singula continent semina plurima placentæ affixa. Capsulæ quandoque in dextris & sinistris, aliâs in anteriori & posteriori, vel & in superiori & inferiori, parte existunt. Continet verò classis hæc varia admodum genera Plantarum, valde quidem dissimilia inter se, sed unâ tamen vasculi fabricâ congruentia.

1. Flore rosaceo, polypetalo.

SALICARIA. T. 253. 129.

Calix tubulosus, striatus, multifidus.

Flos rosaceus, hexapetalus, nascens ex incisuris superioribus interioris parietis calicis tubulati, serie ferè verticillatâ, staminibus multis, usque ad octodecim, præditus.

Ovarium tubâ longâ apice pelvisiformi ornatum maturum

Fit testa ovata, bicapsularis, calice obvoluta, fæta seminibus exiguis.

Erectæ.

1. Salicaria; vulgaris; purpurea; foliis oblongis. T. 253. *Lyfimachia*, spicata, purpurea, fortè Plinii. C. B. P. 246. *Lyfimachia*, purpurea, quibusdam spicata. J. B. 2. 902. *Pseudo-lyfimachium*, purpureum, alterum. Dod. p. 86. *Lyfimachia altera*. H. Eyst. Æst. o. 10. F. 7. Fig. 2. *Blattaria*, rubra, spicata, major, glabra, communis, folio acuto. M. H. 2. 490. †.

2. Salicaria; purpurea; foliis subrotundis. T. 253. *Lyfimachia*, spicata, lanuginosa, folio subrotundo, flore purpureo. H. R. Par. *Lyfimachia*, spicata, purpurea, folio subrotundo, ocymi facie. H. L. Munt. H. 744. *Blattaria*, rubra, spicata, major, lanuginosa, folio subrotundo. M. H. 2. 490.

Ee 3

Pro-

Procumbentes.

3. Salicaria; hyssopi folio, latiore. T. 253. *Lysimachiae spicatae*, purpureae affinis, *hyssopifolia*. H. L. 397. *Hyssopifolia*, major, latioribus foliis. C. B. P. 218. *Hyssopifolia aquatica*. J. B. 3. 792. *Hyssopifolia*, siue *gratiola minor*. C. B. Prodr. 108. M. H. 3. 613. a.
4. Salicaria; hyssopi folio, angustiore. T. 253. *Hyssopifolia*, minor, angustioribus foliis. C. B. P. 218. M. H. 3. 613. a.

SAXIFRAGA. T. 252. 129. GEUM. T. 251. 129.

Pedunculi finis sit calix, tubulosus, in Saxifragâ profundè, in Geo minus profundè incisus, quinquesfidus.

Flos rosaceus, pentapetalos, ex ambitu ovarii, staminibus octo vel decem præditus.

Fructus subrotundus, bicornis, bicapsularis, fœtus seminibus exiguis; qui in Saxifragâ unâ cum calice concrefcit, in Geo autem calici innititur.

Foliis subrotundis, crenatis, teneris.

1. Saxifraga; rotundifolia; alba. C. B. P. 339. T. 252. *Saxifraga*, alba, radice granulosa. J. B. 3. 706. *Saxifraga alba*. Dod. p. 316. *Saxifraga*, alba, tuberosâ radice. Clus. H. 308. *Sedum bicornis*, album, rotundifolium, erectum, radice granulosa. M. H. 3. 473.
2. Saxifraga; rotundifolia; alba; flore pleno. Ex Horto Domini du Bois.
3. Geum; rotundifolium; majus. T. 251. *Sanicula*, montana, II. C. B. P. 307. H. Eyst. Vern. o. 9. F. 3. Fig. 3. *Sanicula*, montana, rotundifolia, major. C. B. P. 243. *Sanicula*, Alpina, guttata. J. B. 3. 707. *Sedum bicornis*, montanum, serratum,hederaceo folio, majus, guttato flore. M. H. 3. 476.
4. Geum; folio circinato; pistillo floris pallido. T. 251. *Sanicula*, montana, crenata, umbilico pallido. H. R. Par. *Sanicula*, Alpina, cotyledonis folio rotundo, umbilico pallido. Flor. 2. 97.
5. Geum; folio subrotundo, minori; pistillo floris rubro. T. 251.
6. Geum; folio oblongo, crenato; fructu & cauliculis ruberrimis; flore pallidulo rubris guttulis adperso.

Foliis oblongis, aizoïdeis, serratis.

7. Saxifraga; sedi folio; flore albo; multiflora. T. 252. *Sedum*, serratum, flore albo, multiflorum. Ac. Reg. 113. *Sedum*, Pyrenaicum, pyramidale, longifolium, elegantissimum. Sch. Bot. Par. *Sanicula*, Pyrenaica, longifolia, multiflora, elegantissima. H. L.
8. Saxifraga; sedi folio, angustiore, serrato. T. 252. *Cotyledon*, media,

PLANTAE DIANGIAE POLYSPERMAE. 223

dia, foliis oblongis, serratis. C. B. P. 285. *Sedum serratum*. J. B. 3. 689. *Aizoum serratum*. Cord. H. 92. *Umbilicus Veneris*, minor, I & 2. Tab. Ic. 847. *Cotyledon minus*. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 10. Fig. 1. *Sedum serratum*, album, bicornis, longiore folio, marginibus argenteis. M. H. 3. 478.

9. *Saxifraga*; foliis subrotundis, serratis. T. 252. *Cotyledon*, minor, foliis subrotundis, serratis. C. B. P. 285. Prodr. 132. J. B. 3. 690.

Foliis parvis, succulentis, crassis, trifidis.

10. *Saxifraga*; muscosa; trifido folio. T. 252. *Sedum*, *Alpinum*, trifido folio. C. B. P. 284. M. H. 3. 479. *Sedis affinis*, trifidula, *Alpina*, flore albo. J. B. 3. 696. *Sedum*, minus, XIII. Clus. H. LXII.

11. *Saxifraga*; alba; petræa; Ponæ. in Fol. cccxxxvii. T. 252. *Tridactylites Alpina*. J. B. 3. 762. *Sedum*, *tridactylites*, majus, album. C. B. P. 284. M. H. 3. 479.

12. *Saxifraga*; *tridactylites*; *Alpina*; pallidè lutea. T. 252. *Sedum*, *tridactylites*, *Alpinum*, pallidè luteum. C. B. P. 284.

13. *Saxifraga*; verna; annua; humilior. T. 252. *Sedum*, *tridactylites*, *testorum*. C. B. P. 285. M. H. 3. 479. *Tridactylites testorum*, flore albo. J. B. 3. 762. *Paronychia altera*. Dod. p. 112. †. a. 235.

z. Flore monopetalo, uniformi.

CENTAURIUM MINUS. T. 122. 48.

Folia conjugata.

Calix longus, tubulosus, pentagonus, quinquefidus, segmentis acutis.

Flos monopetalus, pentapetaloides, infundibuliformis, parte posticâ pertusus, staminibus quinque præditus, serie ferè umbelliferâ.

Fructus ferè ovatus, cylindræus, vel conicus, emittens tubam longam, per maturitatem dehiscens in binas partes, divisus in duo loculamenta distincta, sæta seminibus multis, exiguis.

1. *Centaurium*; minus. C. B. P. 278. Dod. p. 336. *Centaurium*, minus, flore purpureo. J. B. 3. 353. *Centaurium*, minus, rubrum. M. H. 2. 566. *Centaurium*, minus, flore rubro. H. Eyst. Vern. o. 5. F. 8. Fig. 2. *Centaurium*, minus, fel terræ. Id. Ib. a. †.

2. *Centaurium*; minus; flore albo. H. Eyst. Vern. o. 5. F. 8. Fig. 3. C. B. P. 278. J. B. 3. 353. H. R. Par. *Centaurium*, minus, album. Tabern. Ic. 780. M. H. 2. 566. a. †.

3. *Centaurium*; minus; *caryophylloides*; *Africanum*; sempervirens.

rens. *Par. Pat. Prodr.* 321. *Centaurium*, minus, *Africanum*, *caryophylli folio*, flore suaverubente. *T.* 123. *Centaurium*, lili foliis & facie, flore amplo, suaverubente, *Capitis Bonæ Spei*. *Breyn. Prodr.* 2. 27. *Rapuntio affinis*, lini facie, *Capitis Bonæ Spei*. *Breyn. Cent.* 1. 175. *H. R. D.*

4. *Centaurium*; luteum; perfoliatum. *C. B. P.* 278. *J. B.* 3. 355. *M. H.* 3. 565. *Centaurium luteum*. *Cam. Ep.* 427. *Hort.* 37. *Clus. H. CLXXX.* *Centaurium*, flore luteo. *H. Eyst. Vern.* o. F. 5. F. 7. Fig. 3. a.

VERONICA. *T.* 143. 60.

Folia plerumque conjugata.

Calix monophyllus, quadrifidus, stellatus, in quibusdam quadrangulus, angulosus.

Flos monopetalus, rotatus, quadrifidus plerumque, parum tubulatus, caducus, in centro plumulis fistulosis eleganter ornatus, ex pariete interno tubuli floris duo stamina.

Fructus membranaceus, divisus in duo loculamenta, cordiformia, plerumque depressa, sæta seminibus modò crassioribus, modò exiguis.

1. *Veronica*; major; latifolia; erecta. *M. H.* 2. 317. *Veronica*, spicata, latifolia. *C. B. P.* 246. *Veronica*, major, latifolia, foliis splendentibus & non splendentibus. *J. B.* 3. 283. *Veronica*, I, erectior, latifolia. *Clus. H.* 346.

2. *Veronica*; maxima; latifolia; erecta; cæruleâ spicâ longissimâ.

3. *Veronica*; spicata; longifolia. *T.* 143. *Lyfimachia*, spicata, cærulea. *C. B. P.* 246. *Veronica*, spicata, recta, profundè serrata, quam *lyfimachiam cæruleam* vocant. *J. B.* 3. 284. *Pseudo-lyfimachium cæruleum*. *Dod. p.* 86. *Veronica*, recta, cæruleo flore. *H. Eyst. Vern.* o. 5. F. 10. Fig. 2. *Lyfimachia*, cæruleo flore. *Clus. H.* LII. *Veronica*, spicata, major, recta, cærulea. *M. H.* 2. 317.

4. *Veronica*; spicata; angustifolia. *C. B. P.* 246. *Veronica*, II, erectior, angustifolia. *Clus. H.* 346. *Veronica*, major, angustifolia, caulis viridibus. *J. B.* 3. 284. *Veronica*, angustifolia, recta, minor, vulgaris. *M. H.* 3. 318.

5. *Veronica*; spicata; angustifolia; flore incarnato. *Flor.* 2. 104. *Veronica*, spicata, flore purpureo. *M. H. Blæs.* 321.

6. *Veronica*; mas; supina; & vulgatissima. *C. B. P.* 246. *Veronica*, vulgarior, folio rotundiore. *J. B.* 3. 282. *Veronica*, mas, serpens. *Dod. p.* 40. †.

7. *Veronica*; major; frutescens; altera. *M. H.* 2. 319. *Veronica*, cha-

chamædrys foliis, longioribus, & angustioribus. Flor. 2. 104. Chamædrys, spuria, major, altera, sive frutescens. C. B. P. 248. Chamædrys, falsa, maxima; an Teucrium I, seu majus Pannonicum Clusii. J. B. 3. 286. Teucrium, IV. Clus. H. 349.

8. Veronica; major; frutescens; altera; foliis constanter & eleganter variegatis.

9. Veronica; minor; virgulosa, seu multicaulis; Pannonica. *M. H. 2. 320. Veronica, multicaulis, Pannonica. T. 145. Chamædrys, spuria, minor, latifolia. C. B. P. 249. Chamædrys falsa species, Teucrium II, aut V. Clusii. J. B. 3. 286. Teucrium, V. Clus. H. 350.*

10. Veronica; minor; foliis imis rotundioribus. *M. H. 3. 320. Chamædrys, spuria, minor, rotundifolia. C. B. P. 249. Chamædrys, spuria, latifolia. J. B. 3. 286.*

11. Veronica; maxima; latifolia, seu folio quercus. *M. H. 2. 322. Veronica maxima. Lugd. 1165. Chamædrys, spuria, latifolia, major. C. B. P. 248. Veronica, chamædrys foliis, latissimis, flore incarnato. Flor. 2. 104. H.*

12. Veronica; tenuissimè laciniata; minor. *M. H. 2. 321. Veronica, Austriaca, foliis tenuissimè laciniatis. T. 144. Veronica, foliis tenuiter laciniatis, instar paronychiæ. Ind. 98. Chamædrys, spuria, tenuissimè laciniata. J. B. 3. 287. Chamædrys, Austriaca, foliis tenuissimè laciniatis. C. B. P. 248. Prodr. 117. H.*

13. Veronica; aquatica; major; folio subrotundo. *M. H. 3. 323. Anagallis, aquatica, major, folio subrotundo. C. B. P. 252. J. B. 3. 791. Anagallis, sive Becabunga. Ger. †.*

14. Veronica; aquatica; minor; folio subrotundo. *H. L. T. 145. Anagallis, aquatica, minor, folio subrotundo. C. B. P. 252. Anagallis, aquatica, flore cæruleo, foliolo rotundiore, minor. J. B. 3. 790. †.*

15. Veronica; aquatica; major; folio oblongo. *M. H. 2. 323. Anagallis, aquatica, major, folio oblongo. C. B. P. 252. Berula major. Tab. Ic. 719. Anagallis, aquatica, flore cæruleo, folio oblongo, major. J. B. 3. 791. †.*

16. Veronica; aquatica; minor; folio oblongo. *T. 145. Anagallis, aquatica, minor, folio oblongo. C. B. P. 252. Anagallis, aquatica, flore purpurascens, folio oblongo, minor. J. B. 3. 791. †.*

17. Veronica; terrestris, annua; folio polygoni; flore albo. *M. H. 2. 322. a. †.*

18. Veronica; pratensis; serpillifolia. *C. B. P. 247. M. H. 2. 319. Veronica, fœmina, quibusdam, aliis betonica Pauli, serpillifolia. J. B. 3. 285. Veronica pratensis. Dod. p. 41. a. †.*

19. Veronica; flosculis caulibus adhærescentibus. *M. H. 2. 322. Alsine, Veronicæ folio, flosculis cauliculis adhærentibus. C. B. P. 250. Alsine, serrato folio, hirsutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus. J. B. 3. 367. Alysson. Col. Phytob. 28. a. †.*

226 PLANTAE DIANGIAE POLYSPERMAE.

20. Veronica; hederulae folio. *M. H. 2. 322. Alsine, hederulae folio. C. B. P. 250. Alsines genus Fuchsio, folio hederulae hirsuto. J. B. 3. 368. Alsine, spuria, prior, sive morsus gallinae. Dod. p. 31. Veronice, cymbalariae folio, verna. T. 145. a. †.*

21. Veronica; flosculis oblongis pediculis insidentibus; chamaedryos folio. *M. H. 2. 322. Alsine chamaedryfolia, flosculis pediculis oblongis insidentibus. C. B. P. 250. Alsine, serrato folio, glabro. J. B. 3. 366. Alsine, spuria, altera. Dod. p. 31. a. †. Foliis conjugatis.*

22. Veronica; flosculis oblongis pediculis insidentibus; chamaedryos foliis alternis. *H. L. 622. a. †.*

23. Veronica; caerulea; trifido, aut quinquesfido, folio. *Flor. 2. 105. Veronica, verna, trifido, vel quinquesfido, folio. T. 145. Veronica, caerulea, triphyllus, nunc pentaphyllos, seu trifida, & quinquesfida. M. H. 2. 323. Alsine, triphyllus, caerulea. C. B. P. 250. Alsine, folio profunde secto, flore purpureo, sive violaceo. J. B. 3. 367. Alsine, parva, recta, folio alsines hederaceae, sed rutae modo diviso. Lob. Ic. 464. a. †.*

24. Veronica; Virginiana; altissima; spicae multiplici; floribus candidis. *Flor. 2. 104. Veronica, Virginiana, procerior, foliis ternis, quaternis, & etiam quinis caulem amplexantibus, spicis florum candidissimis. Plukn. Phyt. 70. F. 2. Floribus est tubulosis, quadrifidis, capsulis verò teretibus.*

25. Veronica; Chia; folio cymbalariae; verna; flore albo, umbilico yirescente. *T. Cor. 7. a.*

26. Veronica; Orientalis; minima; foliis laciniatis. *T. Cor. 7. H. R. D.*

BLATTARIA. T. 147. 61.

Folia alterna.

Calix monophyllus, quinquesfidus, stellatus.

Flos monopetalus, rotatus, quinquesfidus, infimo ambitui ovarii arctè adnatus, stamina quinque eleganter plumata, in longis spicis, atque longioribus plerumque pedunculis, laxius dispositus.

Fruetus est rotundus, septo medio divisus in duo loculamenta, fæta seminibus plurimis, exiguis.

1. Blattaria; folio lato, vix laciniato; flore obsoletè flavo, apice pistilli purpureo. *Blattaria, flore obsoletè flavescente. H. L. 90. b.*

2. Blattaria; folio lato, vix laciniato; flore obsoletè fusco, apice pistilli purpureo. *Blattaria, flore ferrugineo. H. R. Par.*

3. Blattaria; alba. *C. B. P. 241. Blattaria, flore albo. J. B. 3. App. 874. H. Eyst. Æst. o. 10. F. 4. Fig. 1. b.*

4. Blattaria; lutea; folio longo, laciniato. *C. B. P. 240. Bl*

ria. Dod. p. 145. *Blattaria lutea*. J. B. 3. App. 874. *Blattaria*, flore luteo. H. Eyst. Æst. o. 10. F. 4. Fig. 2. b.

5. *Blattaria*; purpurea. C. B. P. 241. *Blattaria*, flore caeruleo, vel purpureo. J. B. 3. 875. *Blattaria*, perennis, flore violaceo. M. H. 2. 488. *Blattaria*, purpurea, radice perenni. M. H. Blæs. a.

6. *Blattaria*; perennis; folio verbasci; flore luteo, amplo. M. H. R. Blæs.

7. *Blattaria*; folio multifido; flore luteo. An *Blattaria*, *Ragufina*, *incana*, *multifida*. M. H. 2. 490. *Blattaria*, *incana*, *multifida*. Bocc. Rar. 61? Apud nos folio est viridi, pallecente aliquando, sed non incano. a.

8. *Blattaria*; flore roseo.

9. *Blattaria*; flore nigræ violæ colore eleganti nitente. C. B. P. 242.

10. *Blattaria*; annua; flore majore luteo; capsulâ item majore. M. H. 2. 498. *Blattaria*, magno flore. C. B. P. 241. J. B. 3. 875. a.

VERBASCUM. T. 146. 61.

Folia alterna, incana, vel atro-viridia, magna.

Flos monopetalus, rotatus, pentapetaloides, in spicis longis, arctius, atque breviori pedunculo cauli adnatus.

Fructus ovatus, acuminatus, septo medio divisus in duos loculos.

1. *Verbascum*; mas; latifolium; luteum. C. B. P. 239. *Verbascum*, *vulgare*, flore luteo, magno, folio maximo. J. B. 3. App. 871. *Verbascum* latius. Dod. 143. *Verbascum*, foliis incanis, mas, latifolium, floribus luteis, arctè cauli adherentibus, sine foliis angustis inter flores emanantibus. M. H. 2. 485. *Verbascum*, latifolium, mas. H. Eyst. Æst. o. 10. F. 5. Fig. 2. b. †.

2. *Verbascum*; foemina; flore luteo, magno. C. B. P. 239. *Verbascum*, maximum, Meridionalium, odoratum, luteum. J. B. 3. App. 871. *Verbascum*, foliis incanis, maximum, odoratum, Meridionalium, floribus luteis, arctè cauli adherentibus, & foliis multis, angustis, inter flores emanantibus. M. H. 2. 485. b.

3. *Verbascum*; foemina; flore albo. C. B. P. 239. *Verbascum*, maximum, Meridionalium, odoratum, luteum. J. B. 3. App. 871. *Verbascum* angustius. Dod. p. 143. *Verbascum*, foliis incanis, maximum, odoratum, Meridionalium, floribus albis, arctè cauli adherentibus, & foliis multis angustis, inter flores emanantibus. M. H. 2. 485. b.

4. *Verbascum*; mas; angustioribus foliis; floribus pallidis. C. B. P. 239. *Verbascum*, pulverulentum, flore luteo, parvo. J. B. 3. App. 872. *Verbascum*, foliis incanis & pulverulentis, floribus luteis, parvis, racema-
ut. M. H. 2. 486. b.

5. Verbasum; lychnitis; flore albo, parvo. C. B. P. 240. *Verbasum*, flore albo, parvo. J. B. 3. App. 873. *Verbasum*, quartum Casalpini, floribus pallidis. H. Eyst. Æst. o. 10. F. 5. Fig. 3. *Verbasum*, foliis incanis, floribus albis, parvis, racematim provenientibus, cum staminibus itidem albis. M. H. 2. 486. b.
6. Verbasum; nigrum; folio papaveris corniculati. C. B. P. 240. *Verbasum*, crispum & sinuatum. J. B. 3. App. 872. *Verbasum*, sylvestre, tertium. Dod. p. 146. Descr. *Verbasum*, foliis viridibus papaveris corniculati, valde ramosum, floribus luteis, parvis, racematim provenientibus. M. H. 2. 486. b.
7. Verbasum; nigrum; flore ex luteo purpurascens. C. B. P. 240. *Verbasum*, nigrum, flore parvo, apicibus purpureis. J. B. 3. App. 873. *Verbasum* nigrum. Dod. p. 144. *Blattaria* Plinii, seu *Verbasum* nigrum. H. Eyst. Æst. o. 10. F. 4. Fig. 3. *Verbasum*, foliis viridibus, crassifloribus. M. H. 3. 486.
8. Verbasum; blattariæ foliis; nigrum; amplioribus foliis alutis; apicibus purpurascens. Flor. 2. 98.
9. Verbasum; foliis nigris, amplis; flosculis albis; apicibus purpureis; perenne. An *Verbasum*, *Alpinum*, perenne, nigrum, flore albo, staminibus purpureis. H. R. Par. T. 147?
10. Verbasum; humile; *Alpinum*; villosum; borraginis folio & flore. H. L. 619. T. 147. *Sanicula*, *Alpina*, foliis borraginis, villosa. C. B. P. 243. *Auricula ursi*, *Myconi*, pilosa, cærulea. J. B. 3. App. 869. *Auricula ursi*, *Myconi*. Lugd. 837.
11. Verbasum; Orientale; sophiæ folio. T. Cor. 8. *Blattariis* potius inferenda.

DIGITALIS. T. 165. 73.

Folia alterna.

Calix monophyllus, quinquesidus, segmentis longis, amplisque.

Flores monopetali, tubulati, compressi, rictu ovali, limbo aliquantulum reflexo, staminibus quatuor præditi. Malp. An. Pl. 48. 173. utrinque patentes, digitabulum referentes, uno versu dispositi in spicis longis. Malp. An. Pl. 43. 134. A. A.

Fructus subrotundi, acuminati, bifariam dehiscentes, in duo loculamenta divisi, fæta seminibus exiguis.

1. Digitalis; purpurea; folio aspero. C. B. P. 243. M. H. 2. 478. *Digitalis purpurea*. J. B. 2. 812. Dod. p. 169. *Digitalis*, flore rubra. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 2. Fig. 2. b.
2. Digitalis; rubella; folio aspero. b.

3. Digitalis; alba; folio aspero. C. B. P. 244. M. H. 2. 478. Digitalis, flore magno, candido. J. B. 2. 803. Digitalis, II. Dod. p. 169. Digitalis, flore albo. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 2. Fig. 1. b.
4. Digitalis; Hispanica; purpurea; minor. T. 165. Digitalis, verbasci folio, purpurea, minor, perennis, Hispanica. Barr. Ic. 1183. Obs. 187. b.
5. Digitalis; latifolia; flore ferrugineo. M. H. 2. 478. H. R. Par. Digitalis, maxima, ferruginea. Park. Par. 381. b.
6. Digitalis; lutea; magno flore. C. B. P. 244. M. H. 2. 479. Digitalis, lutea, flore majore, folio latiore. J. B. 2. 813. Digitalis, flore luteo. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 1. Fig. 3. b.
7. Digitalis; lutea; minore flore. M. H. 2. 479. Digitalis, major, lutea, vel pallida, parvo flore. C. B. P. 244. Prodr. 115. Digitalis, flore minore, subluteo, angustiore folio. J. B. 2. 814. b.
8. Digitalis; Orientalis; folio tragopogi; flore albido. T. Cor. 9.
9. Digitalis; Canariensis; acanthoides; frutescens; flore aureo. H. A. 2. 105. H. R. D.
10. Digitalis; angustifolia; flore ferrugineo. C. B. P. 244. M. H. 2. 478. Digitalis, ferruginea, folio angustiore. J. B. 3. 813. Digitalis ferruginea. Lob. Ic. 573. b.

Flore ex alis foliorum.

11. Digitalis; minima; gratiola dicta. M. H. 2. 479. Gratiola centaurioides. C. B. P. 279. Gratiola. J. B. 3. 434. Dod. p. 362. Gratiola, flore albo, & gratia Dei. H. Eyst. Vern. o. 6. F. 15. Fig. 2.

HYOSCYAMUS. T. 117. 43.

Folia alterna, mollia, pingua.

Calix campaniformis, brevis, amplius, in quinque acuta segmenta divisus. Malp. An. Pl. 40. 116. A. B.

Flos monopetalos, infrâ tubulosus, suprâ expansus in quinque segmenta, obtusa, stamina quinque.

Fructus intra calicem reconditus instar ollæ operculo instructæ, divisus in duo loculamenta.

1. Hyoscyamus; vulgaris; vel niger. C. B. P. 169. M. H. 2. 494. Hyoscyamus vulgaris. J. B. 3. 627. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 8. Fig. 1. Hyoscyamus niger. Dod. p. 450. a. †.

2. Hyoscyamus; rubello flore. C. B. P. 169. M. H. 2. 495. Hyoscyamus, peculiaris, flore purpurascens. J. B. 3. 628. Hyoscyamus Syriacus. Cam. Ic. XXI. J. B. 3. 628. Hyoscyamus Ægyptius. Clus. H. LXXXI 11. a.

3. Hyoscyamus; albus; major; vel tertius Dioscoridis; & quartus

tus Plinii. C. B. P. 169. M. H. 2. 494. *Hyoscyamus albus*. J. B. 3. 627. Dod. p. 451. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 8. Fig. 2. Flore & calice in octo segmenta fisso. b.

4. *Hyoscyamus*; major; albo similis; umbilico floris atro-purpureo. T. C. 5. b.

5. *Hyoscyamus*; albus; Ægyptius. Alp. Ex. 192. *Hyoscyamus albus*. Velling. in Alpin. 59. a.

6. *Hyoscyamus*; Creticus; luteus; major. C. B. P. 169. Prodr. 92. M. H. 2. 494. *Hyoscyamus*, Creticus, luteus, minor. C. B. P. 169. J. B. 3. 628. *Hyoscyamus*, albus, Creticus. Clus. H. LXXXIIII. *Hyoscyamus*, Creticus, alter. Clus. H. LXXXIIII. b.

7. *Hyoscyamus*; aureus. Alpin. Ex. 99. b.

8. *Hyoscyamus*; folio in tenuissimas & acutiores lacinias scisso. An *Hyoscyamus*, Ægyptius, cauliculis spinosissimis. M. H. 2. 494? b. H.

NICOTIANA. F. 117. 41.

Radix annua.

Calix longus, tubulosus, quinquefidus in longa, acuta, segmenta, vel brevis, amplus, in segmenta obtusa.

Flos monopetalus, infundibuliformis, in segmenta acuta quinque profunda & stellatim expansa, vel brevior & obtusa, fissus, staminibus quinque præditus.

Fructus membranaceus, oblongus, vel subrotundus, septo medio in duos loculos divisus.

1. *Nicotiana*; major; latifolia. C. B. P. 169. M. H. 2. 492. *Nicotiana*, major, sive *Tabacum majus*. J. B. 3. 629. *Hyoscyamus Peruvianus*. Dod. p. 452. *Tabacum latifolium*. H. Eyst. Autumn. o. 2. F. 9. Fig. 1. a.

2. *Nicotiana*; major; angustifolia. C. B. P. 170. M. H. 2. 492. H. Eyst. Aut. o. 2. F. 10. Fig. 1. *Nicotiana*, sive *Tabacum*, folio angustiore. J. B. 3. 630. *Hyoscyami Peruviani altera* Icon. Dod. p. 452. a.

3. *Nicotiana*; minor. C. B. P. 170. M. H. 2. 493. H. Eyst. Aut. o. 2. F. 10. Fig. 3. *Priapeja* quibusdam *Nicotiana* minor. J. B. 3. 630. *Hyoscyamus luteus*. Dod. p. 450. a.

4. *Nicotiana*; minor; foliis rugosioribus, amplioribus. Vaill. a.

Flore monopetalo, anomalo.

LINARIA. T. 168. 76.

Folia alterna, vel terna simul, oblonga.

Calix monophyllus, in quinque segmenta, longa, acuta, divisus.

Flos imâ parte tubulatus, exeuns in calcar longum, quod producit extra tubum calice exceptum, dein ad anteriora fit personatus, bilabiatus, labio superiori secto, inferiori in formam rictus labiati adaptato, & trifariam diviso; ex infimâ, interiore, parte tubi floris quatuor stamina.

Ovarium in fundo calicis, intra florem, placentula adnatum, emittit tubum longam, fit fructus rotundus, septo medio divisus in duos loculos, vario modo se aperientes, in quibus singulis insunt semina vel compressa, marginata, vel angulata, subrotunda.

1. Linaria; Americana; maxima; flore purpureo. H. L. 376. Descr. 377. Ic. *Antirrhinum, triornithophorum*. Vir. Lusitan. Linaria, latissimo folio, Lusitanica. H. R. Par. H.

2. Linaria; latifolia; Dalmatica; magno flore. C. B. P. 212. Prodr. 106. Linaria, maxima, foliis lauri, Dalmatica. J. B. 3. 458. Linaria, maxima, Dalmatica, foliis lauri, flore magno. M. H. 2. 498.

3. Linaria; purpurea; major; odorata. C. B. P. 213. M. H. 2. 500. Linaria, purpurea, magna. J. B. 3. 460. Linaria, altera, purpurea. Dod. p. 183. Linaria, purpureo-violacea, elatior. H. Eyst. Aut. o 2. F. 12. Fig. 3. b.

4. Linaria; arvensis; cærulea. C. B. P. 213. Linaria, arvensis, cærulea, erecta. C. B. Prodr. 107. Linaria, odorata, Monspessulana, minor, cærulea. J. B. 3. 461. a.

5. Linaria; Hispanica; angustifolia; minor; flosculis cæruleis, pallidis, minimis. a.

6. Linaria; vulgaris; lutea; flore majore. C. B. P. 212. M. H. 2. 499. Linaria, lutea, vulgaris. J. B. 3. 456. Linaria prima. Dod. p. 183. Linaria vulgaris. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 14. Fig. 3. †.

7. Linaria; Sicula; multicaulis; folio molluginis. Bocc. Rar. 38. Linaria, asparagi corrudæ prioris dicti Clusio foliis. M. H. 2. 500. Flore pallidè luteo. a.

8. Linaria; Sicula; multicaulis; folio molluginis; flore luteo, rictu aureo. a.

9. Linaria; pumila; supina; lutea. C. B. P. 213. M. H. 2. 501. Linaria, lutea, parva, serpens. J. B. 3. 457. Linaria, Hispanica, V. Clus. Hist. 321. a.

10. Li-

432 PLANTAE DIANGIAE POLYSPERMAE.

10. Linaria; triphylla; minor; lutea. C. B. P. 212. M. H. 2. 502. *Linaria Valentina*. Clus. Hist. 351. *Linaria, Hispanica*, I. Clus. H. 320. *Vexillo floris pallido*. a.

11. Linaria; triphylla; minor; lutea; floris vexillo, & calcari, purpureo. a.

12. Linaria; seu Olyris alba. M. H. 2. 500.

13. Linaria; seu Olyris alba, variegata.

14. Linaria; annua; Chalepensis; minor; erecta; flore albo, lineis violaceis notato, calici ex quinque foliolis instructo insidente. M. H. 2. 502. a.

15. Linaria; annua; Chalepensis; minor; erecta; flore omnino albo. H. L. a.

16. Linaria; minima; foliis hirsutis; floribus obsoletè fusci coloris. M. H. 2. 502. *Linaria, pumila, vulgatiore, arvensis*. T. 169. *Antirrhinum, arvense, minus*. C. B. P. 212. *Antirrhinum minimum*. J. B. 3. 465. a. †.

2 17. Linaria; hirsuto folio, subrotundo; flore ex herbido flavescente. M. H. 2. 503. *Linaria, segetum, nummulariae folio, villosa*. T. 169. *Elatine, folio subrotundo*. C. B. P. 252. *Elatine, mas, folio subrotundo*. J. B. 3. 372. *Veronica, femina, Fuchsi, sive elatine*. Dod. p. 42. a.

18. Linaria; hirsuto folio, acuminato, in basi auriculato; flore luteo, minimo. M. H. 2. 503. *Elatine, folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo*. C. B. P. 253. *Elatine, femina, folio anguloso*. J. B. 3. 372. *Elatines altera* Icon. Dod. p. 42. a.

3 19. Linaria; folio glabro, subrotundo; hederæ folio clematidis. M. H. 2. 503. *Cymbalaria*. C. B. P. 306. *Cymbalaria, flosculis purpurascens*. J. B. 3. 685. *Cymbalaria, foliis hederaceis, flore caeruleo*. H. Eyst. Æst. o. 6. F. 5. Fig. 2. †.

20. Linaria; folio crasso origani minore; floribus variegatis ex pallido & caeruleo rubefcente. H.

21. Linaria; annua; purpureo-violacea; calcaribus longis; foliis imis rotundis; minor; caerulea. Bot. Monsp. 159.

22. Linaria; pumila; latifolia; Hispanica; flore maximo, variegato. Jussieu. a.

ANTIRRHINUM. T. 167. 75.

Folia alterna.

Calix monophyllus, quinquesfidus, brevis.

Flos monopetalus, personatus, non caudatus, antè bilabiatus, labio superiori bifido, inferiori tripartito, inrictum labiatum formato; ex imâ interiore parte floris quatuor stamina.

In fundo calicis placentula est, cui innascitur ovarium

emittens tubam longam, fitque fructus oblongus, capitis vitulini æmulus, septo medio in duos loculos divisus, in quibus semina plurima.

1. Antirrhinum; latifolium; flore rubro, rictu luteo. *Antirrhinum vulgare.* J. B. 3. 462. *Antirrhinum, majus, alterum, folio longiore.* C. B. P. 211. *Antirrhinum.* Dod. p. 182. *Antirrhinum, majus, longiore folio.* M. H. 2. 505. *Antirrhinum, flore rubro.* H. Eyst. Æst. o. 1. F. 9. Fig. 2. b.

2. Antirrhinum; latifolium; flore rubro obsoletiore, rictu ex albo lutescente. b.

3. Antirrhinum; latifolium; flore ruberrimo, rictu rubro, apice labii luteo. b.

4. Antirrhinum; latifolium; flore albo, rictu luteo. *Antirrhinum, flore albo, oris luteis.* H. Eyst. Æst. o. 1. F. 10. Fig. 2. b.

5. Antirrhinum; latifolium; flore luteo, grandi. b.

6. Antirrhinum; latifolium; flore rubello, magno, rictu aureo. b.

7. Antirrhinum; latifolium; flore rubello, magno, rictu pallido. b.

8. Antirrhinum; latifolium; flore magno, toto pallido. b.

9. Antirrhinum; angusto folio linariæ; flore pallido, rictu luteo.

10. Antirrhinum; angusto folio linariæ; flore toto albo. *Antirrhinum, flore albo.* H. Eyst. Æst. o. 1. F. 9. Fig. 1. b.

11. Antirrhinum; angusto folio linariæ, eleganter variegato; flore rubro, rictu luteo. b. H.

12. Antirrhinum; angusto folio linariæ; flore candido, rictu luteo. b.

13. Antirrhinum; angusto folio linariæ; flore obsoletè purpureo; procumbens. b.

14. Antirrhinum; arvense, majus; flore rubro. C. B. P. 212. *Antirrhinum, arvense, minus.* M. H. 2. 505. *Antirrhinum, angustifolium, sylvestre.* J. B. 3. 464. *Antirrhinum sylvestre.* H. Eyst. Æst. o. 1. F. 9. Fig. 3. Dod. p. 182. b.

15. Antirrhinum; arvense; majus; flore albo. H. R. Par. b.

16. Antirrhinum; angustifolium; majus; peregrinum; flore ruberrimo. H. R. Par. b.

17. Antirrhinum; Hispanicum; villosum; folio origani. T. 168. b.

18. Antirrhinum; majus; saxatile; foliis angustissimis; flore purpurascente minore. Barr. Ic. b.

ASARINA. T. 171. 76.

*Folia Hederae, mollia, hirsuta.**Calix sectus in quinque profunda segmenta.**Flos Antirrhini.**Fructus Linariae.*

1. Asarina; Lobelii. Lugd. 915. Asarina, sive saxatilis hederula. Lob. Adv. 262. Obs. 329. Asarina, Lobelii, flore hederæ terrestris. J. B. 3. App. 856. M. H. 3. 432. Antirrhino, seu linariae, affinis, folio hederæ terrestris. Flor. 2. 102. Hedera, saxatilis, magno flore. C. B. P. 306. a. H.

SCROPHULARIA. T. 166. 74.

*Calix monophyllus, constans quinque longis, gracilibus, vel obtusis, vel acutis, segmentis.**Flos monopetalus, anomalus, utrinque patens, plerumque globosus, bilabiatus, urceum referens, labio superiori binis foliolis succincto, quasi auriculis, barbâ deorsum flexâ, faucibus amplis; ex pariete interno imi floris stamina quatuor.**Fructus rotundus, acuminatus, bifariam dehiscens, septo medio distinctus.*

1. Scrophularia; annua; folio urticæ. M. H. 2. 481. Scrophularia, folio urticæ. C. B. P. 236. Scrophularia, flore rubro, Camerarii. J. B. 3. 422. Scrophularia peregrina. Cam. Hort. Ic. XLIII. a.

2. Scrophularia; annua; folio lamii; flore luteo. M. H. 2. 482. Scrophularia, flore luteo. C. B. P. 236. Scrophularia, lutea, magna, amplis foliis. J. B. 3. 422. Scrophularia, montana, maxima. Col. 1. 191. a.

1 3. Scrophularia; nodosa; foetida. C. B. P. 235. M. H. 2. 482. Scrophularia, vulgaris, & major. J. B. 3. 421. Scrophularia. Dod. p. 50. †.

2 4. Scrophularia; radice fibrosâ. M. H. 2. 482. Scrophularia, aquatica, major. C. B. P. 235. Scrophularia, maxima, radice fibrosâ. J. B. 3. 421. Betonica aquatilis. Dod. p. 50. †.

5. Scrophularia; nemorensis; folio urticæ rugoso; flore atro-purificante. H. C.

6. Scrophularia; melissæ folio. T. 166. Scrophularia, scorodoniæ folio. M. H. 2. 482. Plukn. Ph. LIX 5. H.

7. Scrophularia; Hispanica; sambuci folio glabro. T. 166. Scrophularia, folio sambuci, flore rubro, luteo, vario, pulchro. V. Scrophularia, sambuci folio. Park. Tb. 611. H.

PLANTAE DIANGIAE POLYSPERMAE. 235

8. Scrophularia; maxima; Lusitanica; sambuci folio lanuginoso. T. 167. H.

9. Scrophularia; ruta canina dicta; vulgaris. C. B. P. 236. Scrophularia, major, ruta canina dicta, vulgaris. M. H. 2. 483. Scrophularia, tertia Dodonæo, tenuifolia, ruta canina quibusdam vocata. J. B. 3. 423. Ruta canina. Clus. H. CCIX. H.

10. Scrophularia; Lusitanica; frutescens; verbenacæ foliis. T. 167. Scrophularia, Americana, verbenæ folio. H. Maurocen. 158. H.

11. Scrophularia; Orientalis; foliis cannabinis. T. Cor. 9. H.

12. Scrophularia; Nebrodensis; folio urticæ; altissima; flore phœnico. H. Catb. H. Maurocen. 158. b.

13. Scrophularia; peregrina; frutescens; foliis teucris crassiusculis. Breyn. Prodr. 1. T. 166. H.

14. Scrophularia; subrotundo, crasso, & nigricante folio; flore luteo-pallido; capsulâ turgidâ. Bocc. Mus. 2. 65. T. 60. b. H.

15. Scrophularia; Hispanica; foliis tenuissimis. Salvad. b. H.

PEDICULARIS. T. 171. 77.

Folia conjugata, crenata.

Flos monopetalus, anomalus, personatus, bilabiatus, labio superiori galeato, inferiori tripartito.

Fructus bifariam dehiscens, divisus in duo loculamenta, sæta seminibus oblongis, compressis.

1. Pedicularis; pratensis; lutea; vel crista galli. C. B. P. 163. M. H. 3. 426. Crista galli, femina. J. B. 3. 436. Crista galli. Dod. p. 556. a. †. *Alectorolophos.*

2. Pedicularis; pratensis; purpurea. C. B. P. 163. Pedicularis quibusdam, crista galli, flore rubro & albo. J. B. 3. 437. Pedicularis, purpurea, vel palustris, seu pratensis, vulgaris, humilior. M. H. 2. 427. Fistularia. Dod. p. 556. †.

EUPHRASIA. T. 174. 78.

Folia parva, conjugata, subrotunda, serrata.

Flos monopetalus, anomalus, personatus, bilabiatus, labio superiori surrecto, multifido, inferiori in tres partes, singulas bifidas, secto.

Fructus est testa oblonga bilocularis.

1. Euphrasia; officinarum. C. B. P. 233. M. H. 3. 430. Euphrasia.

2. Euphrasia, minus ramosa, flore ex cæruleo-purpureo. Arb. F. 13. Fig. 4. a. †.

2. Euphrasia; pratensis; rubra. C. B. P. 234. M. H. 3. 431. *Euphrasia*, parva, purpurea. J. B. 3. 433. *Euphrasia altera*. Dod. p. 55. Col. 1. 200. *Pedicularis*, serotina, purpurascens flore. T. 172. †.
3. Euphrasia; ramosa; pratensis; flore albo. H. Eyst. Æst. o. Arb. F. 13. F. 3. †.

MELAMPYRUM. T. 173. 78.

Folia conjugata.

Flos monopetalus, anomalus, personatus, bilabiatus, superiori galeato, inferiori integro

Fructus rotundus, bilocularis, fœtus semine instar tritici.

1. Melampyrum; comâ purpurascens. C. B. P. 234. M. H. 3. 428. *Melampyrum multis*, sive *tritico vaccinum*. J. B. 3. 439. *Triticum vaccinum*. Dod. p. 541. a. †.
2. Melampyrum; luteum; latifolium. C. B. P. 234. M. H. 3. 429. *Melampyrum*, sylvaticum, flore luteo, sive *satureja*, lutea, sylvestris. J. B. 3. 441. *Parietaria*, sylvestris, secunda. Clus. H. XLIIII. *Parietaria sylvestris*. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 2. Fig. 2. a. †.

POLYGALA. T. 174. 79.

Folia alterna.

Calix constat quinque foliis, binis majoribus instar alarum expansis, tribus minoribus acutis.

Flos monopetalus, anomalus, personatus, posterius perforatus, antè bilabiatus, labio superiori bifido, inferiori pulchrè fimbriato, habens octo stamina, in spicas laxas congestus. Malp. An. Pl. 43. 144.

Fructus calice quinquefolio, ut alis, involvitur, compressus, bifariam dehiscens, in duo loculamenta divisus.

1. Polygala; vulgaris. C. B. P. 215. *Polygala*, tetrapetala, siliculosa, bicaularis, longo & angusto folio, minor. M. H. 2. 326. *Polygala*, vulgaris, minor. H. 324. *Flos ambrervalis*. Dod. p. 253. *Polygonum multis*. J. B. 3. 386. *Polygalon*, flore cæruleo. H. Eyst. Vern. o. 6. F. 11. Fig. 3. a. †.
2. Polygala; flore rubro, purpurascens. H. Eyst. Vern. o. 6. F. 11. Fig. 2. a. †.
3. Polygala; alba. Tabern. Ic. 831. a. †.
4. Polygala; carnea. a. †.
5. Polygala; violacea. a. †.

6. Polygala; frutescens; folio buxi; flore maximo. Oldenl. T. 175. Chamæbuxus, flore coluteæ ex purpurâ rubescente. C. B. P. 471. Ac. Reg. Ic. 1705. T. 4. F. 4. Var. Anonymos, flore coluteæ. Clus. H. 105. Pseudo-chamæbuxus. H. Eyst. Vern. o. 6. F. 12. F. 3. H. R. D.

COMMELINA. Plum. Nov. G. Pl. 48. 38.

Folia alterna, caulem amplexa, faciesque plantæ, Ephemero Virginiano similia.

Finis pedunculi primò se explicat in foliolum, quod explicatum habet figuram cordis, in naturali verò suo situ ita conivertitur, ut referat cymbam, vel concham, quæ sollicitè tegit defenditque flores fœtusque teneros.

Emergit per hanc cymbam pedunculus ramosus, floriger; apici cujusque rami innascitur calix, tenuis, pellucidus, membranaceus, constans quatuor foliolis teneris, distinctis; horum supremum erigitur instar galeæ, bina lateralibus alas quasi referunt, infimum horizontaliter porrectum fingit scyrtalam cavam.

Ex infimo ambitu ovarii, intra calicem ex placentulâ ibi positâ nati, oriuntur bina petala, orta ex superiore parte ejus ambitus sub galeâ calicis, infrâ angusta, suprâ valde lata.

Eodem loco oriuntur tria, tenerrima, brevissima, stamina, gerentia in apice suo mirum aureum fungosum capitulum instar flosculi: a parte verò inferiore ambitus ejusdem infimi ovarii oriuntur alia tria stamina, masculina, crassiora, longiora, mirè intorta, instructa testiculis longis, magnis, fœcundantibus.

Ovarium, quod natum ex placentulâ in centro calicis, instruitur tubâ unâ, longâ, intortâ, fitque fructus oblongus, bilocularis, in quolibet loculo gerens unum semen, oblongum.

1. Commelina; graminea; latifolia; flore cæruleo. Plum. N. G. Pl. 48. Ephemerum, Africanum, annuum, flore bipetalo. H. L.

Quum sit monocotyledon, flore dipetalo, foliis gramineis, satis accedit Ephemero. Fructus apud nos constanti hæcenus eventu est bivascularis: quare ex affinitate hæcreposuit clarus Hermannus; tricapsularem scribit, pingitque Plumierius.

AGERATUM. T. 651. 422.

Foliola confertim aggesta.

Flos monopetalus, personatus, infra tubulatus, supra bilabiatus, labio superiori bifido, inferiori tripartito.

*Fructus oblongus, membranaceus, divisus in duo locula-
menta facta seminibus tenuissimis.*

1. *Ageratum; serratum; Alpinum; glabrum; flore purpurascen-
te. T. 651. Ageratum purpureum. Lugd. 1184. Ageratum, serratum,
Alpinum. C. B. P. 221. Ageratum, purpureum, Dalechampii. J. B. 3.
26. 144. Hyssopoides, montana, flore pentapetaloide, violae purpureae co-
lore, & odore, Agerati foliis. M. H. 3. 613. H.*

ACANTHUS. T. 176. 80. 81.

Radix vivax.

Folia, habitusque, Cardui.

*Finis brevissimi pedunculi explicatur in calicem primò trifoliatum, binis foliolis, gracilibus, tenuibus, aculeatis, lateralibus, medio propendente, magno, cavo, novem vel undecim aculeis duris horrido; parte superiore calix hic defici-
cit; dein intra hunc alius calix bifolius, bilabiatus, galea longiore, cavâ, barbâ brevior, planâ instar linguae.*

Flos monopetalus, anomalus, parte inferiore explicatus in longum petalon, antè trifariam divisum, posterius desinens in annulum, rigidum, apertum, ex cujus interiore pariete oriuntur quatuor incurva stamina, staminibus locum labii superioris occupantibus, & sustentibus apices scoparum æmulus valde spectabiles. Malp. An. Pl. 48. 183.

Fructus formâ glandis, calice obvolutus bifolio interiore, atque adhuc binis tenuibus membranulis, septo medio distinctus in duos loculos.

Semina ut plurimum gibba.

1. *Acanthus; fativus; vel mollis Virgilii. C. B. P. 283. M. H. 3. 604. Carduus, Acanthus, sive Branca arfina. J. B. 3. 75. Acanthus fativus. Dod. p. 719. Acanthus lævis. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 2. Fig. 3. H.*

2. *Acanthus; rarioribus & brevioribus aculeis munitus. T. 176. Acanthus medius, rarioribus & brevioribus aculeis donatus. Fagon. M. H. 3. 604. Acanthus, sylvestris, mitioribus spinis. Plukn. Alm. H.*

3. Acanthus; aculeatus. C. B. P. 383. M. H. 3. 604. Carduus, Acanthus, sive Branca ursina, spinosa. J. B. 3. 75. Acanthus sylvestris. Dod. p. 719. Acanthus spinosus. H. Eyst. Æst. o. 11. F. 1. Fig. 1. H.

4. Acanthus; Orientalis; humillimus; foliis pinnatis, aculeatis. T. Cor. 10. H.

ADHATODA. T. 175. 79.

Folia conjugata.

Calix monophyllus, oblongus.

Flos monopetalus, anomalus, personatus, bilabiatus, labio superiori adunco, sursumque ad posteriora revoluto, inferiori tripartito, pendulo.

In fundo calicis placentula, cui innascitur ovarium, instructum tubâ longâ, qui fit fructus æmulus clavæ, bifariam dehiscens, septo medio divisus in duos loculos.

Semina compressa, cordis figuram referentia.

1. Adhatoda; Zeylanensium. H. L. App. 642. Ic. Echolion, sive Adbatoda Zeylon. Plukn. 173. Dictamno fortè affinis, arborescens Indica, lauri Americane foliis, sive echolium Zeylanensium, foliis laurinis. Breyn. Prodr. 2. 42. H. R. D.

2. Adhatoda; Indica; folio saligno; flore albo. An Adhatoda, flore minori. T. 175. Bem Curint. H. Mal. 2. 33? Acanthoides, hyssopi latioris folio, Canariensis, echolii Indici, sive Adbatodæ cucullatis floribus æmula. M. H. 3. 604. Hyssopifolia ex insulis Fortunatis. Plukn. Phyt. 280. H. R. D.

DODARTIA. T. C. 47. 478.

Calix monophyllus, tubulosus, divisus in quinque segmenta, longa, constans.

Flos monopetalus, bilabiatus, galeâ bifidâ, cornutâ, parvâ, barbâ longâ, trifidâ, trisulcatâ, inferius tubulatus, ex pariete interno partis tubulosæ quatuor stamina, singula instructa binis testiculis; flores semper-singulares nascuntur, non verticillati.

In imo fundo calicis placentula, cui innascitur intra florem ovarium sphericum, emittens ex centro apicis tubam longam apice crassescente, fit fructus globosus, bilocularis, bivalvis, septo medio distinctus in binos loculos, sætos semi-

talis; flore purpurascente. T. C. 47. Voy. 2. 350.

CHE.

CHELONE. *T. Ac. Reg. Sc.* 1706. *T. 7. F. 2.*

Calix squamosus, brevis, viridis.

Flos monopetalus, bilabiatus, galeâ testudinis testam referente, bifido apice, barbâ extra galeam prominente trifidâ, ex interiore, inferiore, parte floris stamina quatuor, capite testiculato.

Ovarium natum ad placentulam in fundo calicis, intra florem, instructum tubâ longâ, fit fructus perfectè referens Digitalis fructum, rotundulus, oblongus, bilocularis, fœtus seminibus marginatis parvâ fimbriâ foliaceâ.

1. Chelone; Acadiensis; flore albo. *T. loco citato. H. R. D.*

OROBANCHE. *T. 175. 81.*

Radix squamosa.

Habitus αψυλλῶς.

Finis pedunculi explicatur in calicem multifidum.

Flos monopetalos, anomalus, bilabiatus, galeâ cavâ, barbâ trifidâ, digestus in spicas, atque amplectens

Ovarium oblongum, instructum tubâ longâ, uniloculare, bivalve, per maturitatem dehiscens in duas valvas, fœtum seminibus minutissimis.

1. Orobanche; major; garyophyllum olens. *C. B. P. 87. M. H. 3. 502. Orobanche. H. Eyst. Vern. o. 7. F. 2. F. 1. Orobanche, flore majore. J. B. 2. 780. Limodorum, sive Orobanche. Dod. p. 552. †.*

2. Orobanche; ramosa; floribus purpurascens. *C. B. P. 88. M. H. 3. 502. Orobanche minor, purpureis floribus, sive ramosa. J. B. 2. 782. Orobanche, III, πολύκλαδῶς. Clus. H. 271. †.*

3. Orobanche; ramosa; floribus cæruleis. *C. B. P. 88. Var. †.*

4. Orobanche; ramosa; floribus subalbidis. *C. B. P. 88. Var. †.*

Ob similitudinem floris hac relatam potius subjunctam vellem supra pag. 207. post Hottoniam.

PLANTÆ TRIANGIÆ POLYSPERMÆ.

I.

HYPERICUM. T. 254. 131.

*Radix fibrosa.**Folia conjugata in geniculis caulium.**Calix monophyllus, quinquesfidus, constans, expansus.**Flores rosacei, pentapetali, multis staminibus ornati, amplectentes ovarium conicum, instructum tribus tubis, longis, recurvis, abique deinde in fructum parvum, oblongum, ex tribus vasculis arctè junctis compositum, sætis multis seminibus exiguis.*

1. Hypericum; vulgare. C. B. P. 279. M. H. 2. 469. *Hypericum vulgare*, sive *perforata*, caule rotundo, foliis glabris. J. B. 3. 381. *Hypericum*. Dod. p. 76. *Hypericum officinarum*. †.

2. Hypericum; ascyron dictum; caule quadrangulo. J. B. 3. 382. *Androsæmum ascyron* dictum, caule quadrangulo, glabro. M. H. 2. 471. *Ascyrum*. Dod. p. 78. *Hypericon*. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 10. F. 3. †.

3. Hypericum; villosum; erectum; caule rotundo. T. *Androsæmum*, ascyron dictum, caule rotundo, hirsuto. M. H. 2. 471. 472. *Hypericum*, androsæmum dictum. J. B. 3. 382. *Androsæmum hirsutum*. C. B. P. 280. *Androsæmum alterum*, hirsutum. Col. 1. 74.

4. Hypericum; elegantissimum; non ramosum; folio lato. J. B. 3. 383. *Ascyrum*, sive *Hypericum*, bifolium, glabrum, non perforatum. C. B. P. 280. *Androsæmum*, bifolium, glabrum, perfoliatum, non perforatum. M. H. 2. 471. *Androsæmum Campoclarense*. Col. 1. 74. b.

5. Hypericum; supinum; tomentosum; Hispanicum. Clus. H. CLXXXI. *Hypericum*, supinum, tomentosum, majus, vel Hispanicum. C. B. P. 279. M. H. 2. 470. H. R. D.

6. Hypericum; minus; erectum. C. B. P. 279. *Hypericum*, pulchrum, Tragi. 74. J. B. 3. 383. *Hypericum*, minus, glabrum, erectum, pulchrum. M. H. 2. 470.

7. Hypericum; minus; vel minus, supinum; glabrum. C. B. P. 279. M. H. 2. 469. *Hypericum*, minimum, supinum. J. B. 3. 384. *Hypericum*, supinum, III, minimum. Clus. H. CLXXXI. a.

8. Hypericum; perfoliatum; & perforatum. T. 255. *Androsæmum*, alterum, Apulum. Col. p. 1. 78. *Androsæmum*, perfoliatum, & perforatum. C. B. P. 280. M. H. 2. 470. H.

Hh

9. Hy-

242 PLANTAE TRIANGIAE POLYSPERMAE.

9. Hypericum; folio breviori. C. B. P. 279. M. H. 2. 469. *Hypericum*, *Syriacum*, & *Alexandrinum*. J. B. 3. 383. Lob. Ic. 398. H. R. D.

10. Hypericum; frutescens; Canariense; multiflorum. H. A. 2. 135. H. R. D.

11. Hypericum; foetidum; frutescens. T. 255. *Androsæmum*, foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis. C. B. P. 280. M. H. 2. 471. *Ruta*, hypericoides, quibusdam, Sicilianæ affinis, sive *tragium*. J. B. 3. 385. *Tragium legitimum Veterum*. Pon. Bald. 88. *Androsæmum foetidum*, seu *tragodes*. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 10. F. 2.

12. Hypericum; Orientale; flore magno. T. Cor. 19. *Hypericum*, montis Olympi. Wbel. Itiner. 94. *Ascyron*, exiguo folio, flore magno. T. 256. H. R. D.

13. Hypericum; crispum; triquetro, & cuspidato, folio. Bocc. Mus. p. 2. T. 12. H. Videtur omnino idem ipsi nono.

2.

ANDROSÆMUM. T. 251. 128.

Omnia ut in Hyperico majora.

Fruetus bacca, ovata, tricapsularis.

1. *Androsæmum*; maximum; frutescens. C. B. P. 280. *Androsæmum*, maximum, quasi frutescens, bacciferum. M. H. 2. 472. *Siciliana*, aliis *Ciciliana*, vel *Androsæmum*. J. B. 3. 384. *Androsæmum*. Dod. 78. *Siciliana*. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 10. F. 1. H. R. D.

3.

ASCYRUM. T. 256. 131.

Omnia ut in Hyperico, & in Ascyro.

Fruetus pyramidalis, acuminatus, quinquecapsularis.

1. *Ascyrum*; magno flore. C. B. P. 280. Prodr. 130. *Androsæmum*, flore, & thecâ, quinquecapsulari, omnium maximis. M. H. 2. 472. *Hypericum Constantinopolitanum*, flore maximo. Flor. Batav. 2. 108. *Androsæmum Constantinopolitanum*, flore maximo. Wbel. Itin. 172. *Ascyroides*. Alpin. Exot. 172. H.

2. *Ascyrum*; Balearicum; frutescens; maximo flore, luteo; foliis minoribus, subtus verrucosis. Salvador. Myrto-Cyrtus Pennæi. Clus. H. 68. C. B. P. 468. H. R. D.

4.

PARNASSIA. T. 246. 127.

Folia subrotunda, in orbem fusa.

Calix pentaphylloides.

Flos rosaceus, petalis amplioribus, & minoribus fimbriatis, constans, in caule unus.

Ovarium fit fructus parvus, conoïdes, dehiscens in tres, vel quatuor, loculos, fœtos seminibus exiguis, tanquam in totidem carinas.

1. Parnassia; palustris; & vulgaris. T. 246. Gramen Parnassi, albo simplici flore. C. B. P. 309. Gramen Parnassi Dodoneo, quibusdam hepaticus flos. J. B. 3. 537. Gramen Parnassium. Dod. p. 564. Gramen Parnassi. H. Eyf. Æst. o. 8. F. 11. F. 3. †.

5.

VIOLA. T. 419. 236.

Folia alterna.

Calix quinquefidus, expansus, firmus, retrorsum reflexis segmentis.

Flos pentapetalos, anomalus, vexillo dipetalo, alis binis, & carinâ caudatâ, constans, quinque staminibus præditus. Malp. An. Pl. 43. 138.

Ovarium in fundo calicis fit fructus conicus, trigonus, in tres carinas explicatus in orbem vi diffiliens, fœtas semine plurimo rotundo. Malp. An. Pl. 50. 194.

1. Viola Martia; purpurea; flore simplici, odoro. C. B. P. 199. M. H. 2. 474. Viola Martia, purpurea. J. B. 3. 542. Viola nigra, sive purpurea. Dod. 156. †.

2. Viola Martia; multiplici flore. C. B. P. 199. Viola Martia, purpurea, flore multiplicato, majore. J. B. 3. 542. Viola, flore multiplici. Dod. p. 156. Malp. An. Pl. 44. 152.

3. Viola Martia; alba. C. B. P. 199. Viola Martia, flore albo, odorato, & non odorato. J. B. 3. 542.

4. Viola Martia; flore multiplici, candido. C. B. P. 199. Var.

5. Viola Martia; major; hirsuta; inodora. M. H. 2. 475.

6. Viola Martia; folio eleganter variegato; flore purpureo.

7. Viola Martia; inodora; sylvestris. C. B. P. 199. M. H. 2. 474.

Hh 2

Vio.

244 PLANTAE TRIANGIAE POLYSPERMAE.

Viola, cærulea, Martia, inodora, sylvatica, in cacumine semen ferens. J. B. 3. 543. *Viola sylvestris, inodora.* Dod. p. 156. †.

8. *Viola, Alpina; folio in plures lacinias dissecto.* C. B. P. 199. M. H. 2. 476. *Viola montana, folio multifido.* J. B. 3. 544. *Viola montana, laciniato folio.* Clus. H. 309. *Viola, folio aconiti.* Flor. 2. 109. H.

9. *Viola Martia; arborescens; purpurea.* C. B. P. 199. *Viola erecta, flore cæruleo.* M. H. 2. 475. *Jacea tricolor, surrectis caulibus, quibusdam arborea dicta.* J. B. 3. 547. H.

10. *Viola; montana; lutea; grandiflora.* C. B. P. 200. M. H. 2. 476. *Jacea tricoloris genus, flore luteo, magno, repens, non annuum.* J. B. 3. 548. *Viola montana; aliud genus.* Clus. H. 310. H.

11. *Viola; tricolor; hortensis; repens.* C. B. P. 199. M. H. 2. 476. *Jacea tricolor, five Trinitatis flos.* J. B. 3. 547. *Flos Trinitatis.* H. Eyf. Hyem. F. 4. F. 4. *Flore minore, violaceo, puniceo, flavo.* a. †.

12. Eadem (11.); flore albo, & luteo. a. †.

13. Eadem (11.); flore pallidè cæruleo, purpureo, & luteo. *Flos Trinitatis, major, violaceus.* H. Eyf. Æst. o. 12. F. 6. F. 2. a. †.

14. Eadem (11.); flore violaceo, holoserico, purpureo, & aureo. a. †.

15. Eadem (11.); flore magno, duplo majore, coloris unius, purpureo, holoserico. a.

16. Eadem (11.); flore pallido. *Flos Trinitatis, pallidus, major.* H. Eyf. Æst. o. 12. F. 6. F. 3. a.

17. Eadem (11.); flore ex aureo & pallido. a.

18. *Viola; bicolor; arvensis.* C. B. P. 200. M. H. 2. 476. *Jacea, bicolor, frugum & hortorum vitium.* J. B. 3. 548. a. †.

6.

ACRIVIOLA. Frid. Cæs. T. 935.

Folia alterna, orbiculata, umbilicata.

Caules scandentes.

Calix quinquefidus, caudatus.

Flos pentapetalos, anomalos, Viola æmulus.

Ovarium fit fructus rotundus, rugosus, constans ternis capsulis, per maturitatem à se mutuò dissilientibus, monococcis.

1. Acrivola; maxima; odorata. *Cardaminum, ampliori folio, & majori flore.* T. 430. 244. *Viola Indica, scandens, nasturtii sapore, maxima, odorata.* H. L. *Flore aurantio.* a.

2. Eadem (1.); flore sulphureo. a.

3. Acrivola. Frid. Cæs. T. 935. *Cardaminum minus, & vulgare.* T. Na-

PLANTAE TRIANGIAE POLYSPERMAE. 245

Nasturtium Indicum, majus. C. B. P. 306 *Nasturtium Indicum*, folio peltato, scandens. J. B. 2. 175. *Nasturtium Indicum*. Dod. p. 397. H. Eyst. Æst. o. 13. F. 1. F. 1. *Viola Indica*, scandens, nasturtii sapore & odore, flore flavo. H. L. *Nasturtium Peruvianum*. Hernand. 161. a.

4. Eadem (3.); flore sulphureo. *Nasturtium Indicum*, flore luteo, dilutiore. H. R. Par. 129. a.

7.

CONVOLVULUS. T. 82. 17.

Folia alterna.

Caules plerumque scandentes.

Succus lacteus plerumque abundans.

Calix in nonnullis duplex, unus bifolius externus, alter intra hunc minor, quinquesidus, tubulosus, in aliis calix simplex.

Flos monopetalos, campaniformis, pentagonus, orâ repandâ, fundo floris sæpe pertuso quinque foraminibus, stamina quinque ex fundo floris sæpe concresecunt in unum tubum.

Ovarium fit fructus subrotundus, membranaceus, calice involutus, tres tubas emittens, in loculos ternos ferè, raro quaternos, divisus; raro quandoque univascularis.

Caule volubili scandente.

1. *Convolvulus*; maritimus; nostras; rotundifolius. M. H. 2. 11. *Soldanella*, maritima, minor. C. B. P. 295. *Brassica marina*, five *soldanella*. J. B. 2. 166. *Soldanella*. Dod. p. 395. *Soldanella marina*. H. Eyst. Æst. o. 13. F. 9. F. 3. †.

2. *Convolvulus*; Syriacus; & *scammonea Syriaca*. M. H. 2. 12. *Scammonea Syriaca*. C. B. P. 294. *Scammonca Syriaca*, flore majore *Convolvuli*. J. B. 2. 163. *Scammonium Syriacum*, *Antiochenum*. Lob. Ic. 620. H. t.

3. *Convolvulus*; Canariensis; sempervirens; folio molli, incano; flore ex albo purpurascens. H. A. 2. 101. *Convolvulus*, Canariensis, longioribus foliis, mollibus, & incanis. Plukn. Phyt. T. 325. H.

4. *Convolvulus*; minor; arvensis; flore roseo. C. B. P. 294. *Convolvulus vulgaris*, flore minore. M. H. 2. 13. *Helxine*, *cissampelos*, multi, five *Convolvulus minor*. J. B. 2. 157. *Smilax*, lævis, minor. Dod. p. 323. †.

(4); flore albo. †.

); flore purpureo. †.

Hh 3

7. Ea-

246 PLANTAE TRIANGIAE POLYSPERMAE.

7. Eadem (4.); flore ex albo & roseo variegato. †.
8. Convolvulus; vulgaris; major; albus. *M. H.* 2. 12. *Convolvulus*, major, albus. *C. B. P.* 294. *Convolvulus* major. *J. B.* 2. 154. *Smilax*, laevis, major. *Dod. p.* 392. *Convolvulus* major, flore albo. *H. Eyst. Æst. o.* 13. *F. 9. F. 1.* †.
9. Convolvulus; vulgaris; major; flore ex roseo & albo variegato. †.
10. Convolvulus; Indicus; flore violaceo. *H. Eyst. Æst. o.* 13. *F. 8. F. 2.* *Convolvulus*, purpureus, folio subrotundo. *M. H.* 2. 13. *C. B. P.* 295. *Campanula Indica.* *J. B.* 2. 165. a.
11. Convolvulus; Indicus; flore albo. *H. R. Par. a.*
12. Convolvulus; Indicus; flore albo purpurascens; semine albo. *H. R. Monsp. a.*
13. Convolvulus; cæruleus; hederaceus; seu trifolius. *Park. M. H.* 2. 13. *Convolvulus*, cæruleus, hederaceo, anguloso, folio. *C. B. P.* 295. *Nil Arabum*, sive *Convolvulus* cæruleus. *J. B.* 2. 164. *Azureus*, sive cæruleus *Convolvulus*, hederaceus, vel smilaceus, exoticus. *Lob. Ic.* 623. *Nil Arabum Camerarii.* *H. Eyst. Æst. o.* 13. *F. 8. F. 3.* *L'azura vulgò. a.*
14. Convolvulus; folio anguriæ; flore exiguo, carneo. *Et Convolvulus*, peregrinus, tenuifolius, argenteus, pilosus, flore carneo. *Ind.* 102. *H.*
15. Convolvulus; Africanus; minor; flore albo, minimo. *Volk. H. Mauroc.* 56. *An Convolvulus*, minor, Africanus. *Park. Th.* 171. *Convolvulus*, peregrinus, folio anguloso, flore albo, parvo. *Ind.* 102. *H.*
16. Convolvulus; argenteus; folio altheæ. *C. B. P.* 295. *M. H.* 2. 13. *Convolvulus*, peregrinus, pulcher, folio betonicæ. *J. B.* 2. 159. *Convolvulus*, folio altheæ. *Clus. H. XLIX.* Flore pulcherrimo ex purpurâ candicante. *H.*
17. Convolvulus; argenteus; altheæ foliis magis incisif, & incanis. *H. L. Convolvulus*, argenteus, elegantissimus, foliis tenuiter incisif. *T.* 85. *Convolvulus*, minor, pentaphyllæus. *Munt.* 503. *H.*
18. Convolvulus; Orientalis; folio crasso, magno, ad pedunculum exciso; flore amplo, subcæruleo. *Sher. H.*
19. Convolvulus; Græcus; sagittæ foliis; flore albo. *T. C.* 1. *Convolvulus*, minimus, angusto, auriculato, folio. *Bocc. Mus. T.* 33. *H.*

Caule vix, vel non, scandente.

1. Convolvulus; Lusitanicus; flore cyaneo. *Broff.* *Convolvulus*; peregrinus; cæruleus; folio oblongo; flore peramœno triplici colore insignito. *M. H.* 2. 17. *Convolvulus* peregrinus, cæruleus, folio oblongo. *C. B. P.* 295. *J. B.* 2. 166. *Campanula exotica.* *Aldin.* 88. Flore variegato. a.
2. Idem (1.); flore, & semine, albo. a.
3. Idem (1.); flore cyaneo. a.

4. Con-

PLANTAE TRIANGIAE POLYSPERMAE. 247

4. Convolvulus; Siculus; annuus; cæruleus; minimus; capsulâ floris binis foliolis cinctâ. *M. H. 2. 36. Convolvulus Siculus, minor, flore parvo, auriculato. Bocc. Pl. Sic. 89. a.*

5. Convolvulus; major; rectus; Creticus; argenteus. *M. H. 2. —*
 11. Convolvulus, argenteus, umbellatus, erectus. *T. 84. Cneoron album, folio oleæ argenteo, molli. C. B. P. 463. Cneoron album, Dalechampi, aliis dorycnium. J. B. 1. 597. Dorycnium Plateau. Clus. App. CCLIV. Dorycnium Imperati. J. B. 1. 598. H.*

6. Convolvulus; argenteus; minor; repens; Rupellensis; flore rubro. *M. H. 2. 17. Ic. est. Sect. 1. T. 4. N^o. 2. Convolvulus, minor, argenteus, repens, acaulis ferè. H. R. Par. H.*

7. Convolvulus; linariæ folio; assurgens. *T. 83. Volutus terrestris Dalechampi. Lugd. 1425. J. B. 2. 160. An Convolvulus minimus, spicæfolius. Lob. M. H. 2. 17? H.*

8. Convolvulus; folio linariæ; humilior. *T. 84. Cantabrica quorundam. Clus. H. XLIX. H.*

9. Convolvulus; ramosus; incanus; foliis pilosellæ. *C. B. P. 294. Cissampelo ramoso di Candia. Pon. Bald. Ital. 16. H.*

8.

QUAMOCLIT. *T. 116.*

Radix annua.

Caulis volubilis, scandens.

Flos monopetalus, infundibuliformis, multifidus.

Fruetus Convolvuli.

1. Quamoclit; foliis tenuiter incisus & pennatis. *T. 116. Convolvulus, pennatus, exoticus, rarior, Quamoclit. Col. I. Observ. LXXII. Quamoclit. J. B. 2. 177. Jasminum, millefolii folio. C. B. P. 398. Convolvulus, exoticus, annuus, foliis myriophylli, seu millefolii aquatici, flore sanguineo. M. H. 2. 20. a. prægn.*

2. Quamoclit; Americana; folio hederæ; flore coccineo. *Commel. Rar. 21. a.*

9.

CAMPANULA. *T. 108. 37.*

Lactis abundantia.

Finis pedunculi explicatur in ovarium, cujus apex coronatur calice monophyllo, quinquesido, in quinque longa segmenta secto. Malp. An. Pl. 43. 133. B.

Flos monopetalus, campanæ instar, pentagonus primò, dein

dein quinquefidus, intra calicem ovario insidens, stamina habens quinque. Malp. An. Pl. 43. 133. A.

Ovarium fit fructus angulosus, plerumque trilocularis, unoquoque loculo parte infernâ pertuso.

1. Campanula; major; lactescens; Lobelii. M. H. 2. 452. Campanula, pyramidata, altissima. T. 109. Campanula, lactescens, fetidior. Clus. H. CLXXII. Pyramidalis levis. J. B. 2. 808. Ranunculus bortenensis, latiori folio, seu pyramidalis. C. B. P. 93. Pyramidalis Lutetianæ. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 7. F. 1.

2. Campanula; persicæfolia Lobelii; flore cæruleo. M. H. 2. 452. Campanula, persicæ folio. Clus. H. CLXXI. Campanula, angustifolia, cærulea. J. B. 2. 803. Rapunculus, persicifolius, magno flore. C. B. P. 93. Campanula, cærulea, persicæfolia. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 8. F. 2.

3. Campanula; persicæ folio; flore pleno. T. 111. b.

4. Campanula; persicæfolia; flore albo. M. H. 2. 452. Campanula alba, persicifolia. H. Eyst. Æst. o. F. 8. F. 3. Campanula, angustifolia, alba. J. B. 2. 803. b.

5. Campanula; persicæfolia; flore albo, pleno. T. 111. b.

6. Campanula; minor; Americana; foliis rigidis; flore cæruleo, patulo. H. L. Trachelium, minus, Americanum, flore cæruleo, patulo. Dod. Mem. 119. Trachelium, minus, Americanum, foliis rigidioribus, flore cæruleo, patulo. H. R. Par. 177. H.

7. Campanula; minor; Americana; foliis rigidis; flore albo. H. L. H.

8. Campanula; radice esculentâ; flore cæruleo. H. L. Rapunculus esculentus. C. B. P. 92. M. H. 2. 455. Rapunculus vulgaris, campanulatus. J. B. 2. 795. b.

9. Campanula; radice esculentâ; flore candicante. H. L. b.

10. Campanula; vulgaris; minor; foliis imis rotundioribus, sinuatis, non serratis; floribus cæruleis. M. H. 2. 456. Campanula minor, rotundifolia, vulgaris. C. B. P. 93. Campanula parva Anguillare Cantabrica. J. B. 2. 796. Campanula sylvestris, minima. Dod. p. 167. Campanula minor, sylvestris, flore cæruleo. H. Eyst. Æst. o. 13. F. 8. F. 1.

11. Eadem (10.); floribus candidis.

12. Campanula; arvensis; erecta. H. L. Campanula arvensis, minima, Dodonæi. M. H. 2. 457. Onobrychis arvensis. C. B. P. 215. Avicularia Sylvii quibusdam. J. B. 2. 800. Speculum Veneris. Ger. a.

13. Campanula; arvensis; erecta; flore albo. T. 112. a.

14. Campanula; pentagonia; flore amplissimo; Thracica. T. 112. Speculum Veneris, flore amplissimo, Thracicum. Raj. Hist. 742. a.

15. Campanula; pentagonia; perfoliata. M. H. 2. 457. Onobrychis, peregrina, perfoliata, folio rotundiori. H.

16. Campanula; minor; annua; foliis

punculus, minor, foliis incis. C. B. P. 92. *Erinos Fabii Columnæ*. J. B. 2. 799. *Erini sive Rapunculi minimum genus*. Col. Phytobaf. 28. a.

17. *Campanula*; maxima; foliis latissimis. C. B. P. 94. M. H. 2. 459. *Campanula*, pulchra, a Tosano Carolo missa. J. B. 2. 807. *Trachelium*, majus, Belgarum. Clus. H. CLXXI. Flore cæruleo.

18. *Campanula*; maxima; foliis latissimis; flore albo. C. B. P. 94. *Trachelium*, candidum, Anglicum, majus, foliis ferè *Digitalis*, vel *Campanule*. J. B. 2. 807.

19. *Campanula*; vulgarior; foliis urticæ; vel major & asperior. C. B. P. 94. M. H. 2. 459. J. B. 2. 805. *Cervicaria major*. Dod. p. 164. Flore cæruleo.

20. Eadem (19.); flore candido. C. B. P. Var.

21. Eadem (19.); flore duplici cæruleo. H. R. Par. 36.

22. Eadem (19.); flore duplici cæruleo majore.

23. Eadem (19.); flore duplici albo. H. R. Par. 36.

24. *Campanula*; hortensis; flore & folio oblongo. C. B. P. 94. M. H. 2. 459. *Viola Mariana Dodonæi*, quibusdam medium. J. B. 2. 804. *Viola Mariana*. Dod. p. 163. Flore cæruleo. b.

25. Eadem (24.); flore subalbido. C. B. P. Var. b.

26. Eadem (24.); flore omninò albo. C. B. P. Var. b.

27. *Campanula*; hortensis; rapunculi radice repente. M. H. 2. 460. *Campanula*, hortensis, rapunculi radice. C. B. P. 94. *Campanula*, repens, flore minore, cæruleo. J. B. 2. 706. co.

28. *Campanula*; Alpina; altissima; hirsuta; parvo flore. T. 110. *Trachelium*, altissimum, hirsutum, asperius, foliis angustis, floribus parvis. J. B. 2. 801. M. H. 2. 461.

29. *Campanula*; pratensis; flore conglomerato. C. B. P. 94. M. H. 2. 461. *Trachelium minus multis*. J. B. 2. 800. *Cervicaria minor*. Dod. p. 164. Flore purpureo.

30. *Campanula*; Alpina; sphærocephalos. C. B. P. 94. *Trachelium*, majus, petræum Ponæ. Bald. in Fol. cccxxxiii. J. B. 2. 801. *Trachelium petræum*, globosum. M. H. 2. 462. *Campanula*, longifolia, flore conglomerato, albo. Ind. 104. b.

31. *Campanula*; Orientalis; folio inciso; flore multiplici. T. Cor. 3. b.

32. *Campanula*; Græca; saxatilis; Jacobææ folio. T. Cor. 3. T. Voy. 1. 260. *Trachelium*, peregrinum, frutescens, crassissimo trunco, infar endiviæ. Ind. 104. H.

33. *Campanula*; lychnoïdea. J. B. 2. 803. *Lychnis*, sylvestris, *Campanule* floræ. C. B. P. 206. *Lychnidis sylvestris species*, Myconi. Lugd. 817. *Convolvulus*, argenteus, umbellatus, supinus. T. 84. H.

24. *Campanula*; saxatilis; echii folio; flore magno. T. 110. b. H.

10.

RAPUNCULUS. T. 113. 38.

*Omnia ut in Campanulâ.**Flos monopetalos, quinquesfidus, stellatus, pistillo corniculato.*

A.

Floribus in caput congestis.

1. Rapunculus; scabiosæ capitulo. C. B. P. 92. Rapunculus, ramosus, corniculatus, scabiosæ capitulo cæruleo. M. H. 2. 464. Scabiosa, globularis, quam ovinam vocant. J. B. 3. 25. 12. Rapuntium montanum, capitatum, leptophyllum. Col. 1. 227. †. a.

B.

Floribus in umbellam dispositis.

1. Rapunculus; valerianoides; cæruleus; umbellatus. Flor. 2. 113. Cervicaria, valerianoides, cærulea. C. B. P. 95. Trachelium, umbelliferum, cæruleum. Pona. Valerianthemum. Hofmann. Delic. Rapunculus, valerianoides, cæruleus. M. H. 2. 465. H. b.

11.

RAPUNTII. T. 163. 51.

*Folia, fructus, & habitus Campanulæ æmula.**Flos monopetalos, in partes linguæformes divisus, vaginâ munitus.*

1. Rapuntium; maximum; coccineum, spicato, flore. Col. in Rech. 880. Rapuntium, galeatum, Virginianum, vel Americanum, coccineum flore, majore. M. H. 2. 466.

2. Rapuntium; Americanum; flore dilutè cæruleo. A. R. P. 105. Rapunculus, galeatus, cæruleus, flore. Flor. 2. 113. Rapunculus, galeatus, Virginianus, flore violaceo, majore. M. H. 2. 466.

3. Rapuntium; Americanum; virgæ aureæ foliis; parvo flore cæruleo. T. 163. a.

4. Rapuntium; Africanum; minus; angustifolium; flore violaceo. T. 163. Campanula, minor, Africana, erini facie, flore violaceo, cauliculis procumbentibus. H. L. a.

12.

RESEDA. T. 423. 238.

Folia pinnata.

Calix quinquefidus, segmentis, longis, angustis, retroflexis, aliquando in segmenta fissus.

Flores polypetali, anomali, ex angustis aliquot petalis, trifidis plerumque facti, in spicas congesti, multis staminibus donati.

Fructus membranaceus, trigonus, aut tetragonus, in summo hians, semina subrotunda ferens, tribus instructus tubis.

1. Reseda; maxima. C. B. P. 100. Reseda Plinii. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 16. F. 1. a.

2. Reseda; alba. J. B. 3. 467. Reseda, foliis calcitrapæ, flore albo. M. H. Blæs. a.

3. Reseda; vulgaris. C. B. P. 100. Reseda lutea. J. B. 3. 467. a. —

4. Reseda; minor; vulgaris. T. 423. Reseda affinis, phyteuma. C. B. P. 100. Phyteuma. J. B. 3. 386. Erucago Apula. Col. 1. 269. a.

5. Reseda; minor; alba; foliis dentatis. Barr. Ic. 588. a.

6. Reseda; minor; folio inferiori parum, superiori magis inciso; perennis.

13.

LUTEOLA. T. 423. 238.

Folia oblonga, integra.

Flos anomalus, polypetalos, petalis dissimilibus.

Fructus globosus, concavus, tricuspis.

1. Luteola herba; salicis folio. C. B. P. 100. Lutea Plinii quibusdam. J. B. 3. 465. Lutum herba. Dod. p. 80. Reseda Tinctorum, salicis folio, luteola dicta. H. L. Pseudo-struthium. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 15. F. 1. a.

14.

SESAMOÏDES. T. 424. 238.

Folia oblonga, integra.

Reseda.

li 2.

Fructu

252 PLANTAE TRIANGIAE POLYSPERMAE.

Fruetu multifiliculoso, vel polycerato, vel stellato, fæto semine reniformi.

1. Sefamoides; Salmanticum; parvum; I. Clus. H. 296. H. Eyf. Aut. F. 2. F. 7. F. 3. Sefamoides, foliis crassis, floribus ex herbaceo purpurascentibus. T. 424. H.

15.

POLEMONIUM. T. 146. 61.

Folia alterna, pinnata.

Flos monopetalos, rotatus, pentapetaloides.

Fruetus rotundus, trilocularis, dehiscens, fætus seminibus oblongis.

Diosc. L. 4.

8.

1. Polemonium; vulgare; cæruleum. T. 146. Valeriana cærulea. C. B. P. 164. Valeriana Græca, violacea. M. U. 55. Valeriana Græca quorundam, colore cæruleo. J. B. 3. 212. Valeriana Græca. Dod. p. 352. Valeriana Græca, flore cæruleo. H. Eyf. Æst. o. 9. F. 11. F. 3.

2. Polemonium; vulgare; album. T. 146. Valeriana Græca quorundam, flore albo. J. B. 3. 212. Valeriana alba. C. B. P. 164. Valeriana Græca, alba. M. U. 55. Valeriana Græca, flore albo. H. Eyf. Æst. o. 9. F. 11. F. 2.

3. Polemonium; vulgare; flore variegato. T. 146. Valeriana Græca, flore ex albo & cæruleo variegato. H. L.

4. Polemonium; vulgare; foliis eleganter variegatis.

PLANTÆ TRIANGIÆ
TRICOCCÆ.

Quæ gerunt vascula frugifera, distincta in tres loculos, quorum singuli habent unum modò semen.

I.

RICINUS. T. 532. 307.

Radix fibrosa.

Folia alterna, magna, incisa.

Flos alius mas, fæmina alter, in eadem spicâ ejusdem plantæ.

Flos

Flos mas fit calice monophyllo, quinquefido, stellatim expanso, ex centro ejus stamina fecunda, masculina, quam plurima, thyrsus brachiatum referentia, dum unita simul spectantur.

Flos femininus, vel ovarium, constat tribus loculis, uni axi accretis, atque ita fructum trigonum referentibus, cujus apex ornatur multis pinnulis, ex medio harum tuba emergit triplex, quarum quaelibet habet apicem bifidum, asperum.

In singulis loculorum hæret unum semen, formâ, & mole, nuclei pini.

1. Ricinus; vulgaris. C. B. P. 432. J. B. 3. 642. M. H. 3. 347. Ricinus. Dod. p. 367. Ricinus major. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 12. F. 1. Palma Christi, vulgô. a.

2. Ricinus; Americanus; major; caule virecente. H. R. P. 156. a. prægn.

3. Ricinus; Africanus; maximus; caule geniculato, rutilante. H. R. P. a. prægn.

4. Ricinus; Americanus; perennis.

5. Ricinus; vulgaris; minor. C. B. P. 432. Erawai, Ricini pusillum genus. Clus. Exot. 48. Ricinus minor. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 11. F. 1. a. prægn.

2.

RICINOIDES. T. 655. 423.

Calix multifolius.

Flos rosaceus, masculinus, polypetalus, staminibus præditus, in parte plantæ remotâ ab ovario.

Fructus in tres capsulas fissilis, fætas semine oblongo, ut in Ricino, obvolutus calice multifido.

1. Ricinoides; Americana; folio gossypii. T. 656. Ricinus, Americanus, major, semine nigro. C. B. P. 432. Ricinus, major, Americanus, Carcas dictus, & faba purgatrix Indiæ occident. J. B. 3. 643. a. prægn.

2. Ricinoides; arbor; Americana; folio multifido. T. 656. Ricinus, Americanus, tenuiter diviso folio. Breyn. Cent. 1. 116. Avellana purgatrix. C. B. P. 418. Avellana purgatrix, Novi Orbis. J. B. 1. 322. H. prægn.

RICINOKARPOS.

Flores masculi in speciem spicae congesti ita oriuntur: finis pedunculi tenelli, villosi, sustinet flosculum nudum, tripetalum, herbaceum, petalis acutis in stellam expansis, ex centro hujus flosculi assurgente in conum oriuntur stamina novem, singula instructa uno testiculo.

Eodem ferè loco plantae oriuntur ovaria, instructa brevioribus pedunculis, rotunda, villosa, trigona, trivascularia, tricocca, instar Ricini.

Communis ortus floris & ovarii succingitur calice quodam communi, unde florum pedunculi exeunt.

1. Ricinokarpos; Afra. Mercurialis procumbens, dicoccos, Africana, folio violae tricoloris. Par. Bat. App. p. 10. H.

2. Ricinokarpos; Americana; flore albo spicato; folio Circae acutiori. a. præg.

Ex semine cylindrico, nigrescente, mole seminis fœniculi, terræ commisso, descendit radix alba, brevis, crassa, intorta, multis, albis, longis, tenellis, sparsis, fibris capillata, annua.

Hæc assurgit caulis brevis, erectus, rigidus, rubellus, subhirsutus, teres, statim expansus in tres, quatuor, plures, similes ramos.

Folia, Circae minoris acutiora, parum nervosa, subhirsuta, alterna, nascuntur in pedunculis brevibus, rubellis, hirsutis, ad caulem & brachia.

Ex alis autem foliorum alii præterea pedunculi, etiam foliosi, evasi, spicam gerunt in extremo florigeram, cujus flosculi mares, ferè ut præcedentis, albi, herbacei, staminibus instructi.

Ad alas eorundem foliorum, atque ad initia pedunculorum florigerorum, nascitur seorsum ovarium, solitarium, trigonum, spinis brevibus, crassis, ad singula latera serie duplici binis ternis-ve positis, aculeatum, triloculare, gerens quolibet loculorum unum semen supra descriptum. Cæterum nec odor, nec sapor, acce quid in plantâ detegit. Crescit inter Berbiches & Surinamam, unde lecta semina mihi misit Joannes Hartogb titulo Persicaria.

CHAMÆLÆA. T. 651. 421.

Folia oleæ mino

bulb. habitu.

Calix brevis,

dentatus.

Flor

PLANTAE TRIANGIAE TRICOCCAE. 255

Flos tripetaloides, ex imâ basi ovarii, unde tria stamina ex interstitiis petalorum orta.

Ovarium in fundo calicis donatum tubâ longâ, trigonum, fit deinde per maturitatem fructus tricoccus; semen oblongum.

1. Chamælæa; tricoccus. C. B. P. 462. J. B. 1. 584. Chamælæa. Dod. p. 363. H.

5.

TITHYMALUS. T. 85. 18.

Radix fibrosa, vel tuberosa.

Folia alterna, oblonga, integra, in paucis orbicularia.

Finis pedunculi dat corpus crassum, instar calicis cavum, cujus laciniis supremis accrescunt quatuor, vel quinque petala anomala, semi-lunata sæpe, excavata; unde apparet

Flos tetrapetaloides, segmentis ferè lunatis, succinctus binis foliolis loco calicis.

Ex cavo calicis imo ad latera styli stamina quatuor, quinque, plura, longiora, breviora, oriuntur, suis instructa testiculis. Ex centro calicis erigitur stylus longus, gerens ovarium trigonum, vel hexagonum, triloculare; ex centro hujus exsurgit tuba longa, triplex, apice bifido, scabro; tam longa hæc tuba excrescit, ut ovarium ferè in medio styli appareat. Malp. An. Pl. 51. 202. 66. 267. 67. 270.

Lactis uberrimi abundantia cuicumque plantæ parti.

1. Tithymalus; latifolius; cataputia dictus. H. L. Tithymalus, major, annuus, glaucifolius. M. H. 3. 339. Lathyris major. C. B. P. 293. Lathyris, sive Cataputia minor. J. B. 3. 880. Cataputia officin. Cataputia vulgaris. H. Eyst. Æst. 0. 12. F. 2. F. 1. a. b.

2. Tithymalus; characias; amygdaloïdes. C. B. P. 220. Tithymalus, characias, II. Clus. H. CLXXXVIII. Qui sæpe caule rubente, & tunc est Tithymalus, characias, rubens, peregrinus. C. B. P. 290. Tithymalus, characias, sive sylvaticus, toto anno folia retinens. J. B. 3. 675. M. H. 3. 335. H. R. D.

3. Tithymalus; characias; amygdaloïdes; foliis eleganter variegatis. Flor. 2. 115. H. R. D.

4. Tithymalus; characias; folio serrato. C. B. P. 290. M. H. 3. 335. Tithymalus, serratus, Dalechampii. J. B. 3. 675. Tithymalus, characias, V. Dod. p. 369. H. R. D.

5. Ti-

Chamaecrista
Lynceum.

258 PLANTAE TRIANGIAE TRICOCCAE.

5. *Tithymalus*; Afer; arborefcens; folio hyperici majore, in fummitate ramorum confertim nato. *An Tithymalus, Africanus, dendroides. Herm. Plant. Afr. Exft. ? H. R. D.*
6. *Tithymalus*; arborefcens; folio glauco, angufto, acuto, denfe congesto. *Tithymalus paralius, ex hortis. Dod. p. 370. Tithymalus maritimus. C. B. P. 291. M. H. 3. 337. Tithymalus paralius. J. B. 3. 674. H. R. D.*
7. *Tithymalus*; myrsinites; latifolius. *C. B. P. 290. M. H. 3. 337. Tithymalus myrsinites. J. B. 3. 674. Tithymalus, myrsinites, I. Tab. Ic. 591. in Libr. 989. Tithymalus, myrsinites, legitimus. Cluf. H. CLXXXIX. H. R. D.*
8. *Tithymalus*; myrsinites; anguftifolius. *C. B. P. 290. M. H. 3. 337. Tithymalus, myrsinites, II. Tab. II. Ic. 592. in Libr. 989. H. R. D.*
9. *Tithymalus*; arboreus; caule corallino; folio hyperici; pericarpio barbato. *Tithymalus, Siculus, altiffimus, angufto falicis folio, pericarpio barbato. Volk. H. R. D.*
10. *Tithymalus*; characias; radice repente. *H. R. Par. Mer. H. R. Bloef. co.*
11. *Tithymalus*; falicis angufto folio glabro. *S. B. P. T.*
12. *Tithymalus*; tuberosa pyriformi radice. *C. B. P. 292. Apios. J. B. 3. 666. Tithymalus, tuberosa radice, Ifchias. Cluf. H. cxc. Tithymalus tuberosus. Dod. p. 373. Tithymalus, characias, radice pyriformi. M. H. 3. 336.*
13. *Tithymalus*; paluftris; fruticosus. *C. B. P. 292. M. H. 3. 341. Tithymalus magnus, five multicaulis, five esula major. J. B. 3. 671. Esula major. Dod. p. 374. Esula major officinarum. †.*
14. *Tithymalus*; arboreus; altiffimus; folio falicis; caulibus rubentibus. *H.*
15. *Tithymalus*; arvensis; latifolius; Germanicus. *C. B. P. 291. M. H. 3. 342. Tithymalus platyphyllos, Fuchfii. J. B. 3. 670. Fuchf. Edit. in Fol. 813. Esula minor, vulgò. a. †.*
16. *Tithymalus*; amygdali folio anguftiori; montis Pollini. *H. C. Tithymalus, folio falicis hirsuto. Ind. 106. a. b.*
17. *Tithymalus*; amygdali folio, breviori, latiori, hirsuto; montis Pollini. *H. C. b. a.*
18. *Tithymalus*; subrotundis foliis, majoribus, crenatis. *H. L. Tithymalus helioscopius. C. B. P. 291. J. B. 3. 663. Dod. p. 371. M. H. 3. 339. a. †.*
19. *Tithymalus*; rotundis foliis, non crenatis. *H. L. Tithymalus, annuus, erectus, rotundifolius, non crenatus. M. H. 3. 339. Peplus, five Esula rotunda. C. B. P. 292. J. B. 3. 669. Peplus. Dod. p. 375. a. †.*
20. *Tithymalus*; annuus; folio rotundo; & caule viridi. *a. †.*
4. 21. *Tithymalus*; maritimus; folio linariae. *Flor. 2. 116. Tithymalus,*

PLANTAE TRIANGIAE TRICOCCAE. 257

lus, annuus, linariæ folio obtusiore, lunato flore. M. H. 3. 339. *Tithymalo maritimo affinis*, linariæ folio. C. B. P. 291. a.

22. *Tithymalus*; Ragufinus; flore luteo, pentapetalo. H. L. M. H. 3. 342. *Tithymalus maritimus*, spinosus. C. B. P. 291. H. R. D.

23. *Tithymalus*; exiguus; erectus. H. L. *Tithymalus*, sive *Esula exigua*. C. B. P. 291. M. H. 3. 339. *Tithymalus minimus*, angustifolius, annuus. J. B. 3. 664. *Esula exigua*, Tragi. Lob. Ic. 357. a. †.

24. *Tithymalus*; foliis pini; fortè Dioscoridis pityusa. C. B. P. 292. M. H. 3. 337. *Tithymalo cyparissiae similis*, pityusa multis. J. B. 3. 665.

25. *Tithymalus*; cyparissias. Pr. Alp. Exot. 65. M. H. 3. 338.

26. *Tithymalus*; exiguus; procumbens; chamælyce dictus. H. L. *Tithymalus*, exiguus, glaber, folio nummulariæ. T. 87. *Tithymalus*, minimus, ruber, rotundifolius, procumbens. M. H. 3. 340. Chamælyce. C. B. P. 293. J. B. 3. 667. Dod. p. 377. a. †.

27. *Tithymalus*; Americanus; arborefcens; folio cotini. H. A. 1. 29. *Tithymalus Curassavicus*, folio cotini, massinilia sylvestris. Par. Bat. Pr. 381. *Tithymalus Syrinamensis*, arborefcens, cotini seu cocceigræ foliis & facie. Br. Prodr. 2. M. H. 3. 337. H. R. D.

28. *Tithymalus*; Indicus; frutescens. Raj. Hist. Plant. 1710. H. A. 1. 27. Tiru Calli H. Malabar. H. A. 2. 85. *Tithymalus*, ramosissimus, frutescens, penè aphyllus. Par. Bat. Prodr. 381. M. H. 3. 337. H. R. D.

29. *Tithymalus*; Indicus; vimineus; penitus aphyllus. H. R. D.

30. *Tithymalus*; arboreus. Alpin. 60. *Tithymalus*, myrtifolius, arboreus. C. B. P. 290. *Tithymalus dendroïdes*. J. B. 3. 675. *Tithymalus*, dendroïdes, ex codice Cæsareo. Dod. p. 372. M. H. 3. 336. H.

31. *Tithymalus*; Orientalis; salicis folio; caule purpureo; flore magno. T. Cor. 2. H. R. D.

32. *Tithymalus*; annuus; erectus; folio oblongo, acuminato. T. 87. Peplis, annua, foliis acutis, flore muscoso. Bocc. Rar. 24. a.

33. *Tithymalus*; Africanus; tuberosus; folio myrti. *Tithymalus*, Africanus, humilis, radice tuberosa, foliis oblongis, in summo cordatis, pediculis biuncialibus insidentibus. Herm. Cat. Plant. Exf. Afr. H.

34. *Tithymalus*; Americanus; folio & facie hyperici. a.

35. *Tithymalus*; folio longo, glauco; caule rubro; capsulis verrucosis; elatior; Siculus. Raj. H. 872. H.

36. *Tithymalus*; Creticus; characias; angustifolius; villosus; & incanus. T. Cor. 1. H.

37. *Tithymalus*; sylvaticus; lunato flore. C. B. P. 290. *Tithymalus sylvaticus*, toto anno folia retinens. J. B. 3. 671. *Tithymalus*, lunato flore. Col. 2. 57.

38. *Tithymalus*; folio lini; major; Italicus. Barr. Obs. 60. Ic. 821.

39. *Tithymalus*; marinus; folio retuso; Terracinenlis. Barr. Obs. 50. Ic. 833. H.

40. *Tithymalus*; palustris; villosus; mollior; erectus. *Barr. Obs.*
 41. *Id.* 885. *Tithymalus*, palustris, folio amygdali glauco, leviter hirsutus. *H. C. H.*
 41. *Tithymalus*; folio salicis tenuissimè serrato & villoso. *T.* 86. *H.*
 42. *Tithymalus*; Lugdunensis; laureolæ folio. *D. Goiffon. H. R. D.*
 43. *Tithymalus*; annuus; lini folio acuto. *Bot. Monsp. M. H.* 3. 339. *a.*
 44. *Tithymalus*; exiguus; villosus; nummulariæ folio. *T.* 87. *Chamaesyce villosa*, major, cauliculis viridibus. *Schol. Bot.* 122. *M. H.* 3. 340. *a.*

6.

EUPHORBIIUM.

Flos, fructus, lac, ut in Tithymalo.

Forma cerei angulosa, spinosa ferè, & ferè aphyllis.

1. *Euphorbium*; cerei effigie; caulibus crassioribus; spinis validioribus armatum. *Breyn. Prodr.* 2. *M. H.* 3. 345. *Euphorbium*. *Dod.* p. 378. *Euphorbium*, cerei effigie. *H. A.* 1. 21. *Tithymalus*, Mauritanicus, aphyllis, angulosus, spinosus, ex quo *Euphorbium officinarum*. *H. L. Euphorbium Dodonæi, Lobelii. C. B. P.* 387. *H.*
2. *Euphorbium*; cerei effigie; caulibus gracilioribus. *Tithymalus*, Mauritanicus, aphyllis, angulosus, spinosus, minor. *Ind.* 107. *Tithymalus*, Africanus, spinosus, cerei effigie. *Excod. Compt. M. H.* 3. 345. *H.*
3. *Euphorbium*; heptagonum; spinis longissimis, in apice frugiferis. *H.*
4. *Euphorbium*; Afrum; polygonum; spinosum; caule tuberibus ornato. *Tithymalus*, aizoides, Africanus, validissimis spinis ex tuberculorum internodiis provenientes. *Comm. Præl.* 59. *H.*
5. *Euphorbium*; tetragonum, & pentagonum; spinosum; Canarinum. *Tithymalus*, aizoides, fruticosus, aphyllis, quadrangularis, & quinquangularis, spinis geminis atro-virentibus armatus. *H. A.* 2. 207. *Tithymalus*, aizoides, lactifluus, &c. *Plukn. Almag.* 370. *Phytogr.* 320. *F.* 2. *H.*
6. *Euphorbium*; Afrum; caule squamoso, tuberoso. *Tithymalus*, aizoides, Africanus, caule simplici squamoso. *Comm. Præl.* 57. *H.*
7. *Euphorbium*; Afrum; caule squamoso, tuberoso; minus. *Ex Horto Amplissimi Simonis van Beaumont. H.*
8. *Euphorbium*; Afrum; caule crasso squamoso, ramis in capitis Medusæ speciem cincto. *H.*
9. *Euphorbium*; Afrum; facie fructus pini. *Tithymalus*, Africanus, arborecens, squamato caule, spinoso. *M. H.* 3. 344. *Planta, laia.*



PHORBIVM : heptagonum : spinis longissimis . in apice frugiferis .
 radix diffusa . B. caudex . C. rami . D. spinas . E. spinas naturæ magnitudinis . F. flos . G. fructus .

Lactaria, Africana, pini fructuum facie. Breyn. Prodr. 2. 100. H.

10. *Euphorbium; verum; Antiquorum; Scadida Calli Horti Malab. H. A. 1. 23. Euphorbium, Indicum, opuntiae facie, caule geniculato, triangulari. Breyn. Pr. 2. M. H. 3. 345. Tithymalus, aizoides, triangularis, nodosus, & spinosus, lacte turgens acri. Plukn. Alm. 370. Tithymalus, Indicus, spinosus, & angulosus, lacte turgens acri. H. Beaum. Scadida Calli. H. Malab. p. 2. T. 42. H.*

11. *Euphorbium; angulosum; foliis nerii latioribus. Tithymalus, aizoides, arborescens, spinosus, caule angulari, nerii folio. Comm. Præf. 56. Euphorbio, aut Tithymalo medio affinis. M. H. 3. 344. Ambigit inter Euphorbia & Tithymalos: unde novo generi statuendo sufficit titulo Euphorbio tithymali. H.*

12. *Euphorbium; quod Anteuphorbium. Dod. p. 378. Lob. Obs. 643. Lugd. 1692. C. B. P. 387. Hujus flores, fructusque, nemini descripti, caret lacte, cetera sociant Euphorbiis, donec exploratior character veritatem definiaverit. H.*

7.

TITHYMALOIDES. T. App. 654.

Species Tithymali.

Flos monopetalos, anomalus, formâ calcei.

1. *Tithymaloïdes; frutescens; folio myrti amplissimo. T. 654. Tithymalus Curassavicus, myrtifolius, flore coccineo, mellifero. Par. Bat. H. R. D.*

2. *An Tithymaloïdes; frutescens; foliis nerii. Plum. T. 654? Non lactescit; florem non vidi. Plukn. Phyl. 304. 3. Ic.*

8.

CORINDUM. T. 431. 246.

Caules repentes, viticulis instructi.

Calix tetraphyllos.

Flos octopetalos, anomalus, quatuor rectis ad decussim expansis, majoribus, quatuor minoribus, aduncis, media occupantibus.

Ovarium fit fructus vesicularis, trilocularis.

Semina instar pisi, atra, cordis albi figuram inscripta.

1. *Corindum; folio ampliori; fructu majore. T. 431. Pisum, vesicarium, fructu nigro, albâ maculâ notato. C. B. P. 343. Halicacabum peregrinum multis, sive Cor-Indum. J. B. 2. 173. Halicacabus peregrina. Dod.*

p. 455. *Pisum cordatum*. H. Eyst. Æst. o. 13. F. 11. l. & vulgò. a.
2. *Corindum*; folio, & fructu, minore. T. a.

PLANTÆ TETRANGIÆ POLYSPERMÆ.

R.

RUTA. T. 257. 133.

Folia in segmenta divisa.

Calix monophyllus, quadrifidus, & quinquefidus, stellatus.

Flores rosacei, tetrapetali, & pentapetali, stamina octo vel decem, quatuor vel quinque ex ungue petalorum, & quatuor vel quinque ex interstitiis petalorum.

Ovarium in fundo calicis fit fructus subrotundus, tetragonus, vel pentagonus, ex totidem capsulis constructus, in quibus semina reniformia, aut angulata. Malp. An. Pl. 67. 268.

1. Ruta; major; hortensis; latifolia. M. H. 2. 507. Ruta, hortensis, latifolia. C. B. P. 336. Ruta sativa, vel hortensis. J. B. 3. 197. Ruta; graveolens, hortensis. Dod. p. 119. H.

2. Ruta; hortensis; latifolia; arbusculæ similis. C. B. P. Var. H.

3. Ruta; Africana; maxima. Catal. Schwerin. H.

4. Ruta; Chalepensis; tenuifolia; florum petalis villis scatentibus. M. H. 2. 508. H.

5. Ruta; Chalepensis; latifolia. H. L. H.

6. Ruta; hortensis; minor; tenuifolia. M. H. 2. 507. Ruta, hortensis, altera. C. B. P. 336. Ruta-tenuifolia. Tabern. Ic. 133.

7. Ruta; hortensis; minor; tenuifolia; foliis variegatis argenteis. H.

8. Ruta; sylvestris; minor. C. B. P. 336. J. B. 3. 200. Ruta, sylvestris, minima. Dod. p. 120. Peganium Narbonensium. Lob. vulgò. H.

9. Ruta; sylvestris; major. C. B. P. 336. J. B. 3. 199. Ruta, sylvestris, graveolens. Dod. p. 119. H.

10. Ruta; sylvestris; linifolia; Hispanica. Bocch. Mus. Part. 2. 82. Tab. 73. Barrell. Ic. 1186. H.

2.

HARMALA. T. 257. 133.

Folia alterna.

Flos rosaceus, pentapetalus.

*Ovarium in fundo calicis fit fructus, subrotundus, tri-
capsularis.*

1. Harmala. Dod. p. 121. Ruta sylvestris, flore magno, albo. C. B. P. 336. M. H. 2. 508. Ruta, quæ dici solet Harmala. J. B. 3. 200. Ob similitudinem Rutæ huc refertur ex Triangiis.

3.

STRAMONIUM. T. 118. 43. 44.

Radix annua.

Folia alterna, sinuata ad margines.

Calix pentagonus, tubulatus.

*Flos monopetalus, infundibuliformis, quinquefidus, pa-
tens.*

*Ovarium in fundo calicis fit fructus aculeatus, subrotun-
dus, diaphragmate decussato in quatuor loculos disseptus,
continentes semina multa reniformia.*

1. Stramonium; fructu spinoso, rotundo; flore albo, simplici. T. 118. Solanum, pomo spinoso, rotundo, longo flore. C. B. P. 168. Stramonium multis dicta, sive pomum spinosum. J. B. 3. 629. Stramonium. Dod. p. 460. Stramonium, seu datyra, pomo spinoso, rotundo, longo flore. M. H. 3. 607. Datura Turcarum. H. Eyst. Aut. o. 2. F. 12. F. 1. a.
2. Stramonium; fructu spinoso, oblongo; caule, & flore, violaceo. Stramonium, sive datyra, pomo spinoso oblongo, caule, & flore, violaceo. Flor. 2. 118. Solanum, fetidum, pomo spinoso, oblongo. C. B. P. 168. Stramonium, majus, purpureum. Park. Par. M. H. 3. 607. a.
3. Stramonium; serox. Boccon. 50. Solanum, fetidum, pomo grandiore, spinosissimo. H. P. Par. 168. Datyra Cochinchensis, spinosissima. Zanon. Hist. 76. Stramonium, sive datyra serox, pomo crassioribus aculeis & robustioribus donato H. L. M. H. 3. 607. a.
4. Stramonium; fructu spinoso, rotundo; flore violaceo, duplici, triplici-ve. T. 119. Stramonium, sive datyra Aegyptiaca, fetida, semine pallido, pomo spinoso, rotundo, flore violaceo, duplici, triplici-ve. Flor. 2. 118. M. H. 2. 607. a.
5. Stramonium; Americanum; minus, alkekengi folio. T. 119. Stramonium,

162 PLANTÆ TETRANGIÆ POLYSPERMAE.

nia, sive *datyra*, *Americana*, *hyoscyami folio*. Flor. 2. *Stramonia Curassavica*, *humilior*. Par. Bat. M. H. 3. 607. *Datyra ex insulâ Sancti Jacobi*, & *datyra*, *hyoscyami folio*, *ex insulâ Sancti Thomæ*. Videntur eadem, quantum ex plantis & semine hoc titulo misso natis spectare licuit. a.

6. *Stramonium*; folio *hyoscyami*; flore toto candido; fructu propendente, rotundo, spinis innoxiiis ornato. *Datyra*, folio *hyoscyami latissimo*, flore toto candido, fructu propendente, rotundo, copiosissimis, & longissimis, spinis, ferè innoxiiis, munito, semine pallido. H. Mauroc. *Stramonia*. H. Eyst. Ant. o. 2. F. 11. F. 1. a.

PLANTÆ PENTANGIÆ
PENTACOCCEÆ.

I.

GERANIUM. T. 266. 142.

Folia plerumque conjugata.

Calix pentaphylloides, stellatim expansus.

Flos in Europæis pentapetalos, rosaceus, in Afris quandoque tetrapetalus quasi galeatus & labiatus, habens stamina decem, ex ambitu fundi ovarii arctè nata.

Fructus pentangius, rostratus, ad basin continens quinque capsulas, in singulis harum semen caudatum, quilibet loculus emittit unam longam, gracilem tubam, quinque he tubæ, arctè coalescentes inter se referunt cum ovario caput ciconiæ vel gruis.

1. *Geranium*; *Africanum*; *arborescens*; *ibisci folio rotundo*; *curliæ odore*. H. L. 274. It. 275. H. R. D.

2. *Geranium*; *Africanum*; *arborescens*; *alchimillæ hirsuto folio*; *floribus rubicundis*. Comm. Præl. 51. It. H. R. D.

3. *Geranium*; *Africanum*; *arborescens*; *alchimillæ folio hirsuto*, *elegantissimè variegato*; *floribus rubicundis*. H. R. D.

4. *Geranium*; *Africanum*; *arborescens*; *malvæ folio plano*, *lucido*; *flore elegantissimo kermesino*. Di tan Lear. Ind. 109. *Geranium Africanum*, *alchimillæ folio*, *arborescens*, *flore coccinea*, *elegantè splendentè*. Clar. Volcham. H. Mauroc. 78. *Geranium Africum*, *arborescens*, *flore ignea*, *Venetis*. H. R. D.

5. *Geranium*; *Africanum*; *foliis inferioribus asari, superioribus staphidis agræ, maculatis, splendentibus, & acetosæ sapore*. Comm. Præl. 52. It. H. R. D.

6. Ge-

6. Geranium; Africanum; frutescens; malvæ folio, odorato, laciniato. *H. L.* 277. *Desc.* 278. *Ic. Geranium, malvæ folio, odoratum, flore purpurascente, Capitis Bonæ Spei. Breyn. Prodr. p. 36. H. R. D.*

7. Geranium; Africanum; frutescens; malvæ folio, laciniato, odorato instar melissæ; flore purpurascente. *Ind.* 110. *H. R. D.*

8. Geranium; Africanum; folio coriandri; floribus incarnatis; majus. *H. L.* 279. *Ubi fortè minus rectè videtur pro synonymo poni Geranium Æthiopicum, myrrhidis folio tertium, flore magno striato. Breyn. Cent. 1. 129. a.*

9. Geranium; Africanum; tuberosum; anemones folio; incarnato flore. *Par. Bat.* 178. *Geranium Æthiopicum, myrrhidis folio, tertium, flore magno striato. Breyn. Cent. 1. 129. Desc. & Ic. H.*

10. Geranium; Africanum; alchimillæ hirsuto folio; floribus albidis. *H. L.* 282. *Descr.* 283. *Ic. H.*

11. Geranium; Americanum; noctu olens; radice tuberosa; triste. *Corn.* 109. *M. H.* 2. 517. *H.*

12. Geranium; Africanum; noctu olens; radice tuberosa; foliis pastinacæ incanis, lanuginosis, latioribus; flore pallidè flavescente. *H. L.* 282. *Geranium, Æthiopicum, noctu olens, radice tuberosa, foliis myrrhidis, latioribus. Breyn. Cent. 1. 126. H.*

13. Geranium; Africanum; noctu olens; radice tuberosa; foliis pastinacæ incanis, lanuginosis, angustioribus; flore pallidè flavescente. *H. L.* 282. *Breyn. Cent. 1. 127.*

14. Geranium; Africanum; noctu olens; folio vitis hirsuto; tuberosum. *H. A.* 2. 123. *H.*

15. Geranium; Africanum; noctu olens; tuberosum; & nodosum; aquilegiæ foliis. *H. L.* 284. *Descr.* 285. *Ic. Geranium Æthiopicum, noctu olens, radice tuberosa, aquilegiæ foliis. Breyn. Cent. 1. 127. H. R. D.*

16. Geranium; Africanum; frutescens; folio crasso, & glauco; acetosæ sapore. *Comm. Præf.* 54. *H. R. D.*

17. Geranium; Africanum; frutescens; alchimillæ folio hirsuto, cum fimbriis purpureis. *Ind.* 110. *Flore rubro, magno. H. R. D.*

18. Geranium; folio altheæ; Africanum; odore melissæ. *Ind.* 111. *Geranium, Afrum, folio betonicæ, procumbens, flore parvo, eleganti, vario. Plukn. Alm. H.*

19. Geranium; Africanum; uvæ crispæ folio; floribus exiguis, rubellis. *H. L.* 287. *Descr.* 289. *Ic. a.*

20. Geranium; Africanum; folio alchimillæ piloso, circulum nigrum inscripto; flore pallido. *Geranium, Africanum, folio alchimillæ piloso, maculato. Ind.* 112. *H.*

21. Geranium; Africanum; tuberosum; folio ranunculi; flore pallido, maculis & stellâ purpureis ornato. *H.*

22. Geranium; Africanum; folio malvæ crasso, molli, odoratissimo; flosculo pentapetalo, albo.

23. Ge-

264 PLANTAE PENTANGIAE PENTACOCCAE.

23. Geranium; Africanum; folio pulsatillæ infrâ argenteo; flore albo. *H.*

24. Geranium; Africanum; folio alceæ; flore coccineo, fulgidissimo. *H.*

25. Geranium; Africanum; folio alceæ; flore albo. *H.*

26. Geranium; Memphiticum; altheæ folio glauco; flosculo rubro, vix conspicuo. *Lippii. a.*

6 27. Geranium; batrachioïdes; Gratia Dei Germanorum. *C. B. P.*

318. Geranium batrachioïdes. *J. B. 3. 475. Dod. p. 63. M. H. 2. 514. Flore cæruleo. Geranium, batrachioïdes, cæruleum. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 8. Fig. 2.*

28. Geranium; batrachioïdes; Gratia Dei Germanorum; flore albo. Geranium, batrachioïdes, flore albo. *H. Eyst. Vern. o. 1. F. 8. Fig. 3.*

29. Geranium; batrachioïdes; Gratia Dei Germanorum; flore variegato. *C. B. P. 318. Geranium, batrachioïdes, ex albo cum cæruleo varium. J. B. 3. 476. M. H. 2. 514. Geranium, Anglicanum, variegatum. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 9. Fig. 2.*

30. Geranium; batrachioïdes; odoratum. *C. B. P. 318. Meris. H. 2. 514. Geranium, batrachioïdes, longius radicum, odoratum. J. B. 3. 477. Geranium macrorhizon. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 16. F. 2.*

31. Geranium; batrachioïdes; folio aconiti. *M. H. 2. 514. C. B. P. 317. Geranium, batrachioïdes aliud, folio aconiti nitente, Clusii. J. B. 3. 476. Geranium II. batrachioïdes, minus. Clus. H. xcix.*

-5 32. Geranium; sanguineum; maximo flore. *M. H. 2. 515. C. B. P. 318. Geranium, sanguineum, sive hæmatodes, crassâ radice. J. B. 3. 478. Geranium VII. aquatiles. Clus. H. cii. Caulibus procumbentibus. H. L. 286. Flor. 2. 120. Geranium, sanguinarium, majus. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 9. Fig. 2.*

33. Geranium; sanguineum; cauliculis erectis; folio obscure virenti; floribus minoribus. *H. L. 286. Flor. 2. 120. Geranium, sanguinarium. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 16. F. 1.*

34. Geranium; hæmatodes; flore variegato. *H. Edinb. & Geranium hæmatodes, Lancastrense, flore eleganter striato. Raj. H. 1061. H.*

35. Geranium; columbinum; dissectis foliis; florum pediculis longissimis. *Raj. H. 1059. a.*

36. Geranium; phæum, sive fuscum; petalis rectis, seu planis. *M. H. 2. 515. Geranium montanum, fuscum. C. B. P. 318. Geranium, phæo, sive pullo, flore, Clusii. J. B. 3. 477. Est hæc quoque aliquando petalis reflexis. M. H. J. B. H. L. Folio non maculoso. H. L. 286. Geranium, fuscum. H. Eyst. Vern. o. F. 10. Fig. 2.*

37. Geranium; phæum, sive fuscum; petalis rectis, seu planis; folio maculato. *H. L. 286.*

38. Geranium; nodosum. *C. B. P. 318. Geranium, magnum, folio trifido. J. B. 3. 478.*

39. Ge-

PLANTAE PENTANGIAE PENTACOCCAE. 265

39. Geranium; tuberosum; majus. *C. B. P.* 318. *M. H.* 2. 516. 4
Geranium tuberosum. *J. B.* 3. 474. *Dod.* p. 61. *H. Eyst. Vern.* o. 1. *F.*
 16. *F.* 3.
40. Geranium; Romanorum; versicolor, sive striatum. *M. H.* 2.
 516. *Park. Par.* 229.
41. Geranium; folio malvæ rotundo; majus. *M. H.* 2. 511. *C. B.* 3 —
P. Var. 318. Geranium, folio rotundo, multum serrato, sive columbinum.
J. B. 3. 473.
42. Geranium; semine nigro; cæruleum. *Flor.* 2. 120. Geranium,
 annuum, minus, batrachioides, Bohemicum, purpuro-violaceum. *M.*
H. 2. 511. a.
43. Geranium; Orientale; columbinum; flore maximo; asphodeli
 radice. *T.* 20. *Cor. T. Voy.* 1. 526.
44. Geranium; columbinum; perenne; Pyrenaicum; maximum.
T. 268.
45. Geranium; columbinum; majus; flore minore, cæruleo. *Raj.*
H. 1059. a.
46. Geranium; columbinum; flore dilutè rubro. a.
47. Geranium; columbinum; tenuius laciniatum. *C. B. P.* 318.
Prodr. 138. *Descr.* a.
48. Geranium; annuum; rotundifolium; montanum; saxatile; lu-
 cidum. *M. H.* 2. 512. Geranium, lucidum, saxatile. *C. B. P.* 318. *Ge-*
ranium lucidum. *J. B.* 3. 481. Geranium saxatile. *H. Eyst. Vern.* o.
 1. *F.* 10. *Fig.* 3. a.
49. Geranium; folio althææ. *C. B. P.* 318. *M. H.* 2. 512. *Gera-*
nium malvaceum. *J. B.* 3. 472. Flore saturatè rubro, & dilutius ru-
 bro. *H. L.* a.
50. Geranium; folio alceæ vesicariæ. *Park. Theatr.* 707. a.
51. Geranium; pusillum; supinum; maritimum; althææ, aut be-
 tonicæ, folio; Anglicum. *Raj. H.* 1056. a.
52. Geranium; Africanum; uvæ crispæ folio; floribus exiguis,
 rubellis. *H. L.* 287. *Descr.* 289. *Id.*
53. Geranium; cicutæ folio; acu longissimâ. *C. B. P.* 319. *Prodr.*
 138. *Descr.* Et Geranium, coriandri folio, odorum. *C. B. P.* 319. *Gera-*
nium, coriandri folio, odorum. *M. H.* 2. 510. Geranium, alterum, co-
 riandri folio, odorum. *Col. p.* 1. 135. a.
54. Geranium; latifolium; annuum; cæruleo flore; acu lon-
 gissimâ. *M. H.* 2. 513. Geranium, latifolium, acu longissimâ. *C. B. P.*
 319. Geranium, speciosum, annuum, longissimis rostris, Creticum.
J. B. 3. 479. Geranium, Creticum, annuum, hæmatodes. *Lob. Ic.*
 662. a.
55. Geranium; cicutæ folio; minus; & supinum. *C. B. P.* 319. *Ge-*
ranium, moschatum, folio ad myrrhidem accedente, minus. *J. B.* 3. 479.
Geranium minus, Geranium arvense. *Tab. Ic.* 57. †. a. Flore rubro.

266 PLANTAE PENTANGIAE PENTACOCCAE.

56. Geranium ; cicutæ folio ; minus ; & supinum ; flore albo. C. B. P. 319. Geranium, arvense, album. Tab. Ic. 57. a. †.

57. Geranium ; cicutæ folio ; erectum ; Romanum. Bocc. Mus. Part. 2. 93. Tab. 82. a.

1 58. Geranium ; cicutæ folio ; moschatum. C. B. P. 319. Geranium, moschatum, odoratum. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 10. Fig. 1. Geranium moschatum. M. H. 2. 513. Geranium, moschatum, folio ad myrrhidem accedente, majus. J. B. 3. 479. Geranium supinum. Ded. 63. a. †.

59. Idem sæpe est inodorum. Geranium, moschatum, inoderum. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 8. Fig. 1. a. †.

- 2 60. Geranium ; Robertianum I. viride. C. B. P. 319. Geranium, Robertianum, murale. J. B. 3. 480. Geranium Robertianum. Ded. p. 62. Geranium, Robertianum, flore dilutè rubello. M. H. 2. 513. Est etiam aliquandò rubrum, tumque est Geranium I. Robertianum, rubens. C. B. P. 319. a. †.

61. Geranium ; foetens. Rivin. Pentap. Irr. a.

62. Geranium ; folio alceæ tenuiter laciniato ; flore pentapetalo, purpurascente ; semine tenui.

63. Geranium ; vernum ; Chium ; folio caryophyllatae. T. Cor. 20. a.

64. Geranium ; hæmatodes ; foliis pallidioribus, altius incis. D. Deale. Raj. Syn. 219.

65. Geranium ; maritimum ; annuum ; laciniatum ; acu longissimâ. T. 269. Geranium supinum, botryos folio, acu sursum spectante. Bocc. Mus. 2. 145. Tab. 109. a.

66. Geranium ; myrrhinum ; tenuifolium ; flore amplo, purpureo. Barr. Obs. 568. Ic. 1245. a.

67. Geranium ; sanguineum ; flore minore ; cauliculis erectis ; Westphalicum. Sigsb. a.

68. Geranium ; Africanum ; folio eleganter crenato ; flore rubro. H.



PLANTÆ POLYANGÆI POLYSPERMÆ.

Post singulos flores fit fructus, qui constat quinque vel pluribus, aut & paucioribus, distinctis vasculis, in quibus continentur semina plurima, numero incerta.

I.

MALVA. T. 94. 23. 24.

*Radix fibrosa.**Folia minus secta, rotunda, vel angulosa, magis, minusve villosa.**Calix primus à fine pedunculi monophyllus, multifidus, continet secundum majorem. Malp. An. Pl. 41. 120. Est autem exterior, brevior, sæpe triphyllus, interior quinquefidus.**Flos monopetalos, campaniformis, patens, pentapetaloides, ad unguem usque fissus. Unguis floris assurgens dat vestem externam tubæ ovarii adscendenti, eamque extrinsecus ambit. Hæc vestis stamina masculina testiculos gerentia undique promit, ita ut hæc undique pyramidalis tubo accreta appareant.**In centro calicis placenta, unde tuba longa, intra tubum descriptum staminiferum condita, quæ in apice multas tubas hiantes in centro medio staminum masculinorum promit. Placentæ in orbem accrescunt siliculæ, casei speciem aggestu suo formantes; in hisce siliculis hærent ordinatâ serie imposita sibi invicem plurima pierumque semina sæpe reniformia. Malp. An. Pl. 44. 149. in tribus figuris. 48. 180. 65. 261.*

1. Malva, arvensis; erecta; lucida; flore majore. T. 95. Malva, arvensis, recta, rotundo, acuminato, angulato, pallidè lucido, folio, carneo flore. multò majore. Cath. a.

c; folio rotundo. J. B. 2. 949. 2.

2. 314. Malva, sylvestris, pu-

Ll 2

mi-

268 PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE.

mila. Dod. p. 653. Malva, sylvestris, perennis, procumbens, flore minore albo, folio rotundo. M. H. 2. 521. †. a.

3. *Malva; procerior; flore minore. Flor. 2. 10. a.*

4. *Malva; Syriaca; pumila; flosculis albidis, cauliculis adhaerentibus. Bob. Malva, annua, flosculis albis, verticillatim nascentibus. T. 96. Et Malva annua, rotundifolia, floribus omnium minimis, albis, pentapetalis, verticillatim genicula ambientibus, seminibus arctè iisdem verticillatim adhaerentibus. M. H. 2. 521. a.*

5. *Malva; Sinensis; erecta; flosculis albis, minimis. a.*

1. 6. *Malva; vulgaris; flore majore; folio sinuato. J. B. 2. 949. Malva, sylvestris, folio sinuato. C. B. P. 314. Malva, sylvestris, procerior. Dod. p. 653. Malva, sylvestris, procerior, seu elatior, recta-ve, flore majore, subrubente aut purpureo, venis saturatè purpureis picto, folio sinuato. M. H. 2. 521. a. †.*

7. *Malva; sylvestris; folio sinuato; flore albo. Sutherl. a.*

8. *Malva; sylvestris; folio sinuato; flore pallidè rubello, venis purpurascens picto. a.*

9. *Malva; rotundifolia; Italica; flore amplo, purpurascens. T.*

96. *Althea, virens, rotundifolia, flore amplo purpurascens, Italica. Barr. Ic. 479. Malva, Lusitanica, elegantissima. Hofman. a.*

10. *Malva; Orientalis; erectior; flore incano suaverubente. T. Cor. 2. a.*

11. *Malva; folio vario. C. B. P. 315. Prodr. 137. Malva stellata. J. B. 2. 950. Malva, trimestris, vel pumila. Clus. H. xxiii. a.*

12. *Malva; humifusa; minima. Sber. H.*

3. 13. *Malva; foliis crispis. C. B. P. 315. Malva crispa. J. B. 2. 952. Dod. p. 653. H. Eyst. Æst. o. 6. F. 9. Fig. 1. Malva, annua, foliis crispis. M. H. 2. 520. a.*

14. *Malva; sylvestris; foliis sinuatis minoribus; flosculis minimis; Anglica. Rand. a.*

15. *Malva; Americana; ulmifolia; floribus conglobatis ad foliorum alas. Plum. T. 95.*

I. LAVATERA. T. Ac. Reg. 1706.

Folia, flos, calix, pistillum, habitus Malvæ.

Pistillum floris fit fructus, qui est clypeus antè excavatus, cui inferiori parte adnascitur corona seminum reniformium.

1. *Lavatera; folio & facie althææ. T. Ac. Reg. 1706. a.*

2. *Lavatera; Africana; flore pulcherrimo. a.*

ALTHÆA. T. 97.

*Omnia Malvæ.**Partes omnes valde lanuginosæ.*

1. Althæa; Dioscoridis; & Plinii. C. B. P. 315. *Althæa, ibiscus.* Dod. p. 655. *Althæa, vulgaris.* H. Eyst. Æst. o. 6. F. 4. Fig. 1. *Althæa, five bismalva.* J. B. 2. 954. *Malva, sylvestris, vel palustris, aut ibiscus.* M. H. 2. 523. †.
2. Althæa; folio rotundiori, aut minus acuminato. Sutherl. †.
3. Althæa; frutescens; Lusitanica; folio rotundiori, undulato. T. 97. *Malva, Hispanica, foliis rotundis, undulatis.* Flor. 2. 10. *Malva, foliis mollibus, undulatis, in margine superius micis sulphureis ad solem splendentibus donatis.* M. H. 2. 523. Tab. 17. Sect. 7. ad N°. 9. H.
4. Althæa; frutescens; folio acuto; parvo flore. C. B. P. 316. *Althæa, arborea, Olbiæ in Galloprovincia.* Lob. Adv. 294. *Malva, frutescens, folio auriculato bederæ instar.* M. H. 2. 523. H.
5. Althæa; frutescens; Lusitanica; folio ampliore, minus incano. T. 197. H.
6. Althæa; frutex II. Clus. H. xxv. H.
7. Althæa; peregrina; erecta; folio rotundo, sinuato; flore purpureo, striato. *Althæa, Hispanica, foliis undulatis.* T. 97. *Malva Hispanica.* M. H. Blas. *Althæa fruticans, Hispanica.* H. Eyst. Æst. o. 6. F. 4. F. 2. H.
8. Althæa; frutescens; folio bryoniæ. C. B. P. 316. Prodr. 138. H.
9. Althæa; maritima; arborea; Veneta. T. 97. *Malva, arborea, Veneta dicta, parvo flore.* C. B. P. 315. *Malva arborescens.* H. Eyst. Æst. o. 6. F. 6. Fig. 1. *Malva arborea.* J. B. 2. 952. b.

MALVÆ ROSEÆ DICTÆ.

Flos planè expansus, major, cauli arctè adhærens; in plenâ loco styli malvacei copiosa petala gerens.

Omnia majora, & quasi arborefcentia, minus mollia. Malp. An. Pl. 44. 149.

1. Malva; rosea; folio subrotundo. C. B. P. 315. *Malva hortensis.* 4 Dod. p. 652. *Malva, hortensis, flore simplici, albo.* H. Eyst. Æst. o. 6. F. 8. Fig. 1. *Malva, rosea, five hortensis, flore albo.* J. B. 2. 951.
2. Malva; hortensis; flore simplici, rubro. H. Eyst. Ibid. Fig. 3.
3. Malva; hortensis; flore simplici, incarnato. Id. Ib. Fig. 2.
4. Malva; rosea; folio subrotundo; flore purpuræ modo relucen- te. C. B. P. Var. 315.
5. Malva; rosea; folio subrotundo; flore ex rubro nigricante. C. B. P. Var. 315.

270 PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE.

6. Malva; rosea; folio subrotundo; flore violaceo. *H. R. P.*
7. Malva; rosea; folio subrotundo; flore simplici, luteo. *H. R. P.*
8. Malva; rosea; folio subrotundo; flore pleno, albo. *C. B. P.*
315. *Var. Malva, hortensis, multiplici flore. Dod. p. 652. Malva, rosea, multiplex, flore albo. H. Eyf. Æst. o. 6. F. 7. Fig. 2.*
9. Malva; hortensis; flore pleno, rubro. *H. Eyf. Æst. o. 6. F. 8. Fig. 5.*
10. Malva; rosea; multiplex; flore incarnato. *H. Eyf. Æst. o. 6. F. 7. Fig. 1.*
11. Malva; hortensis; flore pleno, atro-rubente. *H. Eyf. Æst. o. 6. F. 8. Fig. 4.*
12. Malva; rosea; folio subrotundo; flore pleno, puniceo. *C. B. P. 315. Var.*
13. Malva; rosea; folio subrotundo; flore pleno, subluteo. *H. R. P.*

ALCEA. T. 97. 25.

Folia magis in lacinias profundas divisa habet, cetera paria Malvæ & Althææ.

Semina laxius coherentia.

1. Alcea; rosea; hortensis; maxima; folio ficus. *T. 98. Malva, rosea, folio ficus. C. B. P. 315. Flore rubro.*
2. Alcea; vulgaris; major; flore ex rubro roseo. *C. B. P. 316. Var. M. H. 2. 527. Alcea vulgaris. J. B. 2. 953. Dod. p. 656. H. Eyf. Æst. o. 6. F. 3. Fig. 1.*
3. Alcea; vulgaris; major; flore candidiore. *C. B. P. 316. Var.*
4. Alcea; vulgaris; procerior; folio bryoniæ; flore roseo. *Alcea, major, foliorum segmentis latioribus Flor. 2. 11. Alcea, major, & procerior. Raj. H. 605.*
5. Alcea; cannabina. *C. B. P. 316. M. H. 2. 527. Alcea fruticans. H. Eyf. Æst. o. 6. F. 3. Fig. 2. Alcea, pentaphylli folio, vel cannabina. J. B. 2. 958. Alcea, fruticosa, cannabino folio. Clus. H. xxv.*
6. Alcea; folio rotundo, laciniato. *C. B. P. 316. Malva, sive Alcea, montana. Col. 1. 147. Flore rubello pallido.*
7. Alcea; folio rotundo, laciniato. *C. B. P. 316. Flore rubro.*
8. Alcea; hirsuta. *C. B. P. 317. M. H. 2. 528. J. B. 2. 1067.*
9. Alcea; Virginiana; ricini folio. *Flor. 2. 12. Althæa, Virginiana, ricini folio. H. L. 23. Ic. & Descr. Malva, aceris folio, Virginiana. T. 95.*
10. Alcea; serrata; flore incarnato. *Althæa, flore majore. C. B. P. 316. Althæa Thuringiaca. H. Eyf. Æst. o. 6. F. 5. Fig. 1. Cam. Ic. 6. 4.*
11. Alcea; utriusque Indiæ; carpini folio; semine simplici aristato. *Flor. 2. 12. Alcea Pernambucana, carpini folio, flosculis minimis,*

PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE. 271

mis, luteis, semine simplici rostro donato. M. H. 2. 528. Malva, annua, di Pernambuco. Zanon. H. 132. a.

12. *Alcea; utriusque Indiae; carpini folio; semine duplici aristâ donato. Flor. 2. 12. Alcea, Virginiana, carpini folio, flosculis minimis, luteis, semine duplici rostro vel aculeo prædito. M. H. 2. 528. a.*

Tribus posterioribus, perianthium quinquesidum. Semina quina simul juncta. Flosculi pentapetali, malvaceis minores. Binis posterioribus folia ferè integra. Herman. in Flor. 2. 12.

13. *Alcea; Afra; frutescens; folio grossulariæ; flore parvo, rubro. Malva, Africana, frutescens, folio grossulariæ, flore rubro. Ind.*

114. *H.*

14. *Alcea; Cretica; hirsuta. T. Cor. 2. Flore parvo, rubello. a.*

MALACOÏDES. T. 98. 25.

Flos & habitus Malvæ.

Fruëtus siccus Rubi, constans pluribus capsulis, in capitulum Botryos in modum congestis, fætis semine reniformi.

1. *Malacoïdes; betonicae folio. T. 98. Malva, betonicae folio. Boccon. Ic. 15. & Descr. Zanon. H. 130. M. H. 2. 522. H.*

KETMIA. T. 99. 26.

Folia Malvæ, vel Alceæ, æmula.

Flos Malvæ.

Fruëtus in plura loculamenta divisus, quorum apex per maturitatem dehiscit, in quibus semina plurima.

1. *Ketmia; Syrorum quibusdam. C. B. P. 316. Alcea, arborescens, Syriaca. C. B. P. 316. Alcea, arborescens, glabra, Ketmia dicta. J. B. 2. 957. Alcea Syriaca. H. Eyst. Æst. o. Ult. F. 10. Fig. 1. Alcea, frutex II. Clus. H. xxv. Ketmia Syrorum. Rawolf. Althæa, arborescens, glabra, Ketmia Syrorum dicta. M. H. 2. 530. Flore cæruleo. H.*

2. *Ketmia; Syrorum; flore purpuro-violaceo. T. 99. Alcea, Syriaca, flore purpuro-violaceo. H. R. P. H.*

3. *Ketmia; Syrorum; flore albo. Alcea, Syriaca, flore candido. H. Eyst. Æst. o. Ult. F. 11. Fig. 1. H.*

4. *Ketmia; Syrorum; floribus ex albo & rubro variis. T. 99. Alcea, Syriaca, floribus ex albo & rubro variis. H.*

5. *Ketmia; Sinensis; fructu subrotundo; flore simplici. T. 100. Althæa arborea, rosea, Sinensis, flore simplici. H. L. Rosa, Sinensis, quinquesolia. Ferr. Fl. 493. H.*

6. *Ketmia; Sinensis; fructu subrotundo; flore pleno. T. 100. Althæa, arborea, Sinensis. M. H. 2. 530. Rosa Sinensis. Ferr. Fl. 479. H.*

7. *Ket-*

7. Ketmia; Africana; populi folio. T. 100. *Althæa*, *rosea*, *peregrina*, *fortè rosa moscheutos Plinii*. Corn. 144. M. H. 2. 532. H. L. 25. H.

8. Ketmia; Africana; populi folio subtus incano; & caule virecente. T. 100. *Althæa*, *Indica*, *ulmi folio*, *prægrandis*, *subtus incana*, *flore amplo purpureo*. Plukn. Phyt. T. 6. F. 3. H.

9. Ketmia; Ægyptiaca; semine moschato. T. 100. *Alcea*, *Ægyptia*, *villosa*. C. B. P. 317. *Althæa*, *Ægyptia*, *villosa*. M. H. 2. 533. *Belmuscus*, *Ægyptia*, *Honorio Bello*. J. B. 2. 960. *prægn.* H.

10. Ketmia; Indica; vitis folio; parvo flore. T. 100. *Alcea*, *Indica*, *parvo flore*. C. B. P. 317. *Bamia*. J. B. 2. 959. *Alcea* *Ægyptia*. Clus. H. xxvii. *Bamia*. Alp. *Ægypt*. 38. *prægn.*

11. Ketmia; Indica; vitis folio ampliore. T. 100. *Alcea* *Indica*, *magno flore*. C. B. P. 317. *Bamiæ aliquatenus affinis*, *Sabdariffa*. J. B. 2. 960. *Alcea* *Americana*. Clus. H. xx. vi. *Sabdariffa*. H. Eyf. Æst. o. 6. F. 1. Fig. 1. *Alcea*, *Sabdariffa*, *trifoliata*, *ex insula Podacchieri*. *Triumfetti*. H. *Mauroc. a. Prægn.*

12. Ketmia; Americana; folio papayæ; flore magno, flavescente, fundo purpureo; fructu erecto, pyramidali, hexagono; semine rotundulo; sapore fatuo. *prægn.*

13. Ketmia; Indica; gossypii folio; acetosæ sapore. T. 100. *Althæa*, *Indica*, *gossypii folio*, *acetosæ sapore*. H. L. *prægn.*

14. Ketmia; quæ *Althæa*; magna; folio aceris; cortice cannabino; floribus parvis; semina rotatum in summitate caulium, singula singulis cuticulis cooperta ferens. *Banister. prægn.* H.

15. Ketmia; Americana; paludosa; folio scabro ulmi acutior. H. *prægn.*

16. Ketmia; Brasiliensis; folio ficus; fructu pyramidato, sulcato. T. 100. *Alcea*, *Americana*, *annua*, *flore albo*, *maximo*, *fructu pyramidali*, *sulcato*. H. A. 1. 37. a. *prægn.*

17. Ketmia; vesicaria; vulgaris. T. 101. *Alcea* *vesicaria*. C. B. P. 317. *Dod. p. 657.* *Alcea* *Veneta*. H. Eyf. Æst. o. 6. F. 2. Fig. 1. *Alcea*, *solissequa*, *multis* *Veneta*. J. B. 2. 1068. *Althæa*, *vesicaria*, *Veneta*. M. H. 2. 533. a.

18. Ketmia; vesicaria; Africana. T. 101. *Alcea*, *vesicaria*, *Capitis Bonæ Spei*. M. H. 2. 533. a.

19. Ketmia; Afra; vesicaria; foliis profundius incisis, vix crenatis. *Alcea*, *Africana*, *vesicaria*, *foliis profundius incisis*, *vix crenatis*. *Triumf. a.*

20. Ketmia; Indica; aculeata; foliis digiratis. T. 101. *Alcea*, *Bengalensis*, *spinosissima*, *acetosæ sapore*, *flore luteo-pallido*, *umbone purpurascens*. H. A. 1. 35. a.

21. Ketmia; Virginienfis; folio inferiori ulmi, superiori aceris. *Alcea* *Indica*, *ulmi folio*, *prægrandis*, *subtus incana*, *flore amplo purpureo*. Pluk. Ph. 63. H.

22. Ket-

PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE. 273

22. *Ketmia*; *Indica*; folio *gossypii*; sapore fatuo. *prægn.*

HERMANNIA. T. 656. App. 432.

Calix monophyllos, vesicarius, quinquefidus, profundè sectus.

Flos pentapetalos, petala infrâ angusta, suprâ lata, hinc quasi convoluta, ex ambitu imi ovarii, unde 5 stamina quinque.

Ovarium in fundo calicis, pentagonum, pentangion, dat tubam longam.

1. *Hermannia*; frutescens; folio oblongo, serrato. T. 656. *Althea, Africana*, frutescens, floribus aureis, cochleatis, pendulis, minoribus. Volk. 24. Ic. & Descr. H. R. D.

2. *Hermannia*; frutescens; folio oblongo, serrato, latiori. Ind. 115. *Ketmia, Africana, vesicaria, fruticans* & erecta, alni foliis latioribus & majoribus, flore spirali, sulphureo. H. A. 2. 155. H. R. D.

3. *Hermannia*; frutescens; folio grossulariæ parvo, hirsuto. Ind. 115. *Ketmia, Africana, vesicaria, uvæ crispæ foliis, flore spirali, sulphureo.* Comm. Rar. 7. H. R. D.

4. *Hermannia*; frutescens; folio ibisci hirsuto, molli; caule piloso. Ind. 115. *Ketmia, Africana, frutescens, foliis mollibus, & incanis, flore spirali, sulphureo.* H. A. 2. 157. H. R. D.

5. *Hermannia*; frutescens; folio multifido, tenui; caule rubro. Ind. 116. H. R. D.

6. *Hermannia*; frutescens; folio oblongo, molli, cordato, hirsuto. Ind. 116. H. R. D.

7. *Hermannia*; frutescens; folio lavendulæ latiori & obtuso; flore parvo, aureo. H. R. D.

XYLON. T. 101. 27.

Folia Malvæ vel Alceæ.

Flos monopetalos campaniformis, patens, multifidus, tubo pyramidalis ornatus, stamineo.

Fructus subrotundus, in quaterna vel plura loculamenta divisus, apice debiscens, fœtus seminibus gossypio obductis.

1. *Xylon*; arboreum. J. B. 1. 346. *Gossypium, arboreum, caule lævi.* C. B. P. 430. *Gossypium, arboreum, Gotnemsegiar.* Alp. Egypt. 29. *Gossypium, arboreum, flore atro-purpureo.* H. L. 294. H. prægn.

2. *Xylon*; sive *gossypium herbaceum*, J. B. 1. 343. *Gossypium herba,*

Mm

ba,

274 PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE

ba, semine albo. M. H. 3. 517. Gossypium, sive Xylon. Dod. p. 66. a. pregn.

3. Xylon; sive gossypium ex Cypro. Volk. H. pregn.

ABUTILON. T. 99. 25.

Folia Malvæ.

Flos Malvæ, & totus habitus.

Fructus capitellum refert ex multis vaginulis axi adherentibus, bivalvibus, oblongis.

Semina multa in singulis loculis reniformibus.

1. Abutilon. Dod. p. 656. Abutilon Avicennæ. H. Eyst. Æst. o. 6. F. 10. Fig. 1. Althæa Theophrasti, flore luteo. C. B. P. 316. M. H. 2. 531. Althæa Theophrasti, flore luteo, quibusdam Abutilon. J. B. 2. 958. a. pregn.

2. Abutilon; Indicum. J. B. 2. 659. M. H. 2. 531. Cam. Ic. 1. Althæa Theophrasti similis. C. B. P. 316. a. pregn.

CISTUS. T. 259. 136.

Radix vivax.

Habitus arboreus.

Folia conjugata.

Calix triphyllus, vel pentaphyllus.

Flos rosaceus, pentapetalus, expansus, staminibus numerosissimis.

Ovarium ex centro calicis, apice scabro, hemispherico, incumbente; fit dein fructus subrotundus, vel acuminatus, quinquecapsularis, & multicapsularis, dehiscens.

Semina exigua plurima.

1. Cistus; ladanifera; Hispanica; salicis folio; flore albo, maculâ punicante insignito. T. 260. Cistus, ledon, I, angustifolium, flore maculâ ex purpurâ nigricante infecto. Clus. H. 77. Cistus, ledon, flore maculâ nigricante notato. J. B. 2. 8. Cistus, ladanifera, Hispanica, incana. C. B. P. 467. H.

2. Cistus; ladanifera; Hispanica; salicis folio; flore candido. T. 260. Cistus, ladanifera, Hispanica, flore emaculati candoris. H. L. 151. Cistus, ladanifera, Hispanica, incana. C. B. P. 467. Cistus, ledon, I, angustifolium, flore omnino interdum albo. Clus. H. 77. Cistus ledon. Dod. p. 192. H.

3. Cistus; ledon; foliis laurinâ. C. B. P. 476. Cistus, ledon, laurâ folio. J. B. 2. 8. Ledon, I, latifolium. Clus. H. 77. H.

4. C.

PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE. 275

4. Cistus; ledon; foliis populi nigræ; major. C. B. P. 467. Ledon, latifolium, II, majus. Clus. H. 78. Cistus, ledon, foliis populi nigræ, major. J. B. 2. 9. H.
5. Cistus; mas; folio oblongo, incano. C. B. P. 464. Cistus. Dod. —
p. 191. Cistus, mas, I. Clus. H. 68. Cistus, mas, IV, Monspeliensis, folio oblongo, albido. J. B. 2. 3. Flore purpurascens pallido. H.
6. Cistus; mas; major; folio rotundiori. J. B. 3. 2. Cistus, mas, —
folio rotundo, hirsutissimo. C. B. P. 464. Cistus, mas, Matthioli. Lugd. 222. Cistus, mas, IV. Clus. H. 69. Flore rubro, purpureo. H.
7. Cistus; mas; foliis undulatis, & crispis. T. 259. Cistus, mas, foliis chamædryos. C. B. P. 464. Cistus, mas, V, foliis crispis, & quodammodo sinuosis. J. B. 2. 3. Cistus, mas, V. Clus. H. 69. H.
8. Cistus; mas; folio breviori. C. B. P. 464. Cistus, mas, III. Clus. H. 69. Cistus, mas, III, foliis dilutius virentibus. J. B. 2. 3. H.
9. Cistus; Lusitanicus; folio amplissimo, incano. T. 259. H.
10. Cistus; mas; II, folio longiori. J. B. 2. 2. Cistus, mas, angustifolius. C. B. P. 464. Cistus, mas, II. Clus. H. 69. Lugd. 225. H.
11. Cistus; fœmina; foliis salviæ; elatior; & rectis virgis. C. B. —
P. 464. Cistus, fœmina, Monspeliensis, flore albo. J. B. 2. 4. Cistus fœmina. Clus. H. 70. H.
12. Cistus; ladanifera; Monspeliensis. C. B. P. 467. Cistus, ladanifera, sive ledon, Monspessulanum, angusto folio, nigricans. J. B. 2. 10. Ledum. Lugd. 230. H.
13. Cistus; ledon; foliis angustis. C. B. P. 467. H.
14. Cistus; folio halimi; I. Clus. H. 71. Cistus, fœmina, portulacæ marinæ folio latiore, obtuso. C. B. P. 465. Cistus, folio halimi, flore luteo. J. B. 2. 5. Helianthemum, halimi folio breviori, obtuso. T. 249. H.
15. Cistus; folio halimi; II. Clus. H. 71. Cistus, folio halimi longiori, incano. J. B. 2. 5. Cistus, fœmina, portulacæ marinæ folio angustiori, mucronato. C. B. P. 465. Helianthemum, halimi folio, latiore, mucronato. T. 249. H.
16. Cistus; fœmina; folio salviæ; flore ochræ colore. C. B. P. 465. Cistus, fœmina, Monspeliensis, flore albo, & Hispanica, luteo. J. B. 2. 4. H.
17. Cistus; foliis rorismarini, sed non incanis. C. B. P. 467. Cistus, ledon, IX, Clus. J. B. 2. 12. Ledon IX. Clus. H. 80. H.

J. B. 2. 15. Chamæcisus.
Dod. p. 193. Helianth-
J. B. 2. Chamæcisus I Cist.
J. B. 2. 15. Cist.
J. B. 2. 16. Cist.
J. B. 2. 15. Helianthemum,
minus, Dio. Peri-
Cistus, folio spicae. C.
Cistus, folio latendulae,
H.
J. B. 2. 17.
Chamæcisus, IV.
subtus incanis.
C. B. P. 467.
J. B. 2. 11.
serum pedunculis
seris felicis. C. B. P.
J. B. 2. 13. Cistus, an-
pubescentibus
subtus incanis.
folio oleae : flore lu-

PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE. 277

13. Helianthemum; folio rosmarini; luteum; incanum. *Helianthemum*, *Alpinum*, *luteum*. *Hoc nomine missum. H.*
 14. Helianthemum; folio thymi incano. *J. B. 2. 19. Chamæcisus*, *tenuifolius*, *Narbonensis. H. R. Par. H.*
 15. Helianthemum; album; Germanicum. *Tab. Ic. 1062.*

TELEPHIUM. *T. 248. 128.*

Folia alterna.

Calix polyphyllus.

Flos Helianthem.

Fructus trigonus, unicapsularis, foetus seminibus subrotundis.

1. Telephium; Dioscoridis. *Imperat. 665. Telephium, repens, folio non deciduo. C. B. P. 287. Telephium, legitimum, Imperati, VII. Clus. H. LXVI 1. Polygonum, perenne, procumbens, folio brevior, floribus in capitulum congestis. M. H. 2. 592. Sedum, procumbens, rotundifolium, glaucum, purpurascens floribus. M. H. 3. 474.*

DIERVILLA. *T. Ac. Reg. Sc. 1706.*

Ex alis foliorum conjugatorum pedunculi ramosi.

Finis pedunculi fit caliculus exiguus, gracilis, bifolius, ejus centro innascitur

Ovarium longum, cujus apicis margo coronatur calice quinquesido, segmentis longis, angustis; intra hunc crescit

Flos monopetalus, tubulosus, quinquesidus, segmentorum uno intus valde villosus, ex pariete interno floris stamina quinque.

Ovarium tuba longa instructum, cujus apex globosus, fit fructus pyramidalis, divisus in quatuor loculos, foetus seminibus parvis.

1. Diervilla; Acadiensis; fruticosa; flore luteo. *T. Ac. Reg. Sc. 706. T. 7. F. 1. H. co.*

PYROLA. *T. 256. 132.*

Folia alterna.

Flos rosaceus, pentapetalus, galericulato similis, pifloris recurvo, in spicam congestus.

Mm 3

278 PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE.

*Fructus subrotundus, striatus, umbilicatus, quinque-
capsularis, fœtus feminibus exiguis.*

1. *Pyrola; rotundifolia; major. C. B. P. 191. Pyrola. J. B. 3. 535. Dod. p. 138. H. Eyst. Æst. o. 5. F. 11. Fig. 1. †.*

2. *Pyrola; rotundifolia; minor. C. B. P. 191. Pyrola, minima, Alpina. J. B. 3. 536. Pyrola, IV, minima. Clus. H. CXVIII. Pyrola minima. H. Eyst. Vern. o. 6. F. 12. Fig. 2. †.*

ARISTOLOCHIA. 162. 71.

Folia alterna.

Flos monopetalus, nudus, infrâ tubulatus, suprâ in speciem linguae cavæ, nutantis, formatus, innatus apici ovarii.

Apex ovarii coronatur margine sexangulo, in fundo floris latente; ex centro apicis ovarii emergit tuba pentagona, apiculis cylindricis donata; circa ambitum hujus inferius stamina duodecim, brevissima, in imo fundo circumstant. Ovarium id per maturitatem fit

Fructus membranaceus, ovatus, in sex loculos divisus, in singulis horum semina compressa, sibi incumbentia. Malp. An. Pl. 43. 135. 48. 172. 67. 271.

1. *Aristolochia; flore ex purpurâ nigro. C. B. P. 307. Aristolochia rotunda. J. B. 3. 559. Dod. p. 324. H. Eyst. Æst. o. 4. F. 3. Fig. 1. H.*

2. *Aristolochia; clematidis, recta. C. B. P. 307. Aristolochia, clematidis, vulgaris. J. B. 3. 560. Aristolochia Sarracenica. Dod. p. 326. Aristolochia, longa, vulgaris. H. Eyst. Æst. o. 4. F. 3. Fig. 2. co.*

3. *Aristolochia; pistolochia; altera. J. B. 3. 563. Pistolochia Cretica. C. B. P. 307. Pistolochia, altera, sempervirens. Clus. H. App. 1. CCLX. Aristolochia, pistolochia dicta, Cretica, folio smilacis sempervirens. H. L. 59. H.*

4. *Aristolochia; pistolochia dicta. C. B. P. 307. Aristolochia polyrhizos. J. B. 3. 561. Pistolochia. Dod. p. 325. Clus. H. LXXII. H.*

PAPAVER. T. 237. 119. 120.

Folia alterna.

Calix bifolius, caducus. Malp. An. Pl. 42. 132.

Flos rosaceus, tetrapetalus, ad infima ovarii, staminibus numerosissimis præditus.

Fructus ovatus, tectus tubâ suâ valde singulari, scilicet operculo radiato, distinctus membranulâ exiguâ in tot cellulas, quot

PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE. 279

quot operculo fuerant radii, membranis distinguuntibus semina haerent, ut suis placentis, numerosa, exilia.

Capfulâ, flore, folio lato, glabro, pallido, maximis.

1. Papaver; hortense; semine albo; sativum Dioscoridis; album 1.
Plinio. C. B. P. 170. *Papaver album*. J. B. 3. 390. Dod. p. 445.
Papaver, hortense, simplex, semine albo. M. H. 2. 275. a.

2. Papaver; hortense; semine albo; flore leviter purpureo. C. B. P. 170. a.

3. Papaver; hortense; semine albo; flore cinereo, ungue purpureo. C. B. P. 170. a.

4. Papaver; hortense; semine albo; flore candido, rubris maculis infecto. C. B. P. 170. a.

5. Papaver; hortense; semine nigro; sylvestre Dioscoridis; nigrum 2.
Plinio. C. B. P. 170. *Papaver, hortense, simplex, semine nigro*. M. H. 2. 275. *Papaver, nigrum, sativum*. Dod. p. 445. a.

6. Papaver; flore pleno, rubrum. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 7. Fig. 1. a.

7. Papaver; flore multiplicato, incarnato. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 8. Fig. 1. a.

8. Papaver; flore multiplici, purpurascence. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 8. Fig. 2. a.

9. Papaver; laciniatum, rubrum, unguibus purpureis. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 9. Fig. 2. a.

10. Papaver; laciniatum, rubrum, unguibus albis. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 9. Fig. 3. a.

11. Papaver; multiplex, album, oris rubicundis. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 10. Fig. 1. a.

12. Papaver; flore miniato, pleno. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 10. Fig. 2. a.

13. Papaver; flore pleno, argentei coloris. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 10. Fig. 3. a.

14. Papaver; flore pleno, album. C. B. P. 171. a.

15. Papaver; flore pleno, violaceo. C. B. P. 171. a.

16. Papaver; flore pleno, eleganter striato, laciniato. H. Edinb. a.

Capfulâ & flore maximis, folio inciso hirsutissimo, obscure viridi.

17. Papaver; Orientale; hirsutissimum; flore magno. T. Cor. 17. Commel. Rar. 34. T. Voy. 2. 277.

Capfulâ, flore, foliis obscure virentibus, plus incisis, minoribus.

18. Papaver; erraticum; majus; *poëas* Dioscoridi, Plinio, Theophrasto. C. B. P. 171. *Papaver, erraticum, rubrum, campestre*. J. B. 3. 395. *Papaver erraticum*. Dod. p. 447. *Papaver, erraticum, rubrum*. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 7. Fig. 2. *Papaver, erraticum, majus, sive poëas*. M. H. 2. 277. a. †.

19. Pa-

280 PLANTÆ POLYANGIÆ POLYSPERMÆ.

19. Papaver; erraticum; majus; foliis florum variegatis. *H. R. Par. a.*
 20. Papaver; erraticum; majus; flore albo. *C. B. P. 171. a.*
 21. Papaver; erraticum; majus; flore carneo. *H. Edinb. a.*
 22. Papaver; erraticum; majus; florum unguibus albis. *H. Edinb. a.*
 23. Papaver; erraticum; flore pleno. *C. B. P. 171. a.*
 24. Papaver; erraticum; flore pleno miniato. *H. R. Par. a.*
 25. Papaver; erraticum; flore pleno igneo. *H. R. Par. a.*
 26. Papaver; erraticum; flore pleno igneo, marginibus candidis. *H. L. a.*
 27. Papaver; erraticum; flore pleno purpurascens. *H. R. Par. a.*
 28. Papaver; erraticum; flore pleno phœniceo, unguibus albis. *H. R. Par. a.*
 29. Papaver; erraticum; minus. *C. B. P. 171. a.*
 30. Papaver; erraticum; Pyrenæicum; flavo flore. *C. B. P. 171. Prodr. 92.*
 31. Papaver; Orientale; tenuiter incisum; ad caulem floridum. *T. Cor. 17. a.*

Capsulâ, flore, & foliis obscurius virentibus, tenuissimè laciniatis, minimis.

32. Papaver; erraticum; capite oblongo, hispido. *T. 238. Argemone, capitulo breviori. C. B. P. 172. Argemone, capitulo breviori, hispido. J. B. 3. 396. Papaver argemone dictum, capitulo hirsuto, rotundo, torulis canaliculato. M. H. 2. 278. a.*
 33. Papaver; erraticum; capite longiore, hispido. *T. 238. Argemone, capitulo longiore. C. B. P. 172. Argemone, capitulo longiore, spinoso. J. B. 3. 396. Papaver argemone dictum, capitulo tenuiore, longiore, hirsuto. M. H. 2. 278. a.*
 34. Papaver; erraticum; capite longissimo, glabro. *T. 238. Papaver argemone dictum, capitulo longiore, glabro. M. H. 2. 279. a.*

ARGEMONE. *T. 239. 121.*

Radix annua.

Folia laciniata, in spinas abeuntia.

Capsulæ magnæ, trigonæ, triloculares, apicibus tribus in tres spinas desinentibus.

1. Argemone; Mexicana. *T. 239. Papaver spinosum. C. B. P. 171. Prodr. 92. J. B. 3. 397. Clus. H. xciii. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 5. Fig. 1. Papaver, spinosum, luteum, foliis albis venis notatis. M. H. 2. 277. Ficus infernalis, vulgò. a.*

NYMPHÆA. T. 260. 137 138.

Radix vivax, magna, in fundo fluminum crescens.

Folia crassa, fungosa, orbicularia ferè.

Calix constans quinque floralibus foliis in formam rosæ positis.

Flos rosaceus, petalis parvis, luteis, instar rosæ expansis, rigidis, multis, constans.

Intra hæc stamina numerosissima, orta ex commissura placentæ & ovarii in circulum extrorsum curva.

Fructus globosus, urceolatus, multicapsularis, papaverino similis, semina continens multa, exigua, oblonga.

1. Nymphæa; lutea; major. C. B. P. 193. M. H. 3. 512. Nymphæa lutea. J. B. 3. 771. Dod. p. 585. H. Eyf. Vern. o. 7. F. 3. Fig. 3. †. aq.

2. Nymphæa; lutea; minor; magno flore. C. B. P. 193. †. aq.

LEUCONYMPHÆA.

Finis pedunculi explicatur in calicem magnum, herbaceum, tetraphyllum, instar stellæ radiatæ expansum.

Flos habet petala viginti, vel & plura, alba, magna, instar rosæ eleganter expansa; intra hæc stamina petalodea, quam plurima, instructa testiculis incurvis.

Ovarium innatum placentæ in calice latenti, divisum in loculos viginti per totidem septa normalia, multis seminibus plenos, coronatur viginti tubis, in quarum medio apex obtusus.

Cætera Nymphææ.

1. Leuconymphæa; nymphæa; alba; major. C. B. P. 193. H. Eyf. Vern. o. 7. F. 3. Fig. 1. M. H. 3. 513. Nymphæa alba. J. B. 3. 771. Dod. p. 585. †. aq.

2. Leuconymphæa; minor. Nymphæa, alba, minor. H. Eyf. Vern. o. 7. F. 3. Fig. 2. C. B. P. 193. J. B. 3. 773. M. H. 3. 513. †. aq.

282 PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE.

MICRONYMPHÆA.

Nymphæa omnibus longè minoribus calice & flore pentapetalo.

1. Micronymphæa; quæ nymphæa; lutea; minor; parvo flore. C. B. P. 194. *Nymphæa, minor, lutea.* J. B. 3. 772. *Nymphæa, lutea, minor, Septentrionalium.* Lob. Ic. 595. †. aq.

MICROLEUCONYMPHÆA.

Calix bifolius.

Flos tripetalus, staminibus novem præditus.

Ovarium triloculare, instructum tribus tubis; loculi aliquando bifariam divisi.

Cætera Nymphæa minora.

1. Microleuconymphæa; quæ nymphæa; alba; minima. C. B. P. 193. *Nymphæa minor, sive morsus ranæ.* J. B. 3. 773. *Morsus ranæ.* Dod. p. 583. *Nymphæa, flore minimo, tripetalo, albo.* M. H. 3. 513. *Morsus ranæ, foliis circinatis, floribus albis.* T. Ac. Reg. Sc. 1705. T. 4. F. 1. 512. †. aq.

NYMPHOIDES. T. 153. 67.

Omnia Nymphæa. Flos monopetalus, rotatus. Fructus oblongus, compressus, mollis, unicapsularis.

1. Nymphoides; aquis innatans. T. 153. *Nymphæa, lutea, minor, flore fimbriato.* C. B. P. 194. J. B. 3. 772. *Nymphæa, alba, minor.* Lugd. 1009. †. aq.

NIGELLA. T. 258. 134.

Radix annua.

Folia capillacea.

Calix constat quinque, tenuissimis, ramosissimis, stellatim expansis, foliolis, in plurimis harum.

Flos rosaceus, pentapetalus, vel polypetalus, habens stamina numerosa, brevia, ex commissurâ placentæ & ovarii, interpositis multis corpusculis, flosculum monopetalum, anomalum, bilabiatum, referentibus.

Ovarium in placentulâ hærens, constans ma

PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE. 283

tubâ incurvâ instructis, sit dein fructus membranaceus, subrotundus, vel oblongus, suprâ multicornis, multicapsularis, seminibus multis fœtus. *Malp. An. Pl.* 46. 159. 65. 157.

1. *Nigella*; arvensis; cornuta. *C. B. P.* 145. *M. H.* 3. 515. *Melanthium*, sylvestre, sive arvense. *J. B.* 3. 209. *Melanthium* sylvestre. *Dod. p.* 303. *Melanthium*, arvense. *Clus. H.* ccvii. a.

2. *Nigella*; latifolia; flore majore, simplici, cæruleo. *C. B. P.* 145. *Prodr.* 75. *Melanthium*, Hispanicum, majus. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 12. *Fig.* 1. a.

3. *Nigella*; angustifolia; flore majore, simplici, cæruleo. *C. B. P.* 145. *Melanthium*, capite & folio majore. *J. B.* 3. 207. *Melanthium* Damascenum. *Dod. p.* 304. *Melanthium*, sativum, flore simplici. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 10. *Fig.* 2. *Nigella*, Romana, sativa, floribus foliosis. *Park. M. H.* 3. 516. a.

4. *Melanthium*; flore majore, pleno, cæruleo. *C. B. P.* 145. *Melanthium*, capite vel calice, & flore majore, pleno. *J. B.* 3. 208. *Melanthium*, Damascenum, pleno flore. *Clus. H.* ccvii. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 10. *Fig.* 3. *Nigella*, Romana, flore folioso, pleno, cæruleo. *M. H.* 3. 516. a.

5. *Nigella*; flore minore, simplici, candido. *C. B. P.* 145. *M. H.* 3. 515. *Melanthium*, calice & flore minore, semine nigro & luteo. *J. B.* 3. 208. *Melanthium*. *Dod. p.* 303. *Melanthium*, sativum, simplici flore. *Clus. H.* ccvii. a.

6. *Nigella*; Orientalis; flore flavo; semine alato, plano. *T. Cor.* 19. a.

7. *Nigella*; Cretica. *C. B. P.* 146. *Prodr.* 75. *M. H.* 3. 515. a.

8. *Nigella*; Cretica; latifolia; odorata. *Park. Theatr.* 1376. *M. H.* 3. 515. *Flore* luteo. a.

9. *Nigella*; peregrina; flore multiplici. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 16. *F.* 1. a.

10. *Nigella*; flore minore. a.

GARIDELLA. *T.* 655. *App.* 430.

Radix annua.

Folia capillacea.

Calix polyphyllus.

Flos rosaceus, petalis fornicatis, bifidis, in orbem positus.

Capitulum ex multis capsulis, oblongis, bivalvibus, compositum, fœtum seminibus plerumque rotundis.

1. *Garidella*; foliis tenuissimè d^{ti}

Creti-

284 PLANTAE POLYANGIAE POLYSPERMAE.

ca, folio fœniculi. C. B. P. 146. *Nigellastrum*, raris & fœniculaceis foliis. H. R. Monsp. a.

LINUM. T. 339. 176.

Folia alterna ferè.

Calix monophyllus, tubulatus, quinquefidus.

Flos caryophyllæus, pentapetalus, quinque staminibus donatus.

Ovarium in fundo calicis, teetum membranulâ tenui, oblongum, emittens quinque tubas longas, fit fructus globosus, acuminatus, compositus ex multis capsulis, quinis vel denis scilicet, introrsum dehiscenribus, fietis semine plano, ferè ovato, hinc obtuso, inde acuto. Malp. An. Pl. 48 178. 51. 204. 58. 239. 65. 260.

1. *Linum; arvense. C. B. P. 214. M. H. 2. 573. Linum, sylvestre, sativum planè referens. J. B. 3. 452. a. †.*

2. *Linum; sativum. C. B. P. 214. Dod. p. 533. Linum. J. B. 3. 450. Linum, annuum, cæruleum, sativum. M. H. 2. 572. a.*

3. *Linum; sativum; humilior; flore majore. Bobart. a.*

4. *Linum; sativum; latifolium; Africanum; fructu majore. T. 339. a.*

5. *Linum; perenne; majus; cæruleum; capitulo majore. M. H. 2. 573.*

6. *Linum; perenne; majus; cæruleum; capitulo minore. M. H. 2. 573.*

7. *Linum; maritimum; luteum. C. B. P. 214. M. H. 574. Linum, luteum, Narbonense. J. B. 3. 454. Linum sylvestre. Dod. p. 534. H.*

8. *Linum; Africanum; luteum; foliis conjugatis. Ind. 120. H.*

Add the Linum Catharticum from Sale.



MULTISILIQUEÆ PLANTÆ, CORNICULATÆ, UNIVALVES, POLYSPERMÆ.

His, post unumquemque florum, nascuntur quinæ,
pauciores plures-ve capsulæ oblongæ, siliquæ vel si-
liculæ dictæ, quæ maturæ debiscunt secundum longitudi-
nem fructus, parte aversâ manente concretâ, atque con-
tinent plurima, in singulâ quâque thecarum, semina.

1. Succulentæ omni parte.

SEDUM. T. 262. 140.

Folia alterna, non ordinata.

*Calix monophyllus, multifidus, profundè sectus in tot se-
gmenta, quot flori petala, in quinque ad minimum.*

*Flos pentapetalus, aut polypetalus, rosaceus, habens fere
stamina tot, quot petala.*

*Ovarium situm in fundo calicis, componitur ex multis si-
liculis, æquantibus numerum petalorum floris, singulis dona-
tis unâ tubâ, vaginarum æmulis, apice corniculato, in capi-
tulum orbiculatim congestis, à se invicem non nihil sejunctis,
fætis seminibus plurimis, exiguis.*

1. Sedum; majus; arborescens. J. B. 3. 686. M. H. 3. 470. Sedum,
majus, arborescens, flosculis candidis. C. B. P. 282. Sempervivum, five
sedum, arborescens, majus. Dod. p. 127. Sedum arborescens. H. Eyst.
Aut. o. 3. F. 8. Fig. 1. Sedum, majus, legitimum. Clus. H. LVIII. Se-
dum, majus, arborescens, flosculis citrinis, multiflorum. Plukn. Alm.
339. H. R. D.

2. Sedum; majus; arborescens; J. B. Foliis elegantissimè variegatis,
tricoloribus. H.

3. Sedum; Canarinum; foliis omnium maximis. H. A. 2. 189. Se-
dum, majus, Canarinum, ἀκανθον, pilis ad oras foliorum hispidis, ar-
genteo-lucidis, simbriatum. Plukn. Alm. 340. Phytogr. T. 314. Fig. 1.
Sedum, roseum, Canavicum, humilius, foliis inflexis, molli hirsutie pu-
bescentibus, Corozone celio Insulani dictum. M. H. 3. 470. H.

Nn 3

4. Se-

286 MULTISILICULAE PLANTAE, CORNICULATAE,

4. Sedum; Africanum; frutescens; folio longo, serrato, confertim nato. *Ind. 121. Huic flos ruber spicatus. H.*

5. Sedum; Africanum; frutescens; caule pellucido; folio subrotundo. *Ind. 121. H. Hoc palustre, gerit flores albos apiculis petalorum rubris.*

6. Sedum; Afrum; montanum; foliis subrotundis, dentibus albis, serratis, confertim natis. *H.*

7. Sedum; vulgare; maximum. *H. L. M. H. 3. 474.*

8. Sedum; majus; vulgare: *C. B. P. 283. J. B. 3. 687. M. H. 3. 474. Sempervivum, majus, alterum, sive Jovis barba. Dod. p. 127. Sedum vulgare. H. Eyst. Æst. o. 13. F. 5. Fig. 1. Cotyledon, altera, I. Sedum vulgare. Clus. H. LXIII.*

9. Sedum; vulgari magno simile. *J. B. 3. 688. Sedum majus, vulgari simile, globulis decidentibus. M. H. 3. 472. H.*

10. Sedum; montanum; tomentosum. *C. B. P. 284. M. H. 3. 474. Sempervivum, montanum, rubrum, gnaphalodes. Col. 1. 291. H.*

11. Sedum; Alpinum; roscum; minus; viride; & subhirsutum. *H. R. Par. H.*

12. Sedum; echinatum; vel stellatum; flore albo. *J. B. 3. 680. M. H. 3. 473. Sempervivum, III. Col. Phytob. 42. Cotyledon stellata. C. B. P. 285. a.*

13. Sedum; minus; teretifolium; album. *C. B. P. 283. M. H. 3. 472. Sedum, minus, folio longiusculo, tereti, flore candido. J. B. 3. 690. Vermicularis, & illecebra major. Lob. Advers. 161. Obs. 205.*

14. Sedum; minus; lato & crasso caule; Portlandicum Belgarum. *H. R. Par. 166. M. H. 3. 471. Portlandicum Sedum. Lob. Adv. 163. Sedum, monstrosus, minus, vel platycaulum. H. R. Monsp. H.*

15. Sedum; minus; luteum; folio acuto. *C. B. P. 283. M. H. 3. 471. Sedum, minus, flore luteo. J. B. 3. 692. Sedum, minus, V. Clus. H. LX.*

16. Sedum; minus; à rupe Sancti Vincentii. *Raj. Syn. 152. Sedum, minus, luteum, foliis acutis densius stipatis, & caulibus rubescentibus. M. H. 3. 471.*

17. Sedum; minus; teretifolium; alterum. *C. B. P. 283. J. B. 3. 691. M. H. 3. 472. Sedum, minus, alterum. Clus. H. LX.*

18. Sedum; parvum; acre; apicibus albis.

19. Sedum; parvum; acre; flore luteo. *J. B. 3. 694. M. H. 3. 471. Sedum, minus, causticum. H. Eyst. Æst. o. 13. F. 5. Fig. 3. Sedum, minus, VIII. causticum. Clus. H. LXI. Sempervivum, minus, vermiculatum, acre. C. B. P. 283. †.*

20. Sedum; minimum; luteum; non acre. *J. B. 3. 695. M. H. 3. 471. Sedum, minus, sive vermicularis. H. Eyst. Æst. o. 13. F. 5. Fig. 4. Sempervivum, minus, vermiculatum, insipidum. C. B. P. 284. †.*

21. Sedum; minus; circinato folio. *C. B. P. 283. M. H. 3. Sedum, parvum, folio circinato. J. B. 3. 691. Aizoon dasypphyllum 1133. Sedum, minus, VII. Clus. H. LX. H.*

MULTISILIQUAE PLANTAE, CORNICULATAE, 287

22. Sedum; cepæa dictum. *H. L. Copæa. C. B. P. 288. J. B. 3. 679. Cepæa Matthioli. Clus. H. LXVIIII. Sedum, annuum, album, oblongo portulacæ minoris folio. M. H. 3. 473. a.*

23. Sedum; vulgari magno simile; minimum; foliolis acutissimis, confertissimè natis.

24. Sedum; Afrum; saxatile; foliolis Sedi vulgaris, in rosam verè compositis. *H.*

25. Sedum; Alpinum; album; foliolis compactis. *C. B. P. 284. M. H. 3. 473. Sedum Alpinum, minimum, foliis cinereis, flore albo. J. B. 3. 692. Sedum minus, IX, sive Alpinum III. Clus. H. LXI.*

26. Sedum; pyramidale; elegantissimum. *H. Hoc recentissimè allatum, necdum describere queo.*

27. Sedum; alpinum; Coridis folio. *T. 263.*

28. Sedum; hispanum; folio glauco acuto; flore albido.

COTYLEDON. *T. 90. 19.*

Radix, folia, caulis, habitus, Sedi.

Calix multifidus.

Flos monopetalus, quinquesfidus, tubulatus.

Fructus Sedi.

1. Cotyledon; major. *C. B. P. 285. Cotyledon, vera, radice tuberosa. J. B. 3. 683. Cotyledon, umbilicus Veneris. Clus. H. LXIIII. Cotyledon. Dod. p. 131. Sedum, luteum, murale, spicatum, folio umbilicato, rotundo. M. H. 3. 470. †.*

2. Cotyledon; Africana; frutescens; foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis. *T. 90. Sedum, Africanum, frutescens, incanum, foliis orbiculatis. H. L. 349. M. H. 3. 474. Sedum, majus, arborescens, Africanum, alterum, foliis rotundioribus, glaucis, limbo purpureo cinctis. Breyn. Prodr. 1. 47. Sedum, majus, arborescens, Africanum, foliis rotundioribus, glaucis, flore rubente. Breyn. Prodr. 2. 89. H.*

3. Cotyledon; Afra; arborescens; major; foliis glaucis, oblongioribus; flore luteo. *Sedum, majus, arborescens, Africanum, foliis oblongioribus, flore luteo. Breyn. Prodr. 2. 88. Sedum, arborescens, Promontorii Bonæ Spei. Stapel. 335. Breyn. Prodr. 1. 47. Sedum, maximum, arborescens, latifolium, flore flavo, Dn. ten Rhyne. Breyn. Cent. 1. 179. H.*

4. Cotyledon; major; arborescens; Afra; foliis orbiculatis, glaucis, limbo purpureo, & maculis viridibus, ornatis. *H.*

5. Cotyledon; major; arborescens; Afra; foliis minoribus, crassissimis, viridioribus, minutissimè punctatis. *Sedum, Africanum, folio rotundo, minori. Ind. 121. H.*

6. Cotyledon; major; arborescens; Afra; foliis minoribus, oblongis, atro-viridibus. *H.*

7. Cotyledon; Africana; frutescens; folio longo & angusto; flore flavescente. *Commel.*

3. Cæ-

288 MULTISILICUAE PLANTAE, CORNICULATAE,

8. Cotyledon; Africana; frutescens; flore umbellato, coccineo. *Commel. Rar. 24. H. R. D.*

9. Cotyledon; Afra; arborea; crasso caudice; folio auriculæ urfi angustiore. *Flore nondum viso, facies tamen magis Cotyledonem referre videtur, quàm sedum.*

10. Cotyledon; Afra; folio crasso, lato, laciniato, flosculo aureo. *Telephium, maximum, Africanum, flore aurantio. Ex Cod. Bent. Plukn. Phyt. 228. 3? H. R. D.*

ANACAMPSEOS. T. 264. Raj. Hist. 689.

Radix perennis.

Caules, folia, flores, fructus, Sedi, ut & totus habitus.

Folia enascenti non circumfusa in globum, sed statim cauli assurgenti adnata conjugata, vel sine ordine.

1. Anacampseros; folio portulacæ majore; flore ex viridi lutescente. *An Anacampseros, folio portulacæ. T. 264. Telephium, portulacæ folio. M. H. R. Blæs. M. H. 3. 467?*

2. Anacampseros; foliis suprâ magis unitis, rubellis; flore luteo. *Telephium portulacæ folio simile, foliis suprâ magis unitis & ibidem rubris. Ind. 122.*

3. Anacampseros; maritima. *J. B. 3. 682. T. 264. Telephium, latifolium, peregrinum. C. B. P. 287. M. H. 3. 468. Telephium, I. Dod. p. 130. Telephium, I, Hispanicum. Clus. H. LXVI.*

4. Anacampseros; Amboinesis; maxima; foliis undulatis, maximis. *Telephium, Amboinense, maximum. H. Beaum. Ind. 122. H.*

5. Anacampseros; Lusitanica; hæmatodes; maxima; flore albidulo. *T. 264. Telephium, Lusitanicum, hæmatodes, maximum, flore pallido. H. R. Par. Telephium, majus, caule rubro, flore luteo. Ind. 122. Telephium, majus, album, foliis & caulibus purpureis. M. H. 3. 468.*

6. Anacampseros; minor; purpurea. *T. 264. Telephium, purpureum, minus. C. B. P. 287. Prodr. 133. J. B. 3. 682. M. H. 3. 467.*

7. Anacampseros; Lusitanica; hæmatodes; maxima. *T. 264. Telephium, Lusitanicum, hæmatodes, maximum. H. R. Par. Flore pallidi rubello, caule rubro. Ind. 122.*

8. Anacampseros; purpurea. *J. B. 3. 682. T. 264. Telephium, purpureum, majus. C. B. P. 287. M. H. 3. 467. Telephium, V, purpureo flore. Clus. H. LXVII. Telephium, floribus purpureis. Lob. Hist. 473. Rapuntium umbellatum. Col. 2. 22.*

9. Anacampseros; vulgò faba crassa. *J. B. 3. 681. Telephium vulgare. C. B. P. 287. M. H. 3. 467. Telephium, II, vulgare. Clus. H. LXVI. Telephium alterum, sive Crassula. Dod. p. 130. Cotyledon, alterum, Dioscoridis. Col. 1. 305. 306. 307. 308. Ic. & Descr. †.*

10. Ana-



COTYLEDON : *agra* : folio crasso, lato, laciniato ; flosculo aureo.

A. caudex B. folium inferius. C. folia superiora. D. caulis florifer. E. calyx quadrifidus.
F. flos. G. ovarium quadriloculare cum quatuor tubis. H. ovarium transversum seminis foetum.



MULTISILIQUEAE PLANTAE, CORNICULATAE. 289

10. Anacampseros; radice rosam spirante; major. *T.* 264. *Telephium*, radice rosam spirante, majus. *H. L. Rhodia radix. C. B. P.* 286. *J. B.* 3. 683. *Dod. p.* 347. *Clus. H.* LXV. *Telephium*, luteum, minus, radice rosam redolente. *M. H.* 3. 468.

11. Anacampseros; radice rosam spirante; majus; foliis cæsius, minus serratis. *Telephium*, radice rosam spirante, majus, foliis cæsius, minus serratis. *H. L.*

12. Anacampseros; minor; rotundiore folio; sempervirens. *J. B.* 3. 682. *T.* 264. *Telephium*, repens, folio deciduo. *C. B. P.* 287. *Telephium*, VI, cepæa, *Pancii. Clus. H.* LXVII.

FICOIDES. *T. Acad. Reg.* 1705. *T.* 4. *Fig.* 6. *Aizoides. Flor.* 2. 128.

Tota planta succulenta, fabrica Sedi, folia conjugata.

Calix carnosus, pentaphyllus, vel pentaphylloides, ex ambitu supremo ovarii.

Flos polypetalos, minutissime divisus, ex summitate capsulae exorians.

Ovarium emittens quinque tubas reflexas, fit fructus primò succulentus, dein fungosus, divisus in quinos, pluresve loculos, quasi siliculas, plenos seminibus plurimis minutis.

1. Folio triangulari.

1. Ficoïdes; Afra; arborefcens; erecta; folio triangulari, longissimo, confertim nato, purpurafcente; flore luteo, magno. *Aster, aizoides, Capitis Bonæ Spei. Zanon.* 35. *H. R. D.*

2. Ficoïdes; Afra; humilis; folio triangulari, longissimo, viridi; flore aureo ad solem aperto. *Chrysanthemum, aizoides, Africanum, triangulari folio, flore aureo. Breyn. Cent.* 165. *Ficoïdes, seu ficus aizoides, Africana, triangulari folio longissimo, fructu multicapsulari, flore luteo, major. H. L.* 254. *H. R. D.*

3. Ficoïdes; seu ficus aizoides; Africana; major; procumbens; triangulari folio; fructu maximo eduli. *Ficus Hottentottorum vulgò. H. L.* 244. *H. R. D.*

4. Ficoïdes; seu ficus aizoides; Africana; major; procumbens; triangulari folio ensiformi. *H. L.* 247. *H. R. D.*

5. Ficoïdes; Afra; caule lignoso, infirmo; folio triangulari, longiore & tenuiore quàm in duabus præcedentibus; flore violaceo, filamentoso, plurimo. *H.*

6. Ficoïdes; Afra; folio triangulari, longissimo, marginibus obtusioribus; flore amplo, intus pallidè aureo, extus lineâ rubrâ longâ picto. *H.*

7. Ficoïdes; Afra; caule lignoso; erecta; folio triangulari, ensi-

292 MULTISILICUAE PLANTAE, CORNICULATAE.

4. Ficoïdes; Africana; erecta; ramosa; folio tripolii; flore aureo, magno. *T. Ac. Reg. H.*

5. Ficoïdes; Afra; acaulos; foliis latissimis, crassis, lucidis, conjugatis; flore aureo, amplissimo. *T. Ac. Reg. H.*

6. Ficoïdes; Afra; acaulos; foliis latissimis, crassissimis, lucidis, conjugatis; flore aureo, amplo, sine pedunculo. *H.*

7. Ficoïdes; Afra; acaulos; foliis latissimis, crassissimis, lucidis, conjugatis, brevioribus; flore aureo, amplo, pedunculo brevi. *H.*

8. Ficoïdes; Afra; foliis latissimis, crassis, lucidis, cruciatim posit. *H.*

9. Ficoïdes; Afra; foliis latissimis, crassissimis, lucidis, difformibus. *H.*

10. Ficoïdes; Afra; acaulos; foliis aloës, latissimis, crassissimis, lucidis; flore aureo, amplo, sine pedunculo. *H.*

11. Ficoïdes; Afra; frutescens; foliis asperis, longis, angustis, acutis, cruciatim posit. *H.*

12. Ficoïdea; Hispanica; annua; folio longiori. *Vaillant. a.*

Mira succulentæ hujus plantæ caducitas facit, ut maxima pars citò sæpè intereat absque ullâ possibili causæ deprehendendæ manifestatione: inde fit, ut arduum sit bonâ fide allegare synonyma, maxime ob ingentem plurimarum affinitatem solo flore dein distinguendam, qui tamen sæpè non apparet.

CEREUS. Parad. Batav. 122.

Radix vivax, ratione plantæ exigua, fibrillosa.

Habitus aphyllus, spinosus, angulosus, caule recto vel inflexo, continuo vel articulato, angulialarum spinis pluribus uno centro radiatim ortis horrent. Caulis intima lignescente torulo, exteriora carne albâ, fungosâ, membranâ coriaceâ tectâ, constant.

Calix longus, squamosus, ad superiora radiis longissimis ornatus, ex ambitu fastigii ovarii, intra quem

Flos fructui insidens, petalis numerosissimis, infra angustis, supra explicatis fit, pluribus staminibus, & pistillo specioso, ornatus.

Ovarium ex fine pedunculi, facit corpus calicis, instruitur tubâ speciosissimâ, & fit dein fructus ut Opuntia, qui sub membranâ hirtâ lentâ mollem carnem multis seminibus factam habet.

1. Cereus; erectus; altissimus; Syriamensis. *Par. Bat. 1*
nis fuscis. H. R. D.

2. *Cereus*; erectus; altissimus; *Syrinamenfis*. *Par. Bat.* 116. *Spinis albis*. *H. R. D.*

3. *Cereus*; maximus; fructu spinoso, rubro. *Dadus*. *Par. Bat.* 113. *Cereus*, *Curassavicus*, erectus, maximus, fructu rubro, spinoso. *Par. Bat. Prodr. Ficoïdes*, sive ficui affinis, *Americana*, erecta, *Cerei effigie*, maxima, crassissima, spinosa, & angulosa, flore viridi, subluteo, fructu spinoso, rotundo, extus & intus rubro, seminibus minutis, nigris, referto. *Hort. Beaum.* 20. *Plukn. Almag.* 147. *H. R. D.*

4. *Cereus*; erectus; fructu rubro, non spinoso. *Par. Bat.* 114. *Cereus*, *Peruvianus*, spinosus, fructu rubro, nucis magnitudine. *C. B. P.* 485. *Ficoïdes*, seu ficus *Americana*, *Cerei effigie*, spinosa, & angulosa. *H. L.* 256. *Flor.* 1. 137. *Melocactus*, *Americanus*, monoclonos, flore albo, fructu atro-purpureo. *T. App.* 653. *H. R. D.*

5. *Cereus*; erectus; fructu rubro, non spinoso; lanuginosus, lanugine flavescente. *Par. Bat.* 115. *Cereus*, *Curassavicus*, erectus, maximus, fructu rubro, non spinoso. *Par. Bat. Prodr. H. R. D.*

6. *Cereus*; erectus; crassissimus; maximè angulosus; spinis albis, pluribus, longissimis, lanugine flavâ *H. R. D.*

7. *Cereus*; erectus; gracilis; spinosissimus; spinis flavis; polygonus; lanugine albâ pallecente. *Cereus*, erectus, fructu rubro, non spinoso, lanuginosus, lanugine albâ pallecente. *Par. Bat.* 115. *Descr. H. R. D.*

8. *Cereus*; erectus; gracilior; spinosissimus; spinis albis; polygonus. *H. R. D.*

9. *Cereus*; erectus; quadrangulus; costis alarum instar assurgentibus. *Ind.* 181. *Cereus*, erectus, minor, fructu spinoso, costarum numero varians. *Par. Bat.* 117. *Cereus*, erectus, *Curassavicus*, tetragonus, articulatus. *Par. Bat. Prodr. Sed malè. Ficoïdes*, *Americanum*, quadrangulare, vel potius angulorum numero variabile, spinis longissimis armatum, flore subviridi, fructu spinoso, rotundo, seminibus nigris, majoribus, & splendentibus pleno. *H. Beaum. H. R. D.*

10. *Cereus*; scandens; minor; trigonus; articulatus; fructu suavissimo. *Par. Bat.* 118. *Cereus*, *Peruanus*, amplexicaulis, articulatus, fructu rotundo, maximo, coccineo. *Par. Bat. Prodr. Carduus*, spinosissimus, brachiatus, ex *Hispaniolâ*. *C. B. P.* 384. *Ficoïdes*, *Americanum*, seu *Cereus*, cristatus, erectus, foliis triangularibus profundè canaliculatis. *Plukn. Phytogr.* 29. 3. *Pitha* *Haya*. *Nieremb. c.* 80. l. 14. *Hist. Nat. H. R. D.*

11. *Cereus*; scandens; minor; polygonus; articulatus. *Par. Bat.* 120. *Cereus*, *Curassavicus*, amplexicaulis, polygonus, minor, & idem minimus, articulatus, ex *Verâ Cruce*. *Par. Bat. Prodr. An euphorbium*, *Cerei effigie*, caulibus tenuioribus, sulcatis, sensim angustiores in apicem evadentibus, spinis minoribus munitum. *Breyn. Prodr.* 2. *Ficoïdes*, *Americanum*, sive *Cereus*, minima, serpens, *Americana*. *Plukn. Phyt.* 158.

1871-1872.

1871-1872.

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

1871-1872, flaminibus nume

MULTISILIQUEAE PLANTAE, CORNICULATAE. 295

8. *Pæonia*, folio maximè laciniato; flore kermefino simplici. *An Pæonia*, *aquilinae foliis*. C. B. P. 323. M. H. 3. 454. *Pæonia*, IV, *aquilinae foliis*. Clus. 280? *Est Pæonia peregrina*, flore coccineo. H. Eyf. Æst. o. 6. F. 9. F. 1.

9. *Pæonia*; foemina; flore pleno, rubro, majore. C. B. P. 324. M. H. 3. 455. *Pæonia*, flore pleno, rubro. J. B. 3. 493. *Pæonia*, foeminae, multiplex flos. Dod. p. 195. *Pæonia*, polyanthos, flore rubro. H. Eyf. Æst. o. 6. F. 8. F. 1.

10. *Pæonia*; flore pleno, coloris ex rubro & roseo variegati. *Pæonia*, flore variegato. M. H. 3. 455. *An Pæonia*, flore pleno, rubro, minore. C. B. P. 324? *Pæonia*, pleno flore rubro, minor. J. B. 3. 494. Clus. H. 280. *Est Pæonia*, pleno flore rubro, oris albis, minor. Clus. lb. descr. varietat. 281.

11. *Pæonia*, flore exalbido, pleno; major. C. B. P. 324. Clus. H. 280. *Pæonia*, flore pleno, incarnato. H. Eyf. Æst. o. 6. Fol. 7. F. 1. M. H. 3. 455.

12. *Pæonia*; tenuifolia; cæsia; flore pleno, ex petalis latioribus & angustioribus permistis, rubro. *An Pæonia*, flore pleno, purpurascente, papaverino. M. H. 3. 455?

ULMARIA. T. 265. 141.

Folia pinnata, agrimonoidea, triangulata, umbellatarum more divisa.

Apex exigui pedunculi expanditur in calicem monophyllum, quinquesidum, stellatim expansum.

Flores rosacei, pentapetali, in paniculas congesti, vix conspicui, habentes stamina numerosa.

Ovarium in centro calicis natum constat tribus, quatuor, quinque siliculis tubâ instructis; fit fructus, compositus ex multis vaginulis membranaceis, intortis, in capitulum congestis, fœtis semine uno, exiguo.

1. *Ulmaria*. Clus. H. xc xviii. J. B. 3. 488. *Barba caprae*, floribus compactis. C. B. P. 164. *Regina prati*. Dod. p. 57. *Ulmaria vulgaris*. Park. M. H. 3. 323. *Folio ulmi, paniculâ collectâ*. Flor. 2. 9.

2. *Ulmaria*; floribus in longas spicas congestis. *Barba caprae*, floribus oblongis. C. B. P. 163. T. 265. *Barba capri*. J. B. 3. 488. H. Eyf. Æst. o. 9. F. 6. Fig. 2. *Ulmaria*, major, sive altera. Park. M. H. 3. 323. *Folio fraxini, paniculâ sparsâ*. Flor. 2. 9.

194 MULTISILICUAE PLANTAE, CORNICULATAE.

6. *Cereus*, *serpens*, ἐλαιοφύγας, *Cahajaba*, & *Mippi*. *Plukn. Mantiss.* 76. *Clus. Exot.* 86. *H. R. D.*

12. *Cereus*; *minimus*; *articulatus*; *polygonus*; *spinofus*. *H. R. D.*

13. *Cereus*; *erectus*; *polygonus*; *spinofus*; *per intervalla compressus* quasi in articulos. *H. R. D.*

Multisilicuae, foliis minus succulentis, sunt flore uniformi, vel difformi.

Flore uniformi.

PAONIA. T. 273. 146.

Ortus ex semine ut Monocotyledonum.

Radix tuberosa, crassa.

Calix polyphyllus.

Flos roseus, maximus, polypetalus, staminibus numerosissimis.

Fructus constat plurimis, numero incertis, siliquis cornutis, deorsum incurvis, lanugine pubescentibus, debiscentibus juxta longitudinem.

Semina ferè globosa, continentia intus parvum nucleum. *Malp. An. Pl.* 46. 161. 50. 196.

1. *Paonia*; *mas*. *Dod. p.* 194. *Paonia mas, praecocior.* *J. B.* 3. 492. *Paonia*, folio nigricante, splendido, quae *mas*. *C. B. P.* 323. *Paonia mas*, flore purpureo. *H. Eyst. Aest.* o. 6. F. 10. *Paonia simplex*, latiore folio trifido. *M. H.* 3. 454.

2. *Paonia*; *communis*; vel *foemina*. *C. B. P.* 323. *M. H.* 3. 454. *Paonia foemina*, vulgatior. *J. B.* 3. 429. *Paonia foemina*, altera. *Dod. p.* 195. *Paonia*, rubra, flore simplici. *H. Eyst. Aest.* o. 6. F. 15.

3. *Paonia*; *foemina*; altera. *C. B. P.* 323. *M. H.* 3. 455. *Paonia promiscua*, folio strictiore. *J. B.* 3. 493. *Paonia foemina*, prior. *Dod. p.* 194.

4. *Paonia*; *peregrina*; flore saturatè rubente. *C. B. P.* 324. *M. H.* 3. 455. *Paonia Byzantina* I. *Clus. H.* 279. *Paonia Byzantina*, major. *H. Eyst. Aest.* 6. o. F. 14. F. 1.

5. *Paonia*; *peregrina*; flore saturatè rubente; maxima.

6. *Paonia*; folio subtus incano; flore albo, vel pallido. *C. B. P.* 323. *M. H.* 3. 454. *Paonia mas*, flore albo. *H. Eyst. Aest.* o. 6. F. 13. F. 1.

7. *Paonia*; tenuius laciniata; subtus pubescens; flore purpureo. *C. B. P.* 323. *M. H.* 3. 455. *Paonia pumili.* *H. Eyst. Aest.* o. 6. F. 14. F. 3.

8. *Pro-*

MULTISILIQUEAE PLANTAE, CORNICULATAE. 295

8. *Pæonia*; folio maximè laciniato; flore kermefino simplici. *An Pæonia*, *aquilinae foliis*. C. B. P. 323. M. H. 3. 454. *Pæonia*, IV, *aquilinae foliis*. Clus. 280? *Est Pæonia peregrina*, flore coccineo. H. Eyf. Æst. o. 6. F. 9. F. 1.

9. *Pæonia*; foemina; flore pleno, rubro, majore. C. B. P. 324. M. H. 3. 455. *Pæonia*, flore pleno, rubro. J. B. 3. 493. *Pæoniae*, foeminae, multiplex flos. Dod. p. 195. *Pæonia*, polyanthos, flore rubro. H. Eyf. Æst. o. 6. F. 8. F. 1.

10. *Pæonia*; flore pleno, coloris ex rubro & rosco variegati. *Pæonia*, flore variegato. M. H. 3. 455. *An Pæonia*, flore pleno, rubro, minore. C. B. P. 324? *Pæonia*, pleno flore rubro, minor. J. B. 3. 494. Clus. H. 280. *Est Pæonia*, pleno flore rubro, oris albis, minor. Clus. Ib. descr. varietat. 281.

11. *Pæonia*; flore exalbido, pleno, major. C. B. P. 324. Clus. H. 280. *Pæonia*, flore pleno, incarnato. H. Eyf. Æst. o. 6. Fol. 7. F. 1. M. H. 3. 455.

12. *Pæonia*; tenuifolia; caesia; flore pleno, ex petalis latioribus & angustioribus permistis, rubro. *An Pæonia*, flore pleno, purpurascente, papaverino. M. H. 3. 455?

ULMARIA. T. 265. 141.

Folia pinnata, agrimonoides, triangulata, umbellatarum more divisa.

Apex exigui pedunculi expanditur in calicem monophyllum, quinquesidum, stellatim expansum.

Flores rosacei, pentapetali, in paniculas congesti, vix conspicui, habentes stamina numerosa.

Ovarium in centro calicis natum constat tribus, quatuor, quinque siliculis tubâ instructis; fit fructus, compositus ex multis vaginulis membranaceis, intortis, in capitulum congestis, fœtis semine uno, exiguo.

1. *Ulmaria*. Clus. H. xcvi. J. B. 3. 488. *Barba caprae*, floribus compactis. C. B. P. 164. *Regina prati*. Dod. p. 57. *Ulmaria vulgaris*. Park. M. H. 3. 323. *Folio ulmi, paniculâ collectâ*. Flor. 2. 9.

2. *Ulmaria*; floribus in longas spicas congestis. *Barba caprae*, floribus oblongis. C. B. P. 163. T. 265. *Barba capri*. J. B. 3. 488. H. Eyf. Æst. o. 9. F. 6. Fig. 2. *Ulmaria*, major, sive altera. Park. M. H. 3. 323. *Folio fraxini, paniculâ sparsâ*. Flor. 2. 9.

196 MULTISILIQUEAE PLANTAE, CORNICULATAE,

VERATRUM. T. 272. 145.

Folia nervosa, in plicas quasi composita.

Flos rosaceus, hexapetalus, nudus, sex staminibus fœtus, in spicam congestus.

Ovarium innatum placentula, constans tribus siliculis singulis instructis suâ tubâ, fit fructus constans tribus vaginis, in capitulum collectis, fœtis seminibus oblongis, grani tritici æmulis, marginatis, alâ foliaceâ cinctis.

1. Veratrum; flore subviridi. T. 272. Helleborus, albus, flore subviridi. C.B.P. 186. M.H. 3. 485. Helleborus, albus, flore herbaceo H. Eyst. Æst. o. 8. F. 9. Fig. 1. Helleborus, albus, flore ex viridi albescente. J.B. 3. 634. Helleborum, sive Veratrum, album. Dod. p. 383.

2. Veratrum; flore atro-rubente. T. 272. Helleborus, albus, flore atro-rubente. C.B.P. 186. M.H. 3. 485. Helleborus, albus, flore atro-rubescente. H. Eyst. Æst. o. 8. F. 9. Fig. 2. Helleborum, album, flore nigro. J.B. 3. 634.

HELLEBORUS. T. 271. 144.

Folia digitata.

Calix, quinquefolius, vel multifolius, floralis.

Flos rosaceus, petalis parvis tubulosis quinque, vel decem, vel quindecim, fistularum æmulis, constans, ut assimiletur multis, cavis, tubulatis, corniculis, dein staminibus ornatus, numerosis valdè, in medio autem

Ovarium natum ex apice pedunculi, constat binis, ternis, quaternis, pluribus, erectis siliquis, tubâ longâ instructis, fit fructus constans vaginis membranaceis, in cornua desinentibus, juxta longitudinem dehiscentibus, fœtis seminibus subrotundis, vel ovatis.

1. Helleborus; niger; foetidus. C.B.P. 185. Helleborus, niger, sylvestris, adulterinus, etiam hyeme virens. J.B. 3. 880. App. Veratrum, nigrum, III. Dod. p. 386. Helleboraster maximus. H. Eyst. Hyem. o. 1. F. 3. Fig. 1. Helleborus, niger, ramosus, angustifolius, sempervirens, elatior. M.H. 3. 359. b.

2. Helleborus; niger; hortensis; flore viridi. C.B.P. 185. Helleborus, niger, vulgaris, flore viridi vel herbaceo, radice diuturnâ. J.B. 3. 636. Veratrum, nigrum, II. Dod. p. 385. Helleborus, niger, flore viridi. H. Eyst. Hyem. o. 1. F. 2. Fig. 1. Helleborus, niger, ramosus, sylvestris, latiore folio deciduo. M.H. 3. 359.

3. Hel-

MULTISILIQUAE PLANTAE, CORNICULATAE. 297

3. Helleborus; niger; flore roseo. *C. B. P.* 186. *M. H.* 3. 359. *Helleborus*, niger, flore albo, etiam interdum valde rubente. *J. B.* 3. 634. *Veratrum*, nigrum, *I. Dod.* p. 385. *Helleborus*, niger; legitimus. *H. Eyst.* *Hyem. o. 1. F. 1. Fig. 1.*

4. Helleborus; niger; flore roseo; minor; Belgicus. *M. H. R. Blas.* *H. L. M. H.* 3. 359.

5. Helleborus; niger; trifolius. *Ald. Hort. Parnes.* 92. *M. H.* 3. 360. *H.*

HELLEBOROIDES.

Folio Aconiti.

Finis pedunculi fit foliolum, in novem radios stellatim expansos divisum, specie calicis.

Calix floralis, sex foliis quasi flosculosis constans.

Flos in medio folii centro, constat sex parvis petalis, bifidis, cum staminibus multis.

Cætera Hellebori.

1. Helleboroides; hyemalis. *Helleborus*, ranunculoïdes, hyemalis, radice tuberosâ, flore in medio folii. *H. L.* 309. *Helleborus*, niger, tuberosus, ranunculi folio, flore luteo. *T.* 272. *Helleborus*, ranunculoïdes, præcox, tuberosus, flore luteo. *M. H.* 3. 359. *Aconitum*, unifolium, luteum, bulbosum. *C. B. P.* 183. *Ranunculus*, cum flore in medio folio, radice tuberosâ. *J. B.* 3. 414. *Aconitum*, luteum, minus. *Dod.* p. 440. *Aconitum* hyemale. *H. Eyst. Hyem. o. 1. F. 5. Fig. 2.*

HELLEBORO-RANUNCULUS.

Folia singularia, circumscriptione rotunda, ranunculoïdea.

Calix pentaphyllus, foliolis colore floris.

Flos pentapetalus, rosaceus, multis staminibus præditus.

Fructus constat multis vaginulis parvis, tubâ suâ instructis, in caput ranunculi quasi congestis.

1. Helleboro-Ranunculus; flore luteo globofo. *Helleborus*, ranunculoïdes, flore globofo. *H. L.* 309. *Helleborus*, niger, ranunculi folio, flore globofo, majore. *T.* 272. *Pseudo-Helleborus*, ranunculoïdes, luteus, flore globofo. *M. H.* 3. 461. *Ranunculus*, aconiti folio, flore globofo. *C. B. P.* 182. *Ranunculus*, flore globofo, quibusdam flos Trollius. *J. B.* 3. 419. *Ranunculus*, flore globofo. *Dod.* p. 430. *H. Eyst. Vern. o. 1. F. 12. Fig. 2.*

298 MULTISILIQUAE PLANTAE, CORNICULATAE.

POPULAGO. T. 273. 145.

Radix vivax.

Folia integra, subrotunda.

Flos rosaceus, ranunculoides, nudus.

Fructus ex multis vaginulis, deorsum inflexis, stellatis, fœtis seminibus multis, oblongis.

1. Populago; flore majore. T. 273. Caltha, palustris, flore simplici. C. B. P. 276. H. Eyst. Hyem. F. 4. F. 2. Caltha palustris. J. B. 3. 470. Dod. p. 598. Caltha, palustris, vulgaris. Clus. H. cxiv. Pseudo-Helleborus ranunculoides, pratensis, rotundifolius, simplex. M. H. 3. 461. †.
2. Populago; flore pleno. T. 273. Caltha, palustris, flore pleno. C. B. P. 276. Clus. H. cxiv. Caltha, palustris, flore multiplicato. J. B. 3. 470. Caltha, palustris, flore multiplici. H. Eyst. Vern. o. 7. F. 5. Fig. 1. Pseudo-Helleborus ranunculoides, pratensis, rotundifolius, multiplex. M. H. 3. 461.

TRIBULUS. T. 265. 141.

Radix annua.

Folia Lenticulae vel Ciceris.

Flos rosaceus, pentapetalus.

Fructus cruciformis, vel turbinatus, ex multis particulis muricatis in capitulum collectis compositus, in singulis horum semina oblonga in loculis hærent.

1. Tribulus; terrestris; folio ciceris; fructu aculeato. C. B. P. 350. Tribulus, terrestris, ciceris folio, seminum integumento aculeato. M. H. 2. 102. Tribulus terrestris. J. B. 2. 352. Dod. p. 557. Clus. H. ccxli. a.

BUTOMUS. T. 271. 143.

Radix vivax.

Folia graminea, triangula.

Caules nudi, in summo umbellati, in viginti, plures-ve pedunculos floriferos.

Calix triphyllus, major, umbellam totam proximè succingens, dein parvus caliculus, alius, gracilis, sub quolibet flosculo.

Flos rosaceus, hexapetalus, petalis tribus majoribus & minoribus tribus constans, staminibus novem fœtus.

Fru-

MULTISILIQUEAE PLANTAE, CORNICULATAE. 299

Fructus membranaceus, vaginulis cornutis, seminibus plurimis fœtis, coalescens.

1. Butomus; flore roseo. T. 271. Butomus. Cæalp. 553. Juncus, floridus, major. C. B. P. 12. Juncus floridus. J. B. 2. 524. Gladiolus aquatilis. Dod. p. 601. Juncus, cyperoides, paludosus. H. Eyst. Vern. o. 9. F. 4. Fig. 4. Sedo affinis, juncoides, umbellata, palustris. M. H. 3. 468. †. aq.

2. Butomus; flore albo. T. 271. Juncus, floridus, major, flore albo. H. R. Par. †. aq.

3. Butomus; flore saturatè purpureo. †. aq.

Multisiliquæ, minus succulentæ, flore difformi.

FRAXINELLA. T. 430. 243.

Radix vivax.

Folia pinnata, Fraxini similia.

Calix monophyllus, in quinque segmenta longa, gracilia, divisus.

Flos pentapetalus, anomalus, quatuor sursum, uno deorsum, porrectis, ut bilabiatus flos appareat, multis staminibus recurvis præditus, octo scilicet, novem, vel decem.

Fructus constans ex multis vaginulis instar cornu arietis incurvis, bifariam dehiscentibus dissiliendo, & ejaculantibus semina magna, nigra. Malp. An. Pl. 52. 213.

1. Fraxinella. Clus. H. 99. Dod. p. 348. H. Eyst. Vern. o. 9. F. 5. Fig. 1. M. H. 3. 456. Dictamnus albus vulgò, sive Fraxinella. C. B. P. 222. Fraxinella, officinis dictamnus. J. B. 3. 494. Malp. An. Pl. 47. 168.

2. Fraxinella; niveo flore. Clus. H. 100.

3. Fraxinella; purpurea; major; multiflora. H. R. Par.

MELIANTHUS. T. 430. 245.

Radix vivax.

Habitus arboreus.

Folio Pimpinellæ sanguisorbæ.

Calix multifidus.

Flos tetrapetalus, anomalus, petalis aliis strobillum, aliis conum, æmulantibus.

300 MULTISILICUAE PLANTAE, CORNICULATAE.

Fructus tetragonus, vesicarius, quadrilocularis, fetus seminibus subrotundis.

1. Melianthus; Africanus. H. L. 414. Melianthus Africanus, pimpinellae foliis amplissimis, glaucis. M. H. 3. 517. Pimpinella, spicata, maxima, Africana. Barthol. Aët. Hafn. T. 2. 58. H.
2. Melianthus; Africanus; minor; foetidus. Commelin. Rar. 4. Melianthus, Africanus, minor, foliis viridantibus. M. H. 3. 518. H.

ACONITUM. T. 424. 239. 240.

Radix vivax.

Finis pedunculo sursum crassescens format placentam.

Flos innatus placentæ est tetrapetalus. Superius petalum est galea cava, duo lateralia ferè orbicularia, cava utcumque, infimum quartum, cavum, propendens; ex parte superiori placentæ, juxta ovarium, enascuntur duo tubi, longi, incurvi, superius formati in caput delphini, intra galeam follicitè reconditi; stamina tam multa, ut concrecant in membranulam sericeam.

Ovarium ex apice placentæ enatum, assurgens intra hæc, constat siliculis ferè tribus, collectis in capitulum, singulis instructis tubâ incurvâ.

Folia laciniata, circumscriptione ferè rotunda.

1. Aconitum; lycoctonum; luteum. C. B. P. 183. M. H. 3. 462. Aconitum, lycoctonum, flore luteo. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 11. Fig. 2. Aconitum, folio platani, flore luteo-pallescente. J. B. 3. 652. Aconitum, lycoctonum, luteum, majus. Dod. p. 439. Aconitum, lycoctonum, vulgare, flore luteo. Clus. H. xciv.
2. Aconitum; luteum; majus; ampliore caule; amplioribusque foliis. Dod. p. 439. M. H. 3. 463.
3. Aconitum; lycoctonum; humilius; foliis tenuiter laciniatis; flore saturatè luteo, valde hirsuto. Aconitum, quartum, Matthioli. 764. Aconitum luteum, Pyrenaicum, foliorum segmentis sibi invicem incumben-
tibus. H. R. Par. M. H. 3. 463.
4. Aconitum; salutiferum; five anthora. C. B. P. 184. Aconitum salutiferum, luteum, tenuifolium, five anthora. M. H. 3. 463. Antithora, flore luteo Aconiti. J. B. 3. 660. Anthora. Dod. p. 443. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 12. Fig. 1. Anthora vulgaris. Clus. H. xcvi.
5. Aconitum; caruleum; five napellus I. C. B. P. 183. M. H. 3. 463. Aconitum, magnum, purpureo flore, vulgè napellus. J. B. 3. 655. Napellus. Dod. p. 442. Napellus arborecens. H. Eyst. Æst. o. 1. F. 12. Fig. 2.
6. Aco-

MULTISILIQUAE PLANTAE, CORNICULATAE. 301

6. Aconitum; cæruleo-purpureum; flore maximo; five napellus IV. C. B. P. 183. M. H. 3. 463. *Aconitum, lycoctonum, flore maximo.* J. B. 3. 659. *Aconitum, lycoctonum, IX, Judenbergense. Claf. H. xcvi i.*

7. Aconitum; cæruleum; minus; five napellus minor. C. B. P. 183. M. H. 3. 463. *Aconitum, lycoctonum, X, thora Italica. Cluf. H. xcvi i i.* *Lycoctonum, cæruleum, parvum. Dod. p. 441.*

8. Aconitum; seu napellus I; flore ex cæruleo & albo variegato. C. B. P. 183. *Var. Napellus, flore variegato. H. Eyst. Æst. o. i. F. 12. Fig. 3. M. H. 3. 464.*

9. Aconitum; lycoctonum; Orientale; flore magno, albo. T. Cor. 30. 1.

DELPHINIUM. T. 426. 241.

Folia laciniata.

Finis pedunculi iterum crassescens format placentam, cui innascitur flos pentapetalus, valde singularis fabricæ: nam petala quatuor inferiora ferè orbicularia sunt, quintum verò erectum quinque habet partes, galeam erectam, bifidam, cujus dorso incumbit aliud quasi petalon, binas alas, & calcar retrò flexum, cavum, reconditum intrâ vaginulam similem caliciformem: stamina tam numerosa, ut in parte inferiore concrecant in membranulam sericeam. Malp. An. Pl. 43. 143.

Ovarium placentæ innatum fit vaginulis longis, in capitulum unum collectis, singulis earum instructis suâ tubâ apice albo donatâ, dehiscenribus per maturitatem, & repletis seminibus angulosis.

1. Delphinium; perenne; montanum; villosum; aconiti folio. T. 426. *Aconitum, cæruleum, hirsutum, flore consolidæ regalis. C. B. P. 183. M. H. 3. 464. Folio latiore. Aconitum, lycoctonum, cæruleum, calcari magno. J. B. 3. 657. Aconitum, lycoctonum, flore Delphinii, I Silestacum. Cluf. H. xciv. Aconitum, lycoctonum, flore Delphinii. H. Eyst. Æst. o. i. F. 11. Fig. 1. Lycoctonum, flore Delphinii. Dod. p. 441.*

2. Delphinium; platani folio; staphisagria dictum. T. 428. *Staphisagria. Matth. 1231. J. B. 3. 641. C. B. P. 324. Dod. p. 366. M. H. 3. 465. b.*

3. Delphinium; latifolium; parvo flore. T. 426. *Consolida, regalis, latifolia, parvo flore. C. B. P. 142. Prodr. 74. M. H. 3. 466. Consolida, regalis, peregrina, parvo flore. J. B. 3. 212.*

302 MULTISILIQUAE PLANTAE, CORNICULATAE.

Foliis angustioribus, feré capillaceis, radice annuâ.

4. Delphinium; segetum; flore cæruleo. *T.* 426. *Consolida*, *regalis*, *arvensis*, flore cæruleo. *C. B. P.* 142. *Consolida*, *regalis*, flore minore. *J. B.* 3. 210. *Delphinium* *vulgare*. *Clus. H.* ccv. *Flos regius*, *sylvestris*. *Dod.* p. 252. *Consolida*, *regalis*, flore cæruleo, minore. *Camer. a.*

5. Delphinium; segetum; flore violaceo. *T.* 426. *Consolida*, *regalis*, *arvensis*, flore simplici, violaceo. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 11. *Fig.* 1. a.

6. Delphinium; segetum; flore rubro. *a.*

7. Delphinium; arvense; flore versicolore. *Clus. H. App.* 2. *Consolida*, *regalis*, *arvensis*, flore variegato. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 13. *Fig.* 1. a.

8. Delphinium; segetum; flore albo. *T.* 426. *a.*

9. Delphinium; vulgare; flore multiplici. *T.* 426. *Consolida*, *regalis*, *vulgaris*, flore multiplici. *C. B. P.* 142. *Consolida*, *arvensis*, flore rubro pleno. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 14. *Fig.* 1. a.

10. Delphinium; hortense; flore majore, simplici, ex cæruleo, purpureo. *T.* 427. *Consolida*, *regalis*, *hortensis*, flore majore, simplici, cæruleo. *C. B. P.* 142. *Flos regius*. *Dod.* p. 252. *Delphinium*, *elatus*, flore cæruleo. *Clus. H.* ccvi. *a.*

11. Delphinium; hortense; flore majore, simplici, rubro. *T.* 427. *Consolida*, *regalis*, simplici flore, rubro. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 12. *Fig.* 1. a.

12. Delphinium; hortense; flore majore, & multiplici, cæruleo. *T.* 427. *Consolida*, *regalis*, flore majore, & multiplici, cæruleo. *C. B. P.* 142. *Delphinium*, *elatus*, pleno flore, cæruleo. *Clus. H.* ccvi. *Consolida*, *regalis*, flore pleno, cæruleo. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 14. *Fig.* 2. a.

13. Delphinium; hortense; flore majore, & multiplici, incarnato. *T.* 427. *Consolida*, *regalis*, multiplici, incarnato, flore. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 11. *Fig.* 2. a.

14. Delphinium; hortense; flore majore, & multiplici, violaceo. *Consolida*, *regalis*, multiplicato, violaceo, flore. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 11. *Fig.* 3. a.

15. Delphinium; hortense; flore majore, & multiplici, rubro. *T.* 427. *Consolida*, *regalis*, flore pleno, rubro. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 12. *Fig.* 2. a.

16. Delphinium; hortense; flore majore, & multiplici, albo. *T.* 427. *Consolida*, *regalis*, flore pleno, albo. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 12. *Fig.* 3. a.

17. Delphinium; hortense; flore majore, & multiplici, argenteo. *T.* 427. *Consolida*, *regalis*, multiplici flore, argenteo. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 13. *Fig.* 2. a.

18. Delphinium; hortense; flore majore, multiplici, cinereo. *Consolida*, *regalis*, flore multiplici, cinericeo. *H. Eyst. Æst.* o. 2. *F.* 13. *Fig.* 3. a.

19. Del-

MULTISILIQUEAE PLANTAE, CORNICULATAE. 303

19. Delphinium; hortense; flore majore, & multiplici, purpureo. T. 427. *Consolida*, regalis, flore pleno, purpureo. H. Eyst. Æst. o. 2. F. 14. Fig. 3. a.

AQUILEGIA. T. 428. 242.

Radix vivax.

Folia glauca, Thalicthro quàm simillima.

Calix quinquesfolius, magnus, colore plerumque florali conspicuus.

Ex imo ambitu ovarii adnascuntur in orbem petala cornu copiae referentia, bina saepe, imposito quandoque sibi invicem innexa, & parte infimâ oris expansi concreta, intra hæc petala stamina valde numerosa, circumnata ovario. Sic in simplicibus; in altis aliter.

Ovarium, involutum tenuissimâ membranulâ elegantissimè fimbriatâ, nascitur ex centro imi calicis, constat multis siliquis, instructis singulis unâ tubâ longâ, apice acuto præditâ, inde fit fructus, constans vaginulis membranaceis, in capitulum collectis, fœtis seminibus ovatis, planisque. Malp. An. Pl. 51. 204.

1. *Aquilegia*; stellata; colore ex rubro ferrugineo; major. *Aquilegia*, flore roseo multiplici. C. B. P. 145. M. H. 3. 458. *Aquilina*, pleno roseo flore. Clus. H. ccv. *Aquileja*, flore rubro. H. Eyst. Æst. o. 2. F. 6. F. 2.
2. *Aquilegia*; stellatâ; flore violaceo. H. Eyst. Æst. o. 2. F. 7. Fig. 1.
3. *Aquilegia*; flore cæruleo, pleno. H. Eyst. Æst. o. 2. F. 8. Fig. 3. *Aquilegia*, hortensis, multiplex, flore magno, cæruleo. C. B. P. 144. *Aquilegia*, flore pleno, sive multiplici. J. B. 3. 485. *Aquileja*, multiplici flore. Dod. p. 181. *Aquilina*, pleno flore. Clus. H. cciv.
4. *Aquilegia*; flore albo, pleno. H. Eyst. Æst. o. 2. F. 8. F. 2.
5. *Aquilegia*; flore pleno, incarnato. H. Eyst. Æst. o. 2. F. 7. Fig. 3.
6. *Aquilegia*; hortensis; multiplex; flore magno, violaceo. C. B. P. 144.
7. *Aquilegia*; hortensis; multiplex; flore parvo, pullo. C. B. P. 144.
8. *Aquilegia*; flore pleno, purpureo. H. Eyst. Æst. o. 2. F. 7. Fig. 2.
9. *Aquilegia*; hortensis; multiplex; flore dilutè rubello.
10. *Aquilegia*; stellata; rubescens. H. Eyst. Æst. o. 2. F. 6. Fig. 3.
11. *Aquilegia*; hortensis; multiplex; flore magno, variegato. C. B. P. 144. *Aquilegia variegata*. H. Eyst. Æst. o. 2. F. 6. Fig. 1.

12. *Aqui-*

12. *Aquilegia*; hortensis; multiplex; flore partim stellato, partim aquilino, pullo. *Aquilegia*, flore rubro. *H. Eyst. Æst. o. 2. F. 6. Fig. 2.*
 13. *Aquilegia*; stellata; flore purpureo. *H. Eyst. Æst. o. 2. F. 7. Fig. 2.*
 14. *Aquilegia*; Canadensis; præcox; procerior. *H. R. P. Hec biennis. H.*
 15. *Aquilegia*; pumila; præcox; Canadensis. *Corn. 60. Hec biennis. H.*
 16. *Aquilegia*; montana; magno flore; quæ prima in Prodr. *C. B. P. 144. Prodr. 75. Hec biennis.*
 17. *Aquilegia*; cærulea; inverso flore. *H. Eyst. Æst. o. 2. F. 9. F. 1.*

P L A N T Æ S I L I Q U O S Æ.

Quæ post unumquemque florem gerunt pro fructu vas in longum porrectum, membranaceum, quod intus continet semen, vel semina, vario quidem modo se habentia in diversis.

Hæ quidem omnes digeri queunt in tres ordines, ita ut illæ primo accenseantur, quarum quidem siliqua unica polysperma fit; dum interim, nec valvarum, nec loculorum, numerum tenet, florisque fabrica mirè simul in multis variat. Secundo ordini inseruntur siliquam gerentes, vel siliculam, post florem semper tetrapetalum. Tertius verò complectetur Siliquosas papilionis formam exprimente flore superbientes.

PLANTÆ SILIQUOSÆ, POLYSPERMÆ, FLORE VARIO.

1. Tetrapetalæ.

1.

CHELIDONIUM. T. 231. 116.

*Calix bifolius, caducus.**Flos tetrapetalus, cruciformis, caducus, ex ambitu basios ovarii, unde 6 stamina multa.**Ovarium, tubā instructum, fit siliqua unicapsularis, bivalvis, valvis fenestræ adherentibus, fæta seminibus multis, rotundulis.**Abundans in omni parte succus acer, aureus.*

1. Chelidonium; majus; vulgare. C. B. P. 144. M. H. 2. 257. Clus. H. CCIII. Chelidonia. J. B. 3. 482. Chelidonium majus. Dod. p. 48. †.

2. Chelidonium; majus; foliis quernis; flore laciniato. M. H. 2. 257. Chelidonium, majus, foliis quernis. C. B. P. 144. Chelidonium, folio laciniato. J. B. 3. 483. Chelidonium, majus, laciniato flore Clus. H. CCIII.

3. Chelidonium; majus; foliis & flore minutissimè laciniatis. H. R. Par. 49. Chelidonium, majus, foliis tenuissimè dissectis, fumariæ Myconi instar. M. H. 2. 258. Othonna Dioscoridis, quibusdam appellata Chelidonia Indica. Zanon. 154.

4. Chelidonium; maximum; Canadense; ἀκνυλον. Corn. 212. M. H. 2. 257. Ic. Tab. 11. Sect. 3. N. 1. Ranunculus, virgineus, albus. Parkinsons Theatr. p. 326. H. Huic flos polypetalus observatur 6 albus.

5. Chelidonium; majus; vulgare. C. B. P. 144. Folio magis dissecto. †.

2.

GLAUCIUM. T. 254. 130.

*Finis pedunculi explicatur in placentulam orbicularem, cavo orbiculo exceptam, cui adnascitur**Calix bifolius, caducus, 6**Flos tetrapetalus, rosaceus, papaverinus, staminibus numerosissimis, maximè caducis post florem apertum, fætus.**Ex fundo placentulæ ovarium, apice bifido, hirsuto instructum, per maturitatem fit siliqua longa, teres, bivalvis, valvis septo medio hærentibus ita, ut unicapsularis maneat theca, fæta seminibus subrotundis.*

1. Glaucium; flore luteo. T. 254. Papaver, corniculatum, luteum,

Qq

κίρα-

κεράτις Dioscoridi & Theophrasto, sylvestre, ceratites Plinio. C. B. P. 171. M. H. 2. 273. Papaver, corniculatum, luteum. J. B. 3. 398. H. Eyst. Æst. o. 12. F. 6. Fig. 1. Papaver, corniculatum, majus. Dod. p. 448. Papaver, corniculatum, flavo flore. Clus. H. xci. a.

2. Glaucium; hirsutum; flore phœniceo. T. 254. Papaver, corniculatum, phœniceum, hirsutum. C. B. P. 171. J. B. 3. 399. M. H. 2. 273. Papaver, corniculatum, rubrum. Dod. p. 449. Papaver, cornutum, flore phœniceo. Clus. H. xci. a.

3. Glaucium; glabrum; flore phœniceo. T. 254. Papaver, corniculatum, phœniceum, glabrum. C. B. P. 171. Papaver, corniculatum, phœniceum, pallescente flore. Clus. H. xci. a.

4. Glaucium; flore violaceo. T. 254. Papaver, corniculatum, violaceum. C. B. P. 172. J. B. 3. 399. Dod. p. 449. Clus. H. xci. a. Papaver, cornutum, flore violaceo. M. H. 2. 274 a.

Clarissimus Herman in Appendice ad Floram pag. 221. Glaucia non modò bivalvia, sed & bicapsularia censens, novum ex speciebus illius constitutum putat genus. Interim adeò huic convenit generi cum Chelidonio, ut separari, nisi vi illatâ, renuant. Vid. Raj. Meth. 10.

3.

SINAPISTRUM. T. 231. 116.

Folia in eodem pedunculo terna, quina-ve, digitata.

Finis pedunculi in placentulam crassefcit, unde caliculus constans quatuor parvis foliis colore flosculi.

Flos tetrapetalus, petalis quatuor sursum erectis, staminibus sex inferiorem partem floris vacuum occupantibus.

Ovarium ex inferiore parte placentulae enatum, antrorsum porrigitur, tribus sphaeris balsamicis ad superiora placentae positae, fit siliqua cylindracea, bivalvis, unicapsularis, foeta seminibus multis, rotundulis, unâ tantum serie positae.

1. Sinapistrum; Orientale; triphyllum; ornithopodii siliquis. T. Cor. 17. a.

2. Sinapistrum; Indicum; pentaphyllum; flore carneo; minus; non spinosum. H. L. Pentaphyllum, peregrinum, siliquosum, bivalve, minus. M. H. 2. 288. Quinquesolium, lupini folio. C. B. P. 326. Quinquesolium siliquosum. Alpin. Exot. 322. a.

3. Sinapistrum; Lusitanicum; triphyllum; flore rubro; siliquis corniculatis. H. L. Trifolium, Lusitanicum, bivalve, flore rubro. M. H. 2. 289. Trifolium, Lusitanicum, corniculatum, flore rubro. Park. Theatr. 1103. & 1687. a.

4. Sinapistrum; Indicum; triphyllum, siliquâ maximâ; flore albo. a.

4.

HYPECOUM. T. 230. 115.

Folia tenuiter secta instar Fumariæ tenuifoliæ.

Calix quadrifolius, binis foliolis parvis herbaceis, binis majoribus floralibus, confectus, caducus.

Flores dipetali, petalis bifidis ita, ut flos appareat tetrapetalus, ex utrâque divisurâ petalorum alterum quasi petalum enascitur, ovarium & stamina quatuor arctè tegens utrinque.

Ovarium instructum tubâ corniculatâ fit siliqua articulata, plana, continens in singulis articulis semen unum.

1. Hypecoum; latiore folio. T. 230. Hypecoum. C. B. P. 172. Dod. p. 449. Hypecoon legitimum. Clus. H. xci. Hypecoon, siliquis erectis, articulatis, incurvis. M. H. 2. 579. a.

5.

EPIMEDIUM. T. 232. 117.

Folia hederacea, in ramorum fastigio terna.

Rami ad singulos exortus terni, trichotomiâ continuatâ.

Calix tetraphyllos.

Flos tetrapetalus, petalis tubulatis, & in canales cecos excavatis, constans, staminibus quatuor fœcundus.

Ovarium ex fundo calicis, tubâ erectâ instructum, fit siliqua unicapsularis, bivalvis, continens semina compressa, rotunda.

1. Epimedium. C. B. P. 323. M. H. 2. 196. Dod. p. 599. Epimedium quorundam. J. B. 2. 395.

2. Papilionaceo simili flore.

1.

FUMARIA. T. 421. 237.

*Folia divisa ut in umbelliferis.**Calix parvus, bifolius, sub calcar flosculi positus, in nonnullis, in aliis verò abest.**Flos in multis sollicitâ inspectus curâ apparet tetrapetalus ita, ut petalum inferius instar carinae cavæ exporrigatur a fine pedunculi; superius autem in calcar cavum retrogressum, sursum in formam galeæ erectæ assurgit; huic calix & pedunculus adnati; tertium & quartum lateralia, appositu suo formant vaginæ acutissimæ speciem, tectæ inter duo priora petala.**Ovarium ex fine pedunculi curtum, tubâ longâ instructum cujus apex globosus vel disciformis, latet sollicitè tectum totâ suâ longitudine intra vaginam descriptam, & tubæ illi juxta totam longitudinem adnascuntur stamina duotam artè, ut stamina hæc & tuba in unâ tenuissimâ, pellucidâ, vaginulâ sic includantur, ut apex tubæ ovarii, & bini testiculi, modò emineant. Ovarium maturum fit brevis silicula unicapularis, fieta semine rotundo.**Si flos maturus cautè aperitur, simul ac petala duo interiora aperiuntur, lasciivi testiculi semen petulanti luxuriâ subito explodunt impetu.*

1. Fumaria; viticulis & capreolis plantis vicinis adhærens; Neapolitana; flosculis subflavis in summitate nigricantibus. C. B. P. 143. Var. a.

2. Fumaria; officinarum & Dioscoridis; flore purpureo. C. B. P. 143. Fumaria vulgaris. J. B. 3. 201. Fumaria. Dod. p. 59. Fumaria, vulgaris, latifolia, siliquis curtis, non bivalvibus. M. H. 2. 261. a. †.

3. Fumaria; officinarum; foliis cæsiis; flore dilutè rubello. Fumaria, officinarum, foliis cæsiis. Ind. 130. a. †.

4. Fumaria; minor; tenuifolia. C. B. P. 143. M. H. 2. 261. Fumaria, minor, sive tenuifolia, surrecta. J. B. 3. 203. Capnos tenuifolia. Clus. H. ccviii. Fumaria, tenuifolia, flore niveo. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 11. Fig. 3. a.

5. Fumaria; sempervirens; & florens flore albo. Flor. 1. 92. Fumaria, siliquosa, bivalvis, radice fibrosâ, latifolia, perennis, humilior, sine

D. p. 111

sine claviculis, flore albo. M. H. 2. 260. Fumaria, floribus candidis. C. B. P. 143. Var. Fumaria, sempervirens, & florens flore albo. Ind. 130.

6. *Fumaria, lutea. C. B. P. 143. Fumaria, lutea, montana. M. H. 2. 260. Fumaria, quæ split dicitur. J. B. 3. 26. 203.*

7. *Fumaria, claviculis donata. C. B. P. 143. M. H. 2. 260. Fumaria, cum capreolis. J. B. 3. 204. Fumaria altera. Dod. p. 60. a.*

8. *Fumaria, bulbosa; radice cavâ; major. C. B. P. 143. Fumaria, radice tuberosâ, major, radice cavâ. M. H. 2. 261. Fumaria, bulbosa, radice cavâ, flore purpurascens. J. B. 3. 204. Radix cava. Dod. p. 327.* p. 228.

9. *Fumaria, bulbosa; radice cavâ; major; flore albo. C. B. P. 143. Var. J. B. 3. 204.*

10. *Fumaria, bulbosa; radice non cavâ; major. C. B. P. 144. Fumaria, tuberosa, minor, radice non cavâ. M. H. 2. 261. Fumaria, bulbosa, radice foliatâ, calcari & folio cristato. J. B. 3. 205. Aristolochia, vulgaris, flore purpureo. H. Eyst. Hyem. o. 1. F. 7. Fig. 1.*

11. *Fumaria, bulbosa; radice non cavâ; major; flore albo. Aristolochia, flore albo. H. Eyst. Vern. o. 1. F. 2. Fig. 4.*

2.

CAPNOÏDES. T. 423. 237.

Flos, facies, folia, Fumaria.

Pistillum floris fit siliqua, longa, teres, bivalvis, valvis fenestræ adhaerentibus, fæta seminibus subrotundis eisdem fenestræ affixis.

1. *Capnoïdes. T. 423. Fumaria, siliquosa, sempervirens. Corn. 58. M. H. 2. 259. Pseudo-fumaria Indica. Rivin.*

3.

CAPNORCHIS.

Habitus Fumariæ.

Radix tuberosa, aliquando squamosa, quandoque verè gemello quasi bulbo ornata.

Flos planè anomalus, dipetalus, bicaudatus, pendulus, siliculam bursæ Pastoris referens, niveus.

Silicula Fumariæ.

1. *Capnorchis; Americana. Fumaria, tuberosa, insipida. Cornut. 127. M. H. 2. 260. Fumaria, siliquosa, radice grumosa, flore bicorporeo, ad labia conjuncto, Virginiana. Plukn. Phytogr. xc. 3. Fumaria, siliquosa, grumosa radice, flore gemello, monstroso. Banist. Cat. MS. & Fumaria,*

ria, Canadensis, radice squamata, tuberosa. A. R. Paris. An verò tuberosa, insipida, Cornuti alia est? icon ita suadet.

CYSTICAPNOS.

Radix annua, fibrosa.

Folia, flos, rami, habitus Fumariæ claviculis donatæ.

Fructus est vèsica ovalis, quam medius axis transit, cui undique accrescunt semina rotunda, uni iterum communi vesticulæ circa axin expansæ inclusa.

1. Cysticapnos; Africana; scandens. *Fumaria, Africana, vesicaria, scandens. Par. Bat. App. 7. Fumaria, alba, vesicaria, capreolis donata, sub exitum autumnii florens, Æthiopica. Plukn. Alm. 400. a.*

SILIQUOSÆ, BILOCULARES, POLYSPERMÆ.

BIGNONIA. T. 164. 72.

Finis pedunculi fit calix monophyllus, crassus magnus, quinquefidus.

Flos monopetalus, anomalus, tubulatus, utrinque patens, quasi bilabiatus, stamina quatuor gerens amplectens

Ovarium, tubâ longâ apice rotundo donatâ instructum, unde fit siliqua bilocularis, septo medio distincta, fœta seminibus compressis, utrinque alatis.

1. Bignonia; Americana; fraxini folio; flore amplo, phœniceo. T. 164. Clematis, hederacea, Indica, jasmini foliis. H. L. Gelseminum, hederaceum, Indicum. Corn. 102. Gelseminum, Indicum, flore phœniceo. Ferrar. Flor. 199. Pseudo-apocynum, hederaceum, Americanum, tubuloso flore phœniceo, fraxini folio. M. H. 3. 612. t.

2. Bignonia; Americana; capreolis donata; siliquâ breviori. T. 164. Clematis, tetraphyllos, Americana, digitalis flore. H. R. Par. Clematis, Americana, siliquosa, tetraphyllos. A. R. Par. 71. Breyn. Prodr. 1. 30. Clematitide, tetraphylla, Americana. Zanon. Hist. 74. Pseudo-apocynum, Americanum, capreolatum, tetraphyllum, tubuloso flore, foliis longioribus. M. H. 3. 612. t.

3. Bignonia; Americana; arbor; flore luteo; fraxini folio. Plum. T. 164. Clematis, Peruviana, digitalis flore, folio fraxini. Par. Bat. Prodr. 324. Clematis, Americana, fraxini folio, erecta. Breyn. Prodr. 2. 45. Plukn. Phyt. 162. 4. H.



FRUCTUS cysticapni ut pendent a cauliculis A.
 B. vesica bivalvis fructus aperta. C. placenta vesicularia in modo D. semina nigerrima E.



SILIQUOSÆ DICARPÆ.

PERVINCA. T. 119. 45.

*Sarmenta longa, repentia.**Calix monophyllus, quinquefidus, in quinque segmenta, longa, gracilia.**Flos monopetalus, quasi hypocrateriformis, amplus, in quinque lacinias profundè scissus, stamina quinque donata capitulis eleganter barbatis.**Ovarium ex imo fundo calicis bifidum, inter duas placentas laterales, ex centro apicis emittens tubam, cylindricam, gracilem, ad superiora expansam in orbem, ex cujus centro apex eleganter plumosus, dein fit fructus constans duabus siliquis, quæ continent semina oblonga, ferè cylindræa, sulcata.*

1. Pervinca; vulgaris; latifolia; flore cæruleo. T. 119. Clematis, 2. daphnoides, major. C. B. P. 302. Dod. p. 406. M. H. 3. 613. Clematis, daphnoides, major, flore cæruleo. J. B. 2. 132.

2. Pervinca; latifolia; variegata. T. 120. Clematis, daphnoides, major, folio variegato. H. L.

3. Pervinca; vulgaris; angustifolia; flore cæruleo. T. 120. Clematis, 1. daphnoides, minor, flore cæruleo. C. B. P. 301. M. H. 3. 613. Clematis, daphnoides, minor, flore cæruleo, simplici. J. B. 2. 130. Clematis daphnoides. Dod. p. 405. Clematis, daphnoides, flore cæruleo. H. Eyst. o. 1. F. 8. Fig. 3.

4. Pervinca; vulgaris; angustifolia; flore albo. T. 120. Clematis, daphnoides, minor, flore candido. C. B. P. 301. Clematis, daphnoides, minor, flore albo, simplici. J. B. 2. 130. Clematis, daphnoides, flore albo. H. Eyst. o. 1. F. 8. Fig. 2.

5. Pervinca; vulgaris; angustifolia; flore rubente. T. 120. Clematis, daphnoides, minor, flore rubente. C. B. P. 301. Clematis, daphnoides, minor, flore purpureo, simplici. J. B. 2. 130. Clematis, daphnoides, flore purpureo. H. Eyst. o. 1. F. 8. Fig. 4.

6. Pervinca; vulgaris; angustifolia; flore pleno, saturatè purpureo. T. 120. Clematis, daphnoides, flore purpureo, pleno. H. Eyst. o. 1. F. 8. Fig. 5.

7. Pervinca; angustifolia; vulgaris; variegata ex aureo & viridi.

8. Pervinca; angustifolia; vulgaris; variegata ex argenteo & viridi; flore purpurascente, pleno.

ASCLEPIAS. T. 93. 22.

Folia bina adversa.

Calix monophyllus, quinquefidus, in quinque segmenta, longa, gracilia, fissus.

Flos monopetalus, quinquefidus, expansus instar stellæ, intra hunc alius flosculus pentapetalus, longè minor, & brevior, stamina quinque arctè amplexa ovarium.

Ovarium ex calice ortum fit fructus, constans duabus siliquis, per maturitatem dehiscentibus a basi ad apicem, fœtis semine copioso pappis instructo, atque placentæ squamatim affixo.

1. *Asclepias*; albo flore. C.B.P. 303. M.H. 3.611. *Asclepias*, sive *Vincetoxicum* multis, floribus albicantibus. J.B. 2. 138 *Vincetoxicum*. Dod. p. 407. *Asclepias* vulgi, apocynum Dioscoridis. Col. 2. 37. *Apocynum*, *Asclepias* dictum. Par. Bat. 43. *Hirundinaria*, off.

2. *Asclepias*; angustifolia; flore flavescente. H. R. Par. T. 94. M. H. 3.611. Par. Bat. 43.

3. *Asclepias*; nigro flore. C.B.P. 303. M.H. 3.611. *Asclepias*, nigro flore, quorundam. J.B. 2. 140. *Apocynum*. Col. 2. 39. & *Apocynum* Dioscoridis. Col. Phytob. 110.

4. *Asclepias*; Africana; aizooïdes. T. 94. *Asclepias*, aizooïdes, aphylla, flore fritillariæ, siliquis longis, angustis, erectis. M.H. 3.611. *Apocynum*, humile, aizooïdes, aphyllum, Africanum. Par. Bat. 62. *Apocynum*, humile, aizooïdes, siliquis erectis, Africanum. H. L. *Fritillaria*, crassa, Promontorii Bonæ Spei. Stapel. in Theophr. 335. H.

5. *Asclepias*; Africana; aizooïdes; flore pulchrè fimbriato. Comm. Rar. 19. H.

6. *Asclepias*; Africana; aizooïdes; folio compresso, digitato, & cristato. *Apocynum*, humile, aizooïdes, monstrosus, Africanum. Volk. Fl. Nor. 30. Ic. H.

APOCYNUM. T. 91. 20. 21.

Folia bina adversa in caulibus ut plurimum.

Caliculus monophyllus, quinquefidus, stellatus.

Flos monopetalus, campaniformis, quinquefidus, isque vel solitè horum florum posituræ, vel inversa ita, ut cavitatis floris pedunculum contineat retroflexa, ex centro calicis & floris primi exit corpusculum viride, cui accrescunt quinque petala parva, erecta, distincta, singula, instructa uno stylo conico, intra petalum connivens nato, adsunt dein stamina quinque.

Ova.

Ovarium ex centro calicis, tectum membranulâ, suprâ connivente, per quinque parva segmenta, & tegente apicem ovarii, quæ est placentula fungosa, fit deinde fructus, constans plerumque duabus vaginis unicapsularibus, univalvibus, quæ maturæ dehiscunt à basi ad apicem, continentque placentam membranaceam, cui semina compressa, papposa, squamatim imposita densè adcrescunt.

Succus lacteus omni parte plantæ abundans.

1. Apocynum; erectum; latifolium; incanum; Syriacum; floribus parvis, obsoletè purpurascens. *Par. Bat.* 31. *Apocynum, latifolium, Syriacum, incanum, erectum, floribus umbellatis, minoribus, obsoletè purpurascens, filiquis folliculatis, rugosis. H. L. Apocynum, majus, Syriacum, rectum. Corn.* 91. *Apocynum, Syriacum fortè. Clus. H.* LXXXVII. *Apocynum, rectum, Americanum, latifolium, sive majus. Park. Tb.* 386. *Beid'sar. Weixii. Clus. H.* LXXXVII. *Beid-el-offar. Vessling. in Alpin.* 28. *Apocynum, medium, peregrinum, flore umbellato ex obsoletè diluto purpurascens, petalis reflexis. Breyn. Pr.* 2. *M. H.* 3. 609. *Caule purpurascens. co. t.*

2. Apocynum; erectum; incanum; latifolium; Malabaricum; floribus ex albo suave-purpurascens. *Par. Bat.* 28. *Apocynum, latifolium, Ægyptiacum, incanum, erectum, floribus magnis, pallidè violaceis. Par. Bat. Prodr. Ericu. H. Malab.* 2. 53. *Waraghaha. Zeyl. Apocynum, majus, Indicum, flore concavo, carneo, suave-purpurascens. Breyn. Prodr.* 2. *M. H.* 3. 609. *co. t.*

3. Apocynum; erectum; incanum; latifolium; nervo folii rubro; flore umbellato, petalis inferioribus vietè fuscis, superioribus carneis; filiquis longis, angustis, erectis, asperis. *Videtur varietas præcedentis. An Apocynum, Virginianum, erectum, caulibus & foliorum nervis, seu costis puniceis. Herm.?* t.

4. Apocynum; erectum; folio hirsuto, lato; floris umbellati petalis reflexis ruberrimis, erectis obsoletè rubris. *H.*

5. Apocynum; erectum; Canadense; angustifolium. *Par. Bat.* 34. *Apocynum, minus, rectum, Canadense. Cornut.* 92. *Apocynum, angustifolium, Canadense, viride, erectum, floribus rubicundis. H. L. M. H.* 3. 610. *Apocynum, Americanum, asclepiadis folio, & Apocynum, umbellato, rubro, flore, Horti Hermans. Joneq. Hort.* 15. *Apocynum, Americanum, folio asclepiadis, flore rubro, umbellato. Bross. H.*

6. Apocynum; erectum; Canadense; humilius; angustissimo folio. *H. L. Par. Bat.* 35. *H.*

7. Apocynum; erectum; Canadense; latifolium. *Par. Bat.* 34.

8. Apocynum; maritimum; erectum; Venetum; flore albo. *H. L. App. Tithymalus maritimus, seu esula rara è Lio Venetorum insulâ,*

flore albo. *Cat. Hort. Reg. Par.* 176. *Apocynum, maritimum, Venetum, salicis folio, flore albo. T. 92. M. H. 3. 609. H. 1.*

9. *Apocynum; maritimum; Venetum; erectum; flore purpureo. H. L. Par. Pat. 39. Tithymalus, maritimus, purpurascens floribus. C. B. P. 291. Alypum quibusdam, sive esula rara, flore purpureo. J. B. 3. 676. Esula, rara, & Lio Venetorum insula. Lob. Ic. 372. Esula, rara, nostra, floribus purpurascens. Donat. 39. Apocynum, maritimum, Venetum, salicis folio, flore purpureo. T. 92.*

10. *Apocynum; Americanum; foliis androsæmi majoris; flore lili convallium suave-rubentis. H. R. P. Apocynum, Americanum, foliis androsæmi majoris. A. R. Par. 59. Apocynum, Canadense, foliis androsæmi majoris. Bocc. Ic. & Descr. Par. Bat. 40. M. H. 3. 609. t.*

11. *Apocynum; erectum; fruticosum; folio subrotundo, glauco. Par. Bat. 37. Apocynum, folio subrotundo. C. B. P. 302. Apocynum, folio rotundiore, flore ex albo pallescente. J. B. 2. 134. Apocynum, I, latifolium. Clus. H. 124.*

12. *Apocynum; erectum; fruticosum; folio subrotundo viridante. Par. Bat. 38. H.*

13. *Apocynum; folio rotundiori, crasso. Ind. 133. Ubi malè additur. Par. Bat. 23. H.*

14. *Apocynum; fruticosum; folio rotundiori, magis acuto. Ind. 133. Ubi malè additur. Par. Bat. 2. H.*

15. *Apocynum; erectum; Africanum; folio salicis lato, glabro; fructu villosa. Par. Bat. 24. H.*

16. *Apocynum; erectum; Africanum; folio salicis angusto, glabro; fructu villosa. Par. Bat. 24. H.*

17. *Apocynum; Americanum; Canadensis Cornutiani simili folio glabriore; flore umbellato aurantio. An Apocynum, Curassavicum, seu Americanum, fibrosâ radice, floribus aurantiis, chamenerii foliis latioribus? Par. Bat. 36. a. H.*

18. *Apocynum; Africanum; scandens; vincæ pervincæ foliis; subincanum. Par. Bat. 59. Commel. Rar. Exot. 18. Ic. Apocynum, scandens, Africanum, hirsutum. Par. Bat. Prodr. H.*

19. *Apocynum; scandens; vincæ pervincæ foliis; viride; fructu villosa. Par. Bat. 58. H.*

20. *Apocynum; Afrum; scandens; folio rotundo, subincano, nummulariæ. H.*

21. *Apocynum; Virginianum; erectum; folio magno, glabro, nervo rubro, instar Apocyni tertii. An Apocynum, erectum, incanum, latifolium, Americanum, floribus ex incarnato suave-violaceis. Par. Bat? H.*

22. *Apocynum; (17.) flore albo. a. H.*

PLUMIERIA. T. 659. 439.

Habitus Apocyni, cum abundanti lacte.

Finis pedunculi fit caliculus brevis, monophyllus, ex quo nascitur

Flos ut in Nerio, sed carens coronulâ petaloïde.

Ovarium, in fundo calicis natum, fit fructus longus, siliquosus, geminus, dehiscens per maturitatem juxta longitudinem, fœtus seminibus multis, positis ut in Apocyno, sed foliatis.

1. Plumieria; flore roseo, odoratissimo. T. 659. H. prægn.

PERIPLOCA. T. 93. 22.

Flos monopetalus, rotatus.

Reliqua Apocyni scandentis.

1. Periploca; foliis oblongis. T. 93. *Apocynum, folio oblongo. C. B. P. 303. Apocynum, sive Periploca, scandens, folio oblongo, flore purpurante. J. B. 2. 133. Par. Bat. 52. M. H. 3. 611. Periploca altera. Dod. p. 408.*

2. Periploca; Monspeliaca; foliis rotundioribus. T. 93. *Scammonea Monspeliaci varietas. Lob. Obs. 341. M. H. 3. 611. Scammonea, Monspeliaca, foliis rotundioribus. C. B. P. 294. Scammonea, Monspeliaca, flore parvo. J. B. 2. 136. Apocynum, IV, latifolium, scammonia Valentiana. Clus. H. 126. Scammonea Monspeliensis. H. Eyst. Æst. o. 13. F. 9. Fig. 2. Apocynum, scandens, Monspeliacum, scammonii foliis rotundioribus. Par. Bat. 54. H.*

3. Periploca; Monspeliaca; foliis acutioribus. T. 93. *Scammonea Monspeliacæ affinis, foliis acutioribus. C. B. P. 294. Apocynum, latifolium, amplexicaule. J. B. 2. 135. M. H. 3. 611. Apocynum, III, latifolium. Clus. H. 125. Apocynum, scandens, scammonii foliis acutioribus. Par. Bat. 54. H.*

4. Periploca; foliis scammonæ acutissimis. H.

5. An Periploca; foliis atro-viridibus, maculatis, scammonii latioribus? H.

NERIUM. T. 604. 374. Raj. Meth. 160. 196.

Rami, & furculi, τεχέτοιοι.

Folia terna ad eundem exortum.

Calix parvus, tubulosus, quinquesidus.

Flos monopetalus, quasi infundibuliformis, orâ amplâ, atque ibi in quinque segmenta lata & magna profundè divisus; ad centrum divisionis nascuntur quinque laciniae, ut in *Lychnide*, *Caryophyllo*, *Apocyno*, stamina quinque.

Ovarium ex centro calicis fit fructus teres, ferè cylindricus, compositus ex duabus thecis per maturitatem à se invicem abscedentibus, semina papposa continentibus. *Malp. An. Pl.* 46. 158. 49. 187.

1. *Nerium*; floribus rubescentibus. *C. B. P.* 464. *Nerion*, flore rubro. *H. Eyst. Æst. o. Arb. F.* 5. Fig. 1. 2. *Nerion*, sive *rhododendron*, flore rubro. *J. B.* 2. 141. *Oleander*, laurus rosea. *Lob. Ic.* 364. *Rhododendron*. *Dod. p.* 851. *H.*

2. *Nerium*; floribus albis. *C. B. P.* 464. *Nerium*, seu *rhododendron*, flore albo. *H. Eyst. Æst. o. Arb. F.* 4. Fig. 1. *Nerium*, sive *rhododendron*, flore albo. *J. B.* 2. 141. *H.*

3. *Nerium*; *Indicum*; angustifolium; floribus odoratis, simplicibus. *H. L.* 447. *Ic. & Descr. H.*

4. *Nerium*; *Indicum*; latifolium; floribus plenis, odoratis. *H. L.* 447. 449. *Ic. & Descr. H.*

5. *Nerium*; *Indicum*; latifolium; flore variegato, odorato, pleno. *H. A.* 1. 45. *H.*

SILIQUOSÆ, QUADRICAPSULARES, QUADRIVALVES, POLYSPERMÆ.

CHAMÆNERION. T. 302. 157.

Finis pedunculi abit in ovarium, cujus summo margini innascitur

Calix tetraphyllus, quatuor longis, gracilibus, expansis, segmentis constans.

Flos rosaceus, tetrapetalos, caducus, octo staminibus fecundus.

Ovarium flori suppositum, longum, tetragonum, instructum tubâ longâ, apice quadrifido, patente, fit siliqua longa,

ga, membranacea, divisa in quatuor loculamenta, quatuor valvis instructa, quæ maturæ diffiliunt, incurvantur, retrovolvuntur, in singulis loculis semina plurima, papposa, adnata diaphragmati quatuor alis instructo.

1. *Chamænerion*; latifolium; vulgare. *T.* 302. *Lyfimachia*, *Chamænerion dicta*, latifolia. *C. B. P.* 245. *M. H.* 2. 269. *Lyfimachia*, speciosa, quibusdam *onagra dicta*, siliquosa. *J. B.* 2. 906. *Onagra*. *Lugd.* 865. *Chamænerion*. *H. Eyst. Æst.* o. 1. *F.* 8. *Fig.* 1.

2. *Chamænerion*; latifolium; vulgare; flore albo. *T.* 302.

3. *Chamænerion*; villosum; magno flore, purpureo. *T.* 303. *Lyfimachia*, siliquosa, hirsuta, magno flore, purpureo. *C. B. P.* 245. *M. H.* 2. 270. *Lyfimachia*, siliquosa, hirsuta, majore flore, purpureo. *J. B.* 2. 905.

4. *Chamænerion*; villosum; majus; parvo flore. *T.* 303. *Lyfimachia*, siliquosa, hirsuta, major, parvo flore. *C. B. P.* 245. *M. H.* 2. 270. *Lyfimachia*, siliquosa, hirsuta, flore minore. *J. B.* 2. 906. *†. a.*

5. *Chamænerion*; glabrum; majus. *T.* 303. *Lyfimachia*, siliquosa, glabra, major, flore pallidè rubente. *C. B. P.* 245. *M. H.* 2. 270. *Lyfimachia levis*. *J. B.* 2. 907. *Pseudo-lyfimachium*, purpureum, *I. Dod.* p. 85. *†. a.*

6. *Chamænerion*; glabrum; minus. *T.* 303. *Lyfimachia*, siliquosa, glabra, minor. *C. B. P.* 245. *M. H.* 2. 271. *†. a.*

7. *Chamænerion*; Siculum; glabrum; majus; & nitidum; amygdali folio. *T.* 303. *Lyfimachia*, pulchra, amygdali folio nitido, rubente caule, flore magno, purpureo. *H. Cath. a.*

8. *Chamænerion*; angustifolium; glabrum. *T.* 303. *Lyfimachia*, siliquosa, glabra, angustifolia. *C. B. P.* 245. *†. a.*

ONAGRA. T. 302. 156.

Calix, ovarium, flos, Chamænerii; sed semina non papposa.

Flos rosaceus, tetrapetalus.

1. *Onagra*; latifolia. *T.* 302. *Lyfimachia*, lutea, corniculata. *C. B. P.* 245. *Lyfimachia*, lutea, corniculata, non papposa, *Virginiana*, major. *M. H.* 2. 271. *a. b.*

2. *Onagra*; latifolia; flore dilutiore. *T.* 302. *Lyfimachia*, lutea, corniculata, non papposa, *Virginiana*, major, flore sulphureo. *H. L.* 396. *a. b.*

3. *Onagra*; angustifolia. *T.* 302. *Lyfimachia*, lutea, corniculata,

Rr 3

non

non papposa, Virginiana, minor. M. H. 2. 271. H. L. 396. *Lyfimachia*,
angustifolia, Canadensis, corniculata. H. R. Par. a. b.

SESAMUM.

Radix annua.

Calix ex alis foliorum ferè absque pedunculo, parvus, quinque longis, gracilibus, segmentis, constans.

Flos monopetalus, flori Digitalis satis accedens.

Ovarium siliquosum, tetragonum, oblongum, in quatuor loculos distinctum, fœtos seminibus multis, edulibus.

1. Sesamum. J. B. 2. 896. Dod. p. 531. *Sesamum Veterum*. C. B. P. 27. Sempsen, *Sesamum*. Alpin. Æg. 37. *Digitalis*, *Orientalis*, *Sesamum dicta*. T. 165. a. prægn.

2. Sesamum; alterum; foliis trifidis; Orientale; semine obscuro. Plukn. Ph. 169. 4. *Digitalis*, *Orientalis*, altera, semine obscuro. T. 165. a. prægn.

3. Sesamum; Orientale; trifidum; flore niveo. Hort. Compt. T. 165. *Digitalis*, *Orientalis*, trifida, flore niveo. T. 165. a. prægn.

SILIQUOSÆ, QUINQUECAPSULARES, POLYSPERMÆ.

CORCHORUS. T. 259. 135.

Folia alterna in nodis caulium.

Calix pentaphyllus.

Flos rosaceus, pentapetalus.

Ovarium in centro calicis sit fructus cylindri æmulus, quinquelocularis, quinquesariam debiscens, fœtus seminibus angulosis.

1. Corchorus; five melochia. J. B. 2. 982. *Corchorus Plinii*. C. B. P. 317. M. H. 2. 283. *Melochia*. Alp. Ægypt. 39. a. prægn.

FABAGO. T. 258. 259. 135.

Folia in eodem pediculo bina, pediculi ex adverso bini in nodis caulis, unde tetraphylla apparet.

Calix pentaphyllus.

Flos rosaceus, pentapetalus, staminibus decem natis ad foliola parva orta ex commissurâ placentæ & ovarii.

Ovarium ex centro calicis sit fructus cylindræus, penta-
go-

gonus, quinquelocularis, quinquefariam debiscens, singulis valvis septo intergerino munitis, fœtus seminibus planis.

1. Fabago Belgarum; sive Peplus Parisiensium. Lugd. 456. T. 259. Morgsani Syrorum, Rawolfii Append. Lugd. 25. Capparis fabaginea, sive Peplus Lutetianorum. J. B. 2. 66. Capparis, portulacæ folio. C. B. P. 480. M. H. 2. 284. Capparis, Fabago. H. Eyst. Æst. o. 10. F. 1. Fig. 1. Telephium, Dioscoridis, & Plinii. Col. 1. 131. Ic. 132. Descr. H.

2. Fabago; Africana; arborescens; flore sulphureo; fructu rotundo. Commel. Rar. Ex. 10. H. R. D.

3. Fabago; Afra; frutescens; minor; flore flavo magno, unguibus petalorum fuscis. H. R. D.

Oxys. T. 88. 19.

Calix quinquefidus, monophyllus, tubulosus, instar campanæ.

Folia Trifolii cordata, acida.

Flos monopetalus, pentapetaloides, campaniformis, stamina quinque inferiora, & quinque superiora, infra ferè concreta inter se.

Ovarium in fundo calicis emittens quinque tubas, sit fructus membranaceus, oblongus, quinquelocularis, valvis quinque à basi versus apicem sursum dissilientibus, fœtus seminibus calyptrâ elasticâ involutis, ejusque vi cum impetu dissilientibus.

1. Oxys; flore albo. T. 88. Trifolium, acetosum, vulgare. C. B. P. 330. M. H. 2. 183. Oxys, sive trifolium acidum, flore albo. J. B. 2. 387. Trifolium, acetosum, flore albo. H. Eyst. Vern. o. 6. F. 1. Fig. 2. Dod. p. 578. a. †.

2. Oxys; flore purpurascens. T. 88. Oxys, sive trifolium acidum, flore purpurascens. J. B. 2. 387. Trifolium, acetosum, vulgare, flore purpurascens. M. H. 2. 183. a. †.

3. Oxys; lutea. J. B. 2. 388. T. 88. Trifolium, acetosum, corniculatum. C. B. P. 330. Trifolium, acetosum, flore flavo. H. Eyst. Vern. o. 6. F. 1. Fig. 3. Oxys, sive trifolium acetosum, corniculatum, luteum, minus, repens, & procumbens. M. H. 2. 183. a. †.

4. Oxys; lutea; Americana; erectior. T. 88. Trifolium, acetosum, corniculatum, luteum, majus, erectum, Indicum, seu Virginianum. M. H. 2. 184. a.

5. Oxys; bulbosa; Æthiopica; minor; folio cordato; flore ex albido purpurascens. H. A. 1. 43. H.

6. Oxys;

6. Oxys; bulbosa; Africana; rotundifolia; caulibus & floribus purpureis, amplis. *H. A.* 1. 41. *Oxy affinis planta, bulbosa, Africana, flore purpureo, magno. Breyn. Cent.* 1. 46. *H.*

BALSAMINA. *T.* 418. 235.

Calix exiguus, bifolius, caducus.

Flos anomalus, calcari donatus, flore dipetalo, tripetalo, tetrapetalo, vel hexapetalo.

Ovarium binis foliolis cinctum, in medio floris, sit fructus turbinatus, vel siliquæ æmulus, musculis elasticis multis, semina vi displodentibus, constans.

1. Balsamine lutea; sive Noli me tangere. *C. B. P.* 306. *T.* 419. *Noli me tangere. J. B.* 2. 908. *H. Eyst. Æst.* 0. 5. *F.* 5. *Fig.* 1. Balsamina, herba impatiens, sive Noli me tangere, flore patulo, luteo. *M. H.* 2. 282. Balsamina, altera, Noli me tangere. *Col.* 1. 150. *Impatiens. Dod.* p. 659. a. 7.

2. Balsamina; foemina. *C. B. P.* 306. *H. Eyst. Aut.* 0. 1. *F.* 4. *Fig.* 1. Balsamina, foemina, persicæfolia, vel salicis folio. *J. B.* 2. 909. Balsamine, herba impatiens, sive Noli me tangere, flore patulo, eleganter dilute rubente. *M. H.* 2. 282. Balsamine. *Dod.* p. 671. a.

3. Balsamina; foemina; flore candido. *H. L. a.*

4. Balsamina; foemina; flore rubro. *H. L. a.*

5. Balsamina; foemina; flore majore, candido. *T.* 418. a.

6. Balsamina; foemina; flore majore, specioso. *T.* 418. Balsamina, foemina, foliis amplioribus, flore majore, amœnè purpurascente. *Schol. Bot.* a.

7. Balsamina; foemina; flore partim candido, partim rubro. *H. L. a.*

8. Balsamina; foemina; flore pallidè rubro. *C. B. P. a.*

9. Balsamine; foemina; flore variegato, elegantissimo. a.

FINIS PARTIS PRIMÆ.





2000

2000



Tab 12 planta

1 Prospectus Horti

